

123456789

101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100



ref
No 1059. ~~E. Tab. 120~~
X. Tab. 3.

728

55450
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
THEATRIBO-
TANICI CASPARI
BAVHINI BASILEENS.
ARCHIATRI ET
Prof^{ess}.ordin.

IN QVO
PLANTÆ SVPRÆ SEXCENTÆ
*ab ipso primùm descriptæ cum plurimis figuris
proponuntur.*



Frankofurti ad Mœnum,
Typis Pauli Iacobi, impensis Ioannis Treudeli.
Anno MDCXX.





REVERENDISSIMI PER-
ILLVSTRIS ET GENEROSI
DOMINI,

D. ERDTMANNI LIB.BARONIS IN PVTBVS;
ET ORDINIS EQVITVM DIVO IOHAN. SACROR. COMMENDA-
TORIS IN WILDENBVRCH,&c.FILIO

PERILLVSTRI ET GENEROSO
DOMINO,

D. PHILIPPO LVDOVICO LIB.BARONI IN PVTBVS,&c.

Hunc THEATRI sui BOTANICI ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ

CASPARVS BAVHINIVS BASILEENS. ARCHIATROS OBSERV. MON.

ΤΥΚΗ ΚΑΙ ΠΟΝΩ offert.

Epistola Dedicatoria.



ALOMONEM populi Iudaici regem, PERILLVSTRIS & GENEROSI
DOMINE BARO, de omnium stirpium natura commentarios scri-
psisse, & quidem pro sapientia quam diuinitus acceperat, (omnium
priscorum, etiam Aegyptiorum sapientiam longe post se relincente)
sacra docet pagina: ut vel minima ac vilissima naturae opera consi-
derarit, ita ut à Cedro Libani, vsque ad Hyssopum quae è pariete pro-
gignitur, disputarit. Quos in templi Hierosolymitani vestibulo diu asseruatos, Ezechias
rex, una cum interpretibus libris, iussulisse asserunt, eo quod animaduertisset, egros, ad hos

):(2 tanquam

EPISTOLA

tanquam ad numen aliquod confugere: ex his potius quam à Deo morborum curationes
 petere. Non enim dubium est in libris illis, posteritati ob insignem sapientiam commen-
 datis, multiplicem etiam abusum fuisse, qui aliquot seculis post durauit: & vnum rese-
 ram, Flauij ἀρχαῖος meminit cuiusdam Eleazari exorcistæ, qui in Vespasiani exerci-
 tu, multos qui à demonibus torquebantur, presente Imperatore curauit hoc modo: obsessi
 naribus annulū indebat, sub cuius sigillo radicis à Salomone indicatæ species inclusa erat:
 quæ iterum è naribus educto & agro languore in terram collapsio, eoque exanimato ia-
 cente, carminibus Salomonis demonem adiurabat, & per sacra in pristino ergastulo ha-
 bitare edicebat: & vt obsessum à spiritu maligno liberatum astantibus ostenderet, coram
 obesso calicem aqua plenum collocabat, & demoni iam ab homine egresso, eum vt sub-
 uerteret, imperabat. Eiusmodi ergo profanitatis & idololatriæ exterminandæ studio, E-
 zechias pietatis zelo ductus, commentarios illos remouit, non artis odio, cuius auxilium
 ipsemet postmodum in vlceris curatione persensit. Quos sane libros si adhuc haberemus,
 forsitan deesset de herbis scribendi occasio. Verum cum non solum veteres solis herbis in
 medicatione contenti fuerint, sed etiam num hodie non minima Medicinæ pars in iis
 consistat, idcirco in earum inquisitionem cupidius incumbere oportet, præsertim eum qui
 Medicinam aliis salutariter facere cupit, cum nec Hippocratem piguerit, vt dogmata
 Διονυσίου ἐν τῇ τῆς ἡμετέρας, diuinæ medendi scientiæ, ita Πωταρινὸν παρὰ Δεμόκριτον à Democrito, qui ab Æ-
 gyptiis eam acceperat, addiscere. Ad quod studium vnumquemque sua valetudo inuita-
 re debet, cum inter corporis dotes mortalibus à Deo nulla pretiosior concessa sit: id quod
 olim, nescio quis Poetarū senario comprobauit, οὐκ ἐστὶν ἰατρικὴς κρείττων ἐστὶν ἐν βίῳ. Sunt quidem
 de simplicibus ab antiquis multa non feliciter scripta, sed à nemine omnium æque de om-
 nibus, neque ea ipsa in vnum collecta, ordineque, sine longis circuituionib. digesta. Quare
 laborē hunc, post plurimos clarissimos scriptores, cum susceperimus, dum THEATRVM
 BOTANICVM adornamus, in præsens PRODROMVM Meius, qui vltra Sexcentas à
 me primum descriptas Plantas exhibet, præmittere placuit. Quem laborem, cui rectius
 offerrem quam tibi PERILLVSTRIS & GENEROSE DOMINE BARO, non oc-
 currit alius, cum ex conuersatione & colloquio, te & literas & literatos singulari can-
 dore amare, & virtutes togatas ac bellicas omni studio prosequi, & eius nomine ab om-
 nibus bonis & obseruari & laudari, sine fūco animaduerti. Non sane mirum, modo ve-
 rum sit illud, ex vnguibus leonem cognosci, siquidem & peruetusta & illustriss. pro-
 sapia, Rugie Principum oriundus sis, quin etiam illustriss. Parète natus, Heroe virtuti-
 bus cunctis, vt numero dicam, eminente: insuper ab Ephoris & præceptoribus in primis
 à præ-


DEDICATORIA.

à præstantiss. vereque modesto & ingenuo D. Joachimo Volschouio, moribus & vita
præeuntibus, instructus fueris. Non immerito ergo illustriss. parentibus & gaudio &
solatio, patria & Reip. feliciter te natum suo tempore abunde testatum facies: ad quod
ab vno & trino, porro felicissima quæque precor: & ut hunc laborem meum, serena
hilarique fronte suscipias, tuearis, & me porro tuo fauore prosequi digneris, opto, rogo-
que. Basileæ Jdib. Martij MDCXX.



HC 3

AD



AD MEDICINÆ STUDIOŒOS.



IGNA sane est, CANDIDE Lector, Galeni i. de Antidotis 5. sententia, quæ ab omnibus Medicis perpendatur. Medicus ait omniũ **STIRPVM**, si fieri possit, peritiam habeat, consulo, sin minus, plurium saltem quibus frequenter vtimur. Nam qui studio Medico operam dare in animo habet, nil in artis operibus laude digni præstabit, si **HERBARVM** cognitione destituatur: tam enim medico necessaria
 ὡς ἐχέοντες ἐν αἰχμαρὶς τοῦτο ἰατρικῶν ὁρῶμεν, vt Oribasius scribit: siquidem partem Medicinæ potissimam semper complexa sit: Homeri Scholiastæ ἡ ἀρχαία ἰατρικὴ ἐν βοτάνῃς ἦν: seu vt Seneca, Medicina quondam paucarum herbarum scientia fuit. Et apud Plutarchum Tryphon asserit, Chironem & Cadmum Agenoridem, qui duo primi Medicinam exercuisse credebantur, ægros suos solis herbis & radicibus sanasse. Sic cum Eurypylus apud Homerum ab Alexandro sagitta sauciatus fuisset, vulnus eius Patroclus ita curauit.

αἰματιπληγὸν

Νίτ' ὕδ' αἰλαραὶ, ἐπὶ δ' ἐρεῖζ' οὐ βέλε' πικρὸν

χρὸς διατρέψας ὀδυνώφατον.

Hæc & similia mecum perpendens, nunc ab annis quadraginta quatuor, studium Botanicum, ea qua fieri potuit diligentia excolui, nullis laboribus, nullis sumptibus parcens, ne quidem molestas peregrinationes intermittens, quo & plantarum cognitionem, quantum fieri humanitus licet, solidam mihi compararem: easdem colligerem & collectas asseruarem, & cum authorum descriptionibus conferrem: vnde factum, vt domi meæ in horto meo sicco supra quatuor millia Plantarum demonstrare possim, quod quam plurimi & Doctores & Studiosi diuersarum nationum testari poterunt, vt qui eas singulas, à me ipsis demonstratas, vti frequenter soleo, viderint. Et ad huius fidam cognitionem Authores etiam consulendi fuere, quare omnes quotquot hætenus habere potui, qui de herbis scripsere, vt & Florilegia, mihi comparaui. At quia non omnis fert omnia tellus, infinitis literis ad clarissimos viros datis, vt alibi plenius, suppellectilem meam Herbariam auxi, & ex ipsorum literis non pauca ad rem facientia, cognoui. Quare ne talentum à Domino mihi concreditum defoderem, sed Spartam quam nactus sum exornarem, ante annos viginti quatuor, in iuuenum gratiam Phytopinacis partem primam proposuimus, in quo plantas sparsim ab authoribus descriptas, certa methodo proposuimus, & quidem supra bis mille & circiter quinquagentos: cuius libri exemplaria cum fuerint vendita & distracta, proxime si Deus volet, Pinacem Theatri nostri Botanici, qui loco Phytopinacis erit, dabimus, vna cum synonymiis herbarum supra quinque millia, conuenienti methodo disposita, quo eo Studiosi in Herbationibus vti possint. Sic & Matthiolum emaculatum cum synonymiis & multarum nouarum Plantarum auctario, ante annos viginti duos dedimus: & ante annos nouendecim in historiam Lugduni suppresso nomine editam, animaduersiones scripsimus: &

ante

ante septennium Tabernæ montanus, plurimis & plantis & medicamentis additis locupletior redditus excusus fuit. Nunc vero PRODROMVM THEATRI nostri BOTANICI damus, in quo supra sexcentæ plantæ à me primum descriptæ, exhibentur: & licet earum aliquæ apud C. Clusium, & nobiliss. Fabium Columnam Lynceum, & perpauca in horto Eystadiensi reperiantur, nostris tamen adiecimus, quia eas in supra dictis libris, antequam horum scripta prodirent, descripsimus. Figuras quas sculpi curauimus, tot quot ad manus fuere iam absolutæ adiecimus, sperantes futurum, vt & reliquæ THEATRO addendæ, sculphantur. Hoc labore nostro, iuuandi studio instituto, vt ere, donec Theatrum nostrum Botanicum accipias. Nam cum & Iohannis Bauhini Illust. Ducis Wirtembergici Archiatri, fratris mei pie defuncti opus præclarum sub prælo sit: & etiamnum Romæ, historia plantarum Mexiocanarum cum figuris excudatur, & ad medium absoluta sit, vt ex literis clariss. Fabii Columnæ cognoui, hæc opera expectare animus est, quo, si DEVS volet, in Theatro nostro, & vno volumine omnes omnium plantarum, à quibuscunque authoribus propositarum descriptiones, & quidem methodice, omnibusque superuacuis recisis, tibi, Candide Lector, exhibere valeamus, sicque perfectum opus accipias.

His interim in rem tuam vt ere, authori faue, & si potes plantarum transmissione iuuato: & si quæ minus recte proposita animaduertaris, pro humanitate tua moneto: monitus non solum gratias habebo, sed etiam lubens, quod homines ingenui, & fatebor & sententiam mutabo. Nam vt recte Galenus, χαλεπὸν ἀνδραπὸν ὄντα, μὴ διαμαρτάνειν, ἐν πολλοῖς, ἀλλὰ μὲν ὅλως ἀγνοήσαντα, τὰ δὲ κακῶς κείοντα, τὰ δὲ ἀμολέειν ὅσον γράψαντο. Vnum addam, paginis titulum Theatri Botanici, me inscio, impositum esse, qui vel omittendus, vel Prodromi nomen præponendum erat. Nunc nomina eorum à quibus plantas accepimus subiiciamus, cum ingenuum deceat, per quos profecerit, fateri, quod hæcenus fecimus, & porro, si DEVS volet, facturi sumus. Viue & vale.

*NOMINA EORVM QVORVM OPERA
in prodromo adiutifuiamus.*

A Clutius Medicus Alstrodamenfis.
 Arnoldus Gillenius, Ducis Megapolitani
 Medicus.
 Bernhardus Paludanus, Medicus Enchufianus.
 Caspar Weckerlinus, p. m. Argentinenfis Medi-
 cus.
 Caspar Bartolinus, Haffniae Medicinæ Professor.
 David Vasmarius, p. m. Lubecenfis Medicus.
 Daniel Lotirzius, Paterniacenfis Medicus.
 Euerhardus Vorstius Professor Lugd. Batavorum.
 Fabius Columna Lyncæus.
 Fridericus Meyer, p. m.
 Ferrandes Imperatus, Pharmacopæus Neapoli-
 tanus.
 Georgius Rumbaum Medicus Vratislauienfis.
 Henricus Heyl Medicus Dantiscanus.
 Honorius Belli Medicus in Creta.
 Iacobus Albinus, Medicus Hamburgenfis.
 Iacobus Antonius Cortius, p. m. Patricius Pata-
 alius & Horti præfectus.
 Iacobus Cargillus, Medicus in Scotia.
 Iacobus Zuingerus, p. m. Medicus Bafileenfis.
 Iacobus Hagenbachius, Bafil. Med. Studiofus.
 Ioachimus Burferus, Medicus Annæbergenfis.
 Ioannes Bauhinus, p. m. Wirtembergenfis Ar-
 chiater.
 Ioannes Fleifferus Vratislau. D. qui in Virginia
 obiit.

Ioannes Francus, Senior Medicus Camicenfis.
 Ioannes Henricus Churterus, p. m. Medicus Bafi-
 leenf.
 Ioannes Neudorffer, Medicus Norinbergenfis.
 Ioannes Pona, Pharmacopæus Vetonenfis.
 Ioannes Rudolphus Saltzman, Poliater & Profes-
 for Medicinæ Argentinæ.
 Ioannes Sigfridus, Medicinæ Professor Helmsta-
 dij.
 Laurentius Rosenau, Pharmacopæus Linebur-
 genfis.
 Laurentius Scholtzius Senior, p. m. Medicus Vra-
 tislau.
 Leonhardus Doldius, p. m. Medicus Norinber-
 genfis.
 Ludouicus Furer Senator Northufanus.
 Ludouicus Iungermannus, Professor Gieffanus.
 Matthias de Lobel, p. m. Botanographus An-
 gliæ.
 Matthias Listerus, Medicus Londinenfis.
 Nicolaus Agerius, Physices Professor Argenti-
 næ.
 Nicolaus Contareus, Patritius Venetus.
 Olaus Worm, Professor Haffniæ.
 Paschalis Gallus, Piſtauienfis Medicus.
 Philippus Stephanus Sprengerus, p. m. Pharmaco-
 pæus Heidelbergenfis.
 Samuel Sattler, Ducis Brunfvic. Medicus.



THEATRI BOTANICI CASPARI BAVHINI BASI- LIENSIS ARCHIATRI

PRODROMVS.

PLANTARVM vniuersalem historiam, in THEATRO, Deo clementer vitam viresque largiente, propositurus, hoc vero in libro, solum Plantarum à me primo descriptarum, historiam expressurus, eandemque methodum, quam in Theatro, obseruaturus à GRAMINIBVS auspicari lubet.

LIBER PRIMVS.

DE GRAMINIBVS.

CAPVT I.

GRAMINIS differentias ducentas in THEATRO nostro, si Deo placuerit, proponemus, in præsens vero eas graminis species, quas à cæteris Botanicis prætermittas censemus, breuiter describere est animus, & id perspicue & sine omni verborum lenocinio: tu DEVS cæptis clementer, quod supplex peto, aspira.

I. GRAMEN caninum vineale: radice est alba, tenui, repente, geniculis distincta, ex quibus fibræ capillares in terram defiguntur: culmos habet tenuis, læues, genicularos, in terram reclinatos: ex quorum geniculis singulis, folium, duas, tresve uncias plerumque longum, angustum, atro-virens prodit: culmorum summo panicula brevis, parumque expansa, ex paruis glumis composita, insidet.

Apud nos in vinearum vijs, solo aliquantulum duriore, circa æstatis initium reperitur.

II. GRAMEN caninum supinum paniculatum dulce: ex radice oblonga, capillata, & nigra, folia pauca, læuia, viridia, angusta, uncias trium vel quatuor longa, prodeunt; inter quæ calamus tenuis, internodijs distinctus, folijs paucis oblongis cinctus; parte inferiore supinus, mox palmum longus, erigitur, & paniculam tenuem, albam, glumis exiguis donatam, sustinet: agris Londinensibus vdis gaudet, vnde D. Lobelius, Graminis dulcis nomine misit.

III. GRA-

Gramen caninum maritimum
asperum.

III. GRAMEN caninum maritimum asperum: radicem habet ex multis fibris oblongis; albis, capillaribus compositam, ex qua ramuli plures dorsales, in terram primum reflexi prodeunt; calamis rotundis rufescentibus donati, quos folia quasi in fasciculo iuncta, breuia, dura, veluti in aculeum fastigiata, in circuitu leuiter hirsuta, terre instar minutissime exasperata, cingunt: spica, folliculo primum inclusa, angusta, ceu ex lappulis elegantissimis, exiguis, asperis & echinatis composita. In littore Veneto, maritimis quoque circa Anconam, & Monspeluli reperitur. Lobelius aduersariorum parte altera in catalogo graminum, gramen caninum medicatum maritimum spica echinata. C. Bauhini (sed sine descriptione) vocat, quia hoc nomine in Phytopinae nostro ante annos viginti quatuor breuissime descripsi.

Gramen caninum maritimum
spicatum.

IV. GRAMEN caninum maritimum spicatum: ex radicibus tenuibus, lignosis, leuissime capillatis, viticellis plures repentes, rotundi, laues, pedales, cubito etiam longiores, frequenter geniculati, unde ramuli plures, foliolis arundinaceis breuibibus & angustis cincti, prodeunt; quorum superioribus spica triuialis, ex cinereo nigricans insidet. Ad litus maris, non longe Monspelio, D. Saltzmannus legit & communicauit.

V. GRAMEN murorum radice repente, ex radice nigricante repente & capillacea, culmi plures, pedales, incurui, tennes, geniculati, folijs paucis, breuibibus & angustis cincti, prodeunt: quorum summitati panicula albicans, sesquialteralis, ex minimis glumis contexta, insidet. Hoc in muris fossarum lateriorum urbis nostrae prouenit.

VI. GRA-

Gramen nodosum spica parua.



VI. GRAMEN nodosum spica parua: radice est parua, nodosa, albicante, fibris paucis & breuibus donata, cui ceu alter nodulus oblongus insidet, qui in calamum cubito altiore, laeuem, internodijs aliquot distinctum abit, folio ad quemlibet nodum vno, angusto, vncias quatuor vel sex longo: in summitate spica vnica vix vncialis, mollis, typhini graminis forma. In dumeris vdis circa Bedfordiam (vrbe diei itinere Basilea distante) prouenit, vbi D. Ioannes Bauhinus frater meus p.m. collegit & transmisit.

Gramen nodosum auenacea panicula.



GRAMINIS nodosi auenacea panicula descriptionem hic praeterimus, cum ab alijs proposita fuerit, solum figuram nouam cum a nullo perfecte fuerit delineata, addere placuit.

(36)

A 2

VILGRA-

THEATRUM BOTANICUM

Gramen bulbosum aquaticum.



VII. GRAMEN bulbosum aquaticum: Bulbum unicum habet, elegantem, cum recens est, maculis luteis striatum, carne alba, nullius odoris nec saporis, in ima parte quasi caudulam habens, ex quo pediculus durarum vnciarum exurgit: cuius summo radix manifeste fibrosa ad foliorum exitum conspicitur: folia aliquot habet latiuscula, palmaria, striata: an calamum ac florem proferat ignoramus, cum tale à D. Vasmaro anno 1592: Lubeca acceperimus: scribit se in ripa fluminis Traua inuenisse fluctibus forte proiectum, quod absque dubio sub aquis nascatur, foliorum contemplatione id docente: imbecilliora enim esse, quam ut sine fulciente aqua se sustinere possit: quod in Phytopin. etiam monuimus.

VIII. GRAMEN bulbosum ex Alepo: Radix est bulbosa, cortice reticulato obuoluta, cui fibræ parua: capillares subijciuntur: culmos duos tresve striatos, sesquipedalia altitudinis habet,

Gramen tremulum minus panicula parua.



folijs plurimis, oblongis, gramineis cinctos: spica, hordeo marino similis, culmo insidet, quam folijs, vesicæ instar parte inferna cingit eamque superat. Hoc siccum apud Iohan. Bauhinum fratrem vidimus.

IX. GRAMEN tremulum minus panicula parua. Radicibus rufescentibus hac illuc repentibus, nititur, vnde culmi palmares duo vel tres, geniculo vno vel altero distincti, folijs gramineis virentibus & glabris, angustis, acuminatis, quorum vnū iubam vesicæ in modum obuoluit, & suo acumine vel superat, vel saltem adæquat, quæ multis laminulis squamatis, lenticulæ similibus, rotundis, spadicæ saepe coloris, filo tenuissimo adpensis, constat: ex quibus flosculi tenues, ex flauo pallentes, in vere emicant. In pratis nostris montosis & ericetis prouenit, & vulgo Hasenbrod id est, leporinus panis, dicitur.

Gramen tremulum maximum.



GRAMINIS tremuli maximi, cuius Cæsalpi-
nius sub Phalaride altera, & Clusius in Cu. post. sub
gramine Amourettes maiore meminit; Figuram
nemine propositam adponere placuit.

GRAMEN pratense paniculatum molle, cum
nomine graminis latati in historia Lugdunenfi
propositum sit, solum figuram veram spectandam
exhibemus.

X. GRAMEN pratense paniculatum maius an-
gustiore folio: ex radice capillacea, rufescente, fo-
lia capillacea, quædam brevia, quædam palmum

Gramen pratense paniculatum molle.



superantia, prodeunt: inter quæ culmi tenues, ge-
niculati; cubitum superantes, vno alterove folio
breui eincti, in quorum summo panicula leuiter
expansa, vtriusque quatuor longa, quæ ratione lo-
ci, strigosior vel latior: In pratis & dumeris ad ri-
pam Wieselæ fluminis apud nos reperitur.

Huic simile ad ripam prædictam inuenitur, po-
tissimum radicum capillarium, vt & caulium nu-
mero, paniculis & in ijs glumis longioribus,
variatis.

Gramen panicula multi-
plici.

XI. GRAMEN panicula multiplici: ex radice multis cirrhis villosis albicantibus composita, culmi plurimi, palmates, laeves, geniculati & recurui, folijs gramineis, oblongis, angustis vestiti, exurgunt, quibus panicula triuncialis angusta varie diuisa, per maturitatem rigida & spadicea, insidet. Montepessuli provenit; maius & minus reperitur, & gramen minus duriusculum vocatur.

GRAMEN aruense panicula crispa, cuius figura apposita, pro gramine à Matthiolo, gramine Xerampelino à Lobelio, gramine bulbofo Dalechampij in historia Lugd. describitur, figura non foeliciter expressa.

Gramen aruense panicula
crispa.

XII. GRAMEN montanum panicula spadicea, delicatesiore: Radice est alba, breui capillacea, culmis ternis, quaternis, geniculatis, pedalibus, vno alteroue folio cinctis, quae etiam ad radicem breuia & pauca sunt: in culmorum summo panicula triunciales, spadicei coloris, ex locustis minimis composita.

Hoc tamen variat magnitudine, cum & caule sesquicubitali & spica semipalmari inueniatur: provenit locis saxosis, maius quidem in monte

Crentzacho: minus vero in monte
Wasserfall dicto.

XIII. GRA-

Gramen paniculatum odoratum.



XIII. GRAMEN paniculatum odoratum: Radicibus candidis, geniculatis serpit: culmo est bicubitali geniculis paucis distincto folijs angustis, longissimis, paniculam superantibus, in acumen fastigiatis, suauem odorem spirantibus: cuius culmo panicula parua, leuiterque sparsa, à piore non rite expressa, infidet. Apud Borussos prouenit, & à Regio montanis gramen Mariæ di-

citur, quod in fasciculos collectum, propter odoris fragrantiam vestibus adijciunt, vt D. Vasmarius, qui plantam transmissit, perscripsit.

XIV. GRAMEN syluaticum paniculatum altissimum: ex radice repente fibrosa, calami duorum triumve cubitorum exurgunt, qui paniculas paruas sustinent, folijs est latis, cyperi æmulis. Hoc in syluis circa montem Belgardum prouenit, ex quo rustici chlamides pastorales, & torques equis aratra trahentibus, conficiunt.

XV. GRAMEN palustre panicula speciosa. Hoc ad bicubitalem altitudinem exurgit, calamo satis crasso: folijs est paucis pedalis latiusculis, per marginem asperiusculis, quorum aliqua tubuli instar, calamum media ex parte ambiunt: panicula est iubata sesquipalmari, ex elegantissimis, paruis & subrotundis laminellis composita. In humidis circa Parauum legimus: & in Hassiæ stagnis reperiri intelleximus.

XVI. GRAMEN palustre paniculatum minus. Ex radice crassa, fibris albicantibus, durioribus donata, calamus rotundus, striatus, cubitum superans exurgit, quem folia pallide virentia, latiuscula, pedalia, subaspera, inuestiunt: panicula palmari est, rara, ex locustis albicantibus, aristis oblongis armatis, composita. Hoc in dumetis humidis circa montem Crientzacensem prouenit: at in vdis Michelsfeldensibus, altius exurgit.

XVII. GRAMEN maritimum fluitans cornutum. Ex radice exili capillata, culmus tenuissimus, geniculatus, cubito longior producit: ex quolibet geniculo, folia iunceæ, communiter bina, culmum basilata, instar vesicæ, ambientia, in latus sparguntur, indeque cauliculus vnus aut alter educitur, & tandem in capitulum membranaceum finit, quod in foliola bina, terna, rarius quaterna, angustissima, in latus reflexa, & cornuta desinit. Tota planta, stagnis Mõnspeiensibus mari finitimis, innatat.

XVIII. GRA-

Gramen cristatum.



XVIII. GRAMEN spica cristata laui, vel gramen cristatum. Radicum capillamentis plurimis oblongis albicantibus abundat, quæ in vnum veluti cespitem coeuntia deorsum repunt: culmis est

pluribus sequicubitalibus, geniculis paucis donatis: folijs breuib; angustis, & circa caulem paucis, vncias quatuor vel quinque longis: spicam habet tenuem oblongam, pallide virentem, quæ galli cristas plurimas, vel semen capitis gallinacei dictæ plantæ refert, cuius nomine cristatum in Phytopinace appellare placuit: quod nomen & D. Lobelius in Aduer. parte alt. probauit, gramen cristatum Caf. Bauhini nominans. Prouenit in prato infra patibulum, aliquando ad mœnia Basiliensia.

Idem, sed spica elegantiore & densiore, in monte Wasserfall & Montepessuli obseruauimus: simile ei ex Anglia D. Lobelius, multis annis post, misit.

XIX. GRAMEN spica cristata subhirsutum. Hoc à priore differt, radicum capillamentis rufescentibus, culmistenuioribus, parte inferiore leuianugine asperfis & humilioribus: folijs longioribus: spica candicante, minus compacta, nec ita eleganter cristam exprimente: quod in dumetis circa Cliben copiose prouenit.

XX. GRAMEN spicatum angustifolium montanum. Hoc à gramine caryophyllato pratenfi differt folijs, quæ angustissima; cauliculis, qui in hoc tenuissimi, plures & longiores: & loco, cum hoc solum in montosis, Maio mense florens, proueniat.

XXI. GRAMEN syluaticum angustifolium spica albâ. Ex radice rufa, transuersa, fibræ capillares descendunt, & folia plura, capillacea, palmaria, etiam breuiora, rarius longiora exurgunt, vna cum culmis tenuissimis, ipsis folijs plerumque breuioribus, quibus spica vt plurimum simplex, candida, exiguis aristis donata, vnciam vix superans, insidet: quod in syluis humidis Hungenium reperitur.

GRAMEN

LIBER PRIMVS.

Gramen spicatum folio aspero.



Gramen caryophyllum montanum spica varia.



GRAMEN spicatum folio aspero, in historia Lugdunensi, nomine graminis spicati Dalecham-
pij proponitur, cuius figuram perfectam adpone-
re placuit.

XXII. GRAMEN caryophyllum nemoro-
sum spica multiplici. Radice est ex fibris capillaceis
rufescentibus composita, ex qua, tanquam ex ces-
pite, folia semipalmaria, etiam breuiora, Vetonice
caryophyllata similia, prodeunt: inter quæ culmi
quam plurimi capillacei, nudi, folia aliquando su-
perantes, spicas multas breuissimas & rufescentes
sustinentes, exurgunt. Hoc in vmbrosis & humidis
ad Birsam & Wiesam reperitur. Huic non mul-
tum dissimile, sed radice magis geniculata, in via
Richana ad sepes ad sinistram reperitur.

XXIII. GRAMEN caryophyllum monta-
num spica varia: Radicibus est paruis, fibrosis, ob-
longis, nigricantibus, ex quibus instar cespitis fo-

lia, aliquando palmum longa, angusta, vt in gra-
mine spicato caryophyllata folijs, prodeunt: inter
quæ culmi plures, tenues, folijs nudi, in summitate
spicam modo diuisam, modo compactam susti-
nentes. In nostræ vibi vicinis collibus reperitur.


XXIV. GRAMEN spicatum folijs & spicis hir-
sutis mollib. Radice est arundinacea transuersim
repente, paucis fibris capillata, ex qua culmi mol-
les cubitum superantes, folijs oblongis, angustis,
spicas superantibus, & molli lanugine aspersis,
quasi per tubulos transeuntes, exurgunt: quorum
summo spica angusta, vncias duas longa, mollis,
modo simplex, modo gemina, rarius triplex, alter-
natim disposita, infidet. Hoc in arenosis ad
Birsam reperitur.

(36)

B

XXV. GRA-

Gramen typhoides maximum spica longissima.



XXV. GRAMEN typhoides maximum spica longissima. Ex radice parua, nodosa, cui fibrae exiguae & plurimae adnatae, culmus exurgit rectus, testis cubitalis, internodijs rarioribus distinctus, qui in spicam rectam, teretem, palmarem, virentem in maturitate albicantem, tactu mollem, desinit, verticulis aristas oblongiusculas & copiosas exhibentibus. Inter fruteta circa Gappingam Ducatus Wirtembergici primum, dein non longe Basilea, in sepibus agrorum inter Michelsfelden & Huningen, & in salycetis Michelsfeldae legimus.

XXVI. GRAMEN phalaroides minus, siue Hispanicum: hoc folijs est oblongis, angustis, viridibus, quorum vnum vel alterum, culmus cubitales, tenuis, tubi instar cingit in culmorum summo spica Phalaridis similis, sed angustior, vncias tres longa, infidet nec radicem, nec semen vidimus: & no-

Gramen alopecuroides, spica aspera.



mine Phalaroidis alterius Hispaniae, D. Gillenius, transmisit.

XXVII. GRAMEN phalaroides spica molli, siue Germanicum: culmo est cubitali, prioris crassiore, vno alterove geniculo distincto: folio vno vel altero, eoque breui, culmum ambiente, cuius summo, spica biuncialis, prioris angustior, cinericei coloris, splendens & mollis infidet. Hoc Vlmenses, apud quod prouenit, à colore, Onocordon appellare, intelleximus.

GRAMEN alopecuroides, spica aspera, nomine Graminis echinati apud Lugdunensem describitur, quare solum figuram meliorem addere volumus.

XXVIII. GRAMEN tomentosum alpinum & minus. Ex radice parua inuili; calamus raro durantem superans, folijs duobus tribusve vestitus, exurgit

exurgit, cuius summitati pappus subrotundus infidet. Prouenit in Heluetia, in D. Bernhadi monte minore ad lacum: ex Rhoetia D. Burserus attulit.

XXIX. GRAMEN sparteum Basiliense, siue capillaceo folio maius. Ex radice fibrosa, culmi plures exurgunt, qui statim in folia capilli instar angustissima, in acumen molle fastigiata, palmum, saepe pedem altiora, absumuntur: nec paniculam, nec spicam obseruauimus. Tota planta insigniter vi- ret, & ex multis plantis simul iunctis cespes consti- tuitur: in paludibus Michelfeldæ prouenit: vltimi- hi anno præterito M. Hagenbachius, vna cum alijs Graminibus plurimis, ostendit.

XXX. GRAMEN sparteum Hollandicum, siue capillaceo folio minus. Hoc pro radice fibellas tenuissimas albas habet: folia copiosa, capillacea, pallida trium quatuorve vnciarum, inter quæ cul- mi tenuissimi, palmo altiores, vno alterove in- ternodio donati & pene nudi: efferuntur, qui pa- niculam pallidam diuisam sustinent: & commu- niter plures cespitem constituunt. Nominè Sparti Hollandici ex sylua Hagana D. Weckerlinus mi- sit.

XXXI. GRAMEN sparteum Monspeliacum capillaceo folio minimum. Radicem habet ex fi- bris albis, oblongis, capillaceis compositam: folia capillacea, vncialia: culmos tenuissimos, nudos, trium quatuorve vnciarum: paniculas paruas ex locustis minimis compositas & per maturitatem rufescentes. quod Monspelusi in agris æstiuo tem- pore reperitur.

XXXII. GRAMEN sparteum setas equinas referens. Hoc album est, & ex radice alba setatum instar, folia cubitorum quatuor longa producit, quæ forma, & tenuitate, & robore, caudam equinam,

eiusq; setas referunt: ex quibus Iauzinae incolæ, tapetia texunt. Cuius forte mentio fit in C. Clusij curis posterioribus, sub Herba, Sparto Hispanico non absimili.

Sic ex Insula Virginea, arboris cuiusdam cortex candidissimus, in pili tenuitatem diuisus adfertur, è quo incolæ pannos texunt: hunc corticem à D. Gillenio, Gramen vero à D. Salzmanno accepi- mus.

XXXIII. GRAMEN sparteum variegatum: hoc folijs est quatuor vel quinque vnciarum, rotun- dis, variegatis, quorum alternatim pars vna vi- ret, altera rubet: quod primo vere in Franckenhusijs montibus copiose reperiri, D. Iungermannus an- no 1602. scripsit, & colorem cultura mutare mo- nuit, spartiq; nomine, solum folia, misit.

XXXIV. GRAMEN foliolis iunceis breuib; maius, radice nigra. Ex radice capillata, nigra, folia iuncea, rarius duas tresve vncias superantia, pro- deunt: inter quæ culmus tenuissimus, pedalis, læ- uis, cuius summo glumi minimi, quemadmodum in gramine exili duriore alternatim dispositi sunt: ad mœnia vrbis nostræ legimus.

XXXV. GRAMEN palustre iunceum racemoso semine: folijs est paucis iunceis, culmo cubitali, ex cuius summitate, inter bina foliola, veluti racemus paruus propendet: in aquosis circa Francofurtum ad Oderam D. Fleissnerus collegit, & anno

1605. communicauit.

☉(;)☉

*Gramen iunceum folio articulato
aquaticum.*




GRAMEN iunceum folio articulato aquati-
cum: etsi pro aquatico altero à Lobelio, aquatico
à Tabernamontano pingatur, verum cum folio-
rum articuli non exprimantur, nouam pro Thea-
tro nostro sculptam, addere visum fuit: & cum post

*Gramen iunceum folio articulato cum
vtriculis.*



feniseeum, caulis palmaris exurgat, cui raro capi-
tula corymbacea insident; sed vtriculi vnicales pa-
leacei; in capillamenta filci, modo virides, modo
purpurascens; idcirco figura exprimi
curauimus.

Gramen montanum iunceum capite
squamoso.



XXXVI. GRAMEN montanum iunceum
capite squamoso: Radice est parua, fibrosa, circa
quam folia bina, ternave semipalmaria: culmus
iunceus, læuis, enodis & nudus, pedem superans:
cuius summum capitulum instar Phalaridis squamo-
sum in apicem desinens, ex albo leuiter rufescens,
insidet, cui vtriusque foliolum rigidum subijcitur,
quorum longius, vnciam superans, deorsum ver-
git, alterum quod triplo breuius, recta effertur. In
Baldi montis summitatibus legimus.

XXXVII. GRAMEN iunceum minimū capitulo
squamoso: Radi ulq̃ capillares sunt, folia pauca ca-
pillacea, vnciarum fere duarum, inter q̃ culmi vn-
ciarum quatuor vel quinque exurgunt, in quorum
fere summo capitulum vnicū minutissimū squa-
mosum rufescens, cui culmi apex supereminet. In
aquosis circa Altorffium Noricorum, vnde D.

Doldius misit: & Francofurti ad Oderam, pro-
uenit.

XXXVIII. GRAMEN iunceum minimum
alterum: a priore differt potissimum capitulis, quæ
& summo cauliculo insident, & squamosa non
sunt: in fossis Patauinis, aqua defluxa, reperi-
tur.

XXXIX. GRAMEN iunceum minimum ma-
ritimum. Tota planta dodrantem non superat, ces-
piti similis, ex cuius singulis radiculis, singuli cau-
liculi exurgunt, foliolis capillaceis paucis cincti,
qui exiguis vtticulis donantur: hoc in Zeclan-
diæ maritimis ad oppidum Gous, D. Gillenius col-
legit & transmisit.

XL. GRAMEN cyperoides latifolium spica
spadiceo viridi maius: Radice est oblonga multi-
plici, rufa mire capillata, caulibus triangulis, cubi-
to minoribus: folijs arundinaceis, pedalibus, &
quā in vulgari angustioribus: spicis ternis, qua-
ternis, rarius quinis, alternatim succedentibus, an-
gustis, trium quatuorve vnciarum longis, coloris
spadiceo-viridis, quarum primæ semper folium
oblongum angustissimum subiicitur. Hoc in hu-
midis ad Sellam nouam Monspeffuli primum vi-
dimus: dein ex Lutetia, a D. Franco Graminis Spra-
waldensis nomine accepimus.

XLI. GRAMEN cyperoides angustifolium spi-
ca spadiceo-viridi minus: Radice est breuiore, li-
gnosiore, parum fibrosa, & rufa: caule triangulo,
pedali: folijs angustis, duris, semipalmaribus, in a-
cutiæ desinentibus: spicis aliquot angustissimis, ob-
longis, spadiceo-viridibus, alternatim dispositis, &
pediculis longis capillaceis insidentibus, quod A-
prili mense circa Birsam reperitur: Aliquando ta-
men altius exurgit.

XLII. GRAMEN cyperoides spica pendula
longiore & angustiore. Caule est cubitali, angulo-
so, striato, folijs oblongis, angustis, basi oblonga,
caulem instar tubi vestientibus, ex quo veluti tu-
bo, spica singula, vncias quatuor vel sex longa,
angusta, prodeunt & propendent, ipsum vero fo-
lium cuiuslibet spicæ subiectum, oblongum est. Hoc
locis humidis circa Thermas Apponenfes Pataui-
norum crescit.

XLIII. GRAMEN cyperoides spicis minori-
bus minusque compactis. Ex radice fibrosa, ligno-
sa tamen, folia prodeunt angusta, graminea pal-
mum longa, inter quæ caulis sesquicubitalis, tri-
quetrus, tubas per, & magna ex parte nudus exur-


gittin cuius summo, spica parua diuulsa, & quasi aculeata consistit, quæ semina oblonga, subnigra, in aculeatum cuspidem desinentia, continet.

Huius tres differentias notauimus: 1. est latioribus & longioribus folijs, spicis maioribus, & ad riuulum molendinarium vrbs nostræ trans Rhenum reperitur. 2. à priore rarioribus & minoribus spicis differt, & in via Riehana ad sepes crescit. 3. folijs est angustioribus, breuioribus, spicis inter duas priores medijs, quod Patauij locis humidis anno 1578. collegimus, & cum D. Guilandino ostendissemus, Ischæmon Plinij censuit, quod non probamus: idem sed per omnia minus anno 1579. Monspeffuli in humidis inuenimus, quod gramen cyperoides nominabant.

XLIV. GRAMEN arundinaceum plumosum album. Radice & folijs est arundinaceis, & in arundinis altitudinem excrecit: caule anguloso albo, paniculam arundinaceam, ramosam, palmarem, albam, mollem, splendentem, instar serici albi sustinet. Non longe Monspelio, circa Perault & Magolanam reperitur.

XLV. GRAMEN nemorosum paniculis albis capillaceo folio: cespitis instar gramen hoc existit, quod ex radicibus capillaceis, folia copiosa, viridia, pilis tenuissimis similia, pedem longa, emittit: inter quæ culmi tenues geniculati, cubitales, aliquando sesquicubitales, pene nudi, in paniculam rariorem albicantem, palmo minorem, ex glumis paruis aristis donatis compositam, abeunt: in Querceto non longe Michelsfelda copiose prouenit.

XLVI. GRAMEN holosteum alpinum minimum: Tota plantula uncias tres non superat, folijs capillaceis vncialibus, cuius culmis capitula paleacea insident, copiose in Heluetia, in S. Bernhardi monte minore, prouenit.



Gramen hirsutum latifolium minus iuncea
panicula.

GRAMENTS hirsuti differentia sunt plures:
est latifolium maius ab alijs descriptum: est minus
iuncea panicula, magnitudine potissimum à prio-
re differens, cuius figura adposita: est & capitulis
psyllij, quod exile hirsutum cyperoides Lobelio

Gramen hirsutum capitulis
psyllij.

dicitur, cuius hic exactior figura exhibetur, est de-
nique hirsutum angustifolium maius hic descri-
ptum, & minus, quod gramen Leucanthe-
mon in histor. Lugdun.
dicitur.

Gramen hirsutum angustifolium
maius.

XLVII. GRAMEN hirsutum angustifolium maius. Ex radice exigua fibrosa, rufescente, culmus vnicus, cubito altior, vt plurimum laevis, exurgit, in cuius summitate panicula alba, mollis, leuiter sparsa, ex multis laminulis composita, in quarum qualibet semina minuta, subnigra & subrotunda: folijs est paucis, angustis, palmaribus & villosis (sculptor in pilis exprimendis lapsus est). aliquot culmum cingentibus: ipsi vero paniculae, vtrinque folium tenuissimum subijcitur, quorum alterum panniculam superat, alterum non adaequat. Prouenit in nostris paludosis pratis Michel-feldensibus.

Gramen spica subrotunda
echinata.

XLVIII. GRAMEN spica subrotunda echinata, vel gramen echinato capitulo. Radice est capillacea, alba, folijs paucis angustis, tactu subasperis, duarum, triumve vnciarum, inter quae culmi festucarum, instar laeues, vno alterove folio cincti, prodeunt: & quidem terni, vel quaterni, sed altitudine inaequales, alter enim, duarum, alter trium quatuorve: alter sex vnciarum: quibus singulis capitulum vnicum, instar tribuli echinatum & spinosum, insidet: flores & semina non obseruauimus.

Hoc locis sterilibus circa Monspelium crescit: idem sed maius ex Hispania D. Albinus attulit, quod videtur clariss. Columnæ, gramē echinatum tribuloides appellasse.

XLIX. GRAMEN spica plana echinata. Plantula palmaris est radícula ex fibellis albis composita,

sira ex qua foliola capillacea, pauca, vnciam longa, & festuca tenuissima, prodeunt: spicam habet vnciale, planam, quæ ex vtriculis minutissimis aristas acutas emittit: ex Hispania D. Albinus attulit.

L. GRAMEN montanum panicula miliacea sparsa. Ex radice fibrosa rufescente, folia pauca, angusta, vncias quatuor vel quinque longa, vna cum culmo tenuissimo cubitali, vno alterove folio vestito, exurgunt, in cuius summo panicula sparsa, ex locustis minutissimis composita: in monte Cretæ acenssi prouenit.

L. I. GRAMEN arundinaceum panicula miliacea: Ex radicibus fibrosis albis, vnus & alter culmus cubitalis exurgit, quem parte inferiore folia arundinacea vnciarum trium cingunt ad partem su-

pernam duobus nodis distinctam, folia duo angustiora, longioraque vestiunt: in cuius summo panicula trium vnciarum, milij paniculæ similis: in agris Patauinis reperitur, & à gramine miliaceo à Lobelio proposito, plane diuersum est.

L. II. GRAMEN arundinaceum Sorghi panicula sparsa. Hoc culmis est cauis, magna ex parte reclinatis, ita vt capillaribus radicibus terræ affigantur, qui folia (quæ longiora & angustiora quam in priore) veluti per tubum transeunt, & in summo paniculam fere palmarem, sparsam, paruis vtriculis donatam, sustinent. Locus natalis memoria excidit.

Gramen latifolium spica triticea compacta.



Gramen angustifolium spica tritici muticæ simili.



C

LIII. GRA-

LIII. GRAMEN latifolium spica triticea compacta: Culmo est sesquicubitali, vno altero veneniculo distincto, folijs frumentaceis, pedalis; spica triticea, palmari, lata, glumis acutis carente: Basileæ, ad agrorum margines.

LIV. GRAMEN latifolium spica triticea diuisa. Hoc à priore, spica potissimum differt, quæ in spicis distinctas & angustas diuisa est, & tibi inuicem alternatim in culmo subsequuntur, quarum utriculi brevissimis aristis armantur: in Italia ad agrorum margines.

LV. GRAMEN angustifolium spica triticea compacta: Hoc folijs est angustioribus, sesquipalmariibus rigidis, acuminatis & albicantibus: culmo læui rotundo, striato, sesquicubitali: spicis palmaribus, compactis: utriculis rigidis & acuminatis. Basileæ, ad sepes locis aridioribus extra portam Blasianam.

LVI. GRAMEN angustifolium, spica triticea mutica simili. Radicibus oblongis, geniculatis, nodosis candidis serpit: culmis est sesquicubitalibus, rotundis: folijs iuncis, oblongis, duris, in acumen fastigiatis: spica oblonga triticea, ei Tritico, quod alijs spica mutica dicitur, simili: glumis paucis, oblongis, aristis carentibus. Locis arenosis circa Basileam, vrad Cliben provenit. Weizengras appellare libet, quod in Phytopince sub gramine arundinaceo spica triticea posuimus, & Lobelius in Catalogo Graminum, quem aduers. p. 2. addidit, gramen frumentarium, segetaleue triticeum, siue triticea spica Cal. Bauhin. nominat.

LVII. GRAMEN spica secatina: ipsi Secati filimilum: calamo est tricubitali, læui, geniculato & pallente: folijs paucis longiusculis: spica vncias quatuor longa, oblongis aristis armata: quod Basileæ, in agris frumentaceis frequenter reperitur.

Gramen spica brizæ maius.



Gramen maritimum panicula lobiacea.



LVIII. GRAMEN

LVIII. GRAMEN spica brizæ maius. Radicibus & culmis est frumentaceis, folijs angustis, spicis palmaribus, multiplicibus, vtriculis aristis breuibus armatis, flosculis, vt in tritico, luteolis. Tota planta ad viri altitudinem assurgit, & apud nos locis accliuibus ad Rheni ripam, & ad montis Crenzacensis ascensum prouenit.

LIX. GRAMEN spica brizæ minus: Tota planta palma minore est, radice exili, fibrosa, foliolis ad radicem breuibus, mollibus, canescentibus, spica vnciali, q̄ modo simplex, modo gemina & terra, vtriculis aristis armatis: in agris Monspelienf. D. Saltzmannus legit.

LX. GRAMEN loliaceum latifolium spica angustiore: Ex radice alba, arundinacea, fibrosa, culmi aliquot bicubitales exurgunt, folijs paucis, latiusculis, oblongis cincti, quorum summo spica angusta, vncias quatuor vel quinque longa, Phœnici vel Hordeo marino similis. Basileæ circa Cliben, longioribus & breuioribus folijs varians, reperitur.

LXI. GRAMEN loliaceum minus, spica simplici: Ex radice capillacea, cauliculi plures, rotundi, duarum vnciarum, & et semipalmares, folijs paucis, angustis & breuibus cincti, exurgunt, quibus spica duarum vnciarum, angusta, lolio similis, insidet: in agris Monspelienfibus frequens est.

LXII. GRAMEN loliaceum minus supinum spica multiplici. Hoc maiori ex parte repit, & cauliculus est multis, vnciarum quatuor, folijs paucis, & spica multiplici, cuius vtriculis semen paruum oblongiusculum includitur, & hoc apud Monspelienf. prouenit.

LXIII. GRAMEN maritimum panicula loliacea. Ex radicibus capillaceis, cauliculi plures, rotundi, recurui, altitudine impares, palmo inferiores geniculati, folijs paucis, angustis, oblongis cincti, exurgunt, panicula loliaceam, triū quatuorve vnciarum, sed ramosam, sustinentes: locis maritimis circa Monspelium, vnde D. Saltzmannus attulit, prouenit.

LXIV. FESTVCA graminea glumis vacuis. Ex radicibus fibrosis simul iunctis, culmi aliquot geniculati, pedales, ad radicem lanugine pabescences, folijs angustis, paucis donati exurgunt, qui glumos plurimos, læues & vacuos, filamentis tenuissimis adpendentes, partim virides, partim spadiceos, aristis oblongis donatos, sustinent: hæc apud nos in tectis & muris crescit: & cum glumi longis filamentis adpensi sint, facile à quouis vëto agitati, tremunt, hinc Monspelienfibus gramen tremulum dicitur.

Hæc aliquando, apud eosdem, glumis paucioribus

& aristis longioribus & recuruis in agris reperitur, & festuca graminea aristis incuruis, nominari pot.

LXV. FESTVCA graminea effusa iuba. Hæc altius exurgit, caule viridi & rotundo, qui in iubam pedalis longitudinis effunditur, cui glumi angustiores & longiores, breuibus aristis cincti, pediculis capillaceis, oblongis insident, qui per maturitatem albicant inter segetes reperitur.

LXVI. FESTVCA iuncea folio. Ex radice parua, fibrosa, alba, folia pauca, iuncea, semicubitum longa, vt & culmus rotundus, cubitalis exurgit, qui in paniculam auenaceam, sed angustiore, albam, angustam, desinit, quæ ex oblongo folliculo (à folio constituto) paniculam longe superante, prodit: cuius glumi rari, aristis longissimis & argenteis donantur. In Valesia ad paludem vrbs Sedunenf. copiose prouenit, vnde D. Burserus nobis attulit.

LXVII. FESTVCA iuncea folio spica gemina. Hæc culmo est sesquicubitali, rotundo, geniculato & ramoso, cuius summitati spicæ, vix vnciam longæ, molles, rufescentes, aristis oblongis armatæ, Ischemo gramine villosi similes, insident, & semper duæ simul, vni oblongo pediculo insidentes, iunguntur: folia habet iuncea, longa, inordinate disposita: locus natalis excidit.

LXVIII. FESTVCA pratensis lanuginosa: ex radice capillacea, rufescente, folia multa, angusta, pedalia, vna cum culmis tenuibus, bipedalibus, foliaceis, molli & pauca lanugine (culmi potissimum) aspersit, exurgunt: spica est oblonga, angusta, ex glumis oblongis, aristis donatis composita, & quasi in paniculam parua expansa. Basileæ passim in pratis.

LXIX. FESTVCA dumerorum. Ex radice capillacea nigricante, culmi plures geniculis distincti, paucissimis pilis aspersi, duorum triumve cubitorum, folijs oblongis, angustis cincti, exurgunt, in quorum summo spica oblonga, locustis raris, oblongis, cauli proximis, & aristis armatis constans: Iulio mense, in dumeris circa Birsam, verum etiam in vepribus, locis siccoribus, prouenit.

LXX. FESTVCA dumerorum angustissimis & pilosis folijs: Radix est albicās, ex durioribus fibris composita: ex qua calami aliquot tenues, vno alterove geniculo distincti & pene nudi, exurgunt: folia sunt breuia angustissima, læui molliq; lanugine hirsuta: calamorum summitati velut panicula, ex spicis pluribus composita, quarum quilibet capillaceo pediculo insidet, multis glumis aristatis & candidantibus constans: prouenit in dumeris circa Cliben.

Gramen montanum auenaceum locustis rubris.



LXXI. GRAMEN montanum auenaceum locustis rubris: Ex radice tenui, repente, alba, fibris capillaribus vtrinque donata, culmus simplex, lanis, pene cubitalis (rarius ex vna radice plures exurgunt) circa radicem purpurascens, qui quasi in spicam tenuem definit, cuius glumi ut plurimum ab vna parte siti sunt, & foris ex nigro purpurascunt, intusque albi sunt, in quorum medio vtriculus parvus, candidus, pedicello donatus, semen minutum continet: folijs donatus paucis, angustis, acuminatis, circa radicem breuibus, at circa culmum, quem duo triaue cingunt, longioribus, communiter spicam superantibus. Iulio & Augusto, hinc inde in montosis & umbrosis, ut circa arcem Richenstein, in monte Mureto Basileensium, & monte Crenzacensi reperitur.

Gramen auenaceum lanuginosum glumis rarioribus.



LXXII. GRAMEN auenaceum lanuginosum glumis rarioribus. Ex radice fibrosa, folia iunce oblonga, & culmi plures, iuncea, cubitum superantes, paucis folijs donati, exurgunt, in quorum summo glumi rariores, albi, lanuginosi, vtriculus continentes, quibus semen nigrum, splendens, inclusum est: locis asperis circa Monspelium prouenit: diuersum est a Gramine montano, avena semine Clusij.

Gramen glumis varijs.

Iuncus acutus capitulis Sorghi.



DE IUNCIS.

CAPVT II.

LXXIII. GRAMEN glumis varijs: Ex radice
 crassa, membrana alba rugosa intacta, caules bini,
 ternive, pedales, fragiles, laeues exurgunt, quorum
 summo spicae similis panicula vncialis, ex glumis
 varij coloris, insidet: folia plura ad radicem angu-
 sta, palmaria, saturate virentia: locis montosis,
 circa Montembelgardum prouenit,
 vnde à fratre p. m. accepi-
 mus.

IUNCIS differentias viginti quatuor in Theatro
 proposituri, paucashic apponemus: præmissa fi-
 gura Iunci acuti capitulis Sorghi, qui Iuncus mari-
 timus primus, aduersariorum auctoribus & Iun-
 cus rotundus alter, Cæsalpino dicitur: cum
 huius figura à nullo fuerit ex-
 pressa.

Iuncus acutus maritimus caule triangulo.

I. *IUNCUS* acutus maritimus caule triangulo: Radice est repente, fibrosa, à qua aliæ radiculae, prioribus exiccatis, nascuntur: hinc caules, quos ad radicem breuia folia cingunt, pedales, trianguli exurgunt & in extremitatem pungentem desinunt; infra quem à latere floccus racemosus, rufescens exit. Hic in litore Veneto, & à Perault via qua Monspelio ad mare itur, provenit: & ad Danubium Lintzj D. Barserus legit.

II. *IUNCUS* exiguus montanus mucrone carens. Radice est pusilla, nigra, capillacea, cauliculo quatuor vel quinque uncularum, cuius summo capitulum paruum, ex fusco purpurascens, quadrifidum, in exiguum rigidiusculum filamentum abiens; infidet: foliola ad cauliculi principium tria, iunceae, unciam longa: in Taurero Rastadiensi, D. Barserus eruit.

Iuncus acumine reflexo trifidus.

III. *IUNCUS* inutilis, siue Chamæschænos: hic radice est fibrosa, & pro plantæ magnitudine, cum unciam vix superet, satis crassa, folijs est tribus quatuorve iunceis. Tiguri propela eum Felinum, Maio mense Ioan. Bauhinus p.m. collegit, & à C. Gesnero, ipsi Chamæschænos nominatus fuit.

IV. *IUNCUS* acumine reflexo alter: caule est sesquicubitali, rotundo, laevi, aphylo, panicula umbellæ simili: atro splendente, pediculo carente, filamentis cæruleis, ut in Aphyllonthe, donata, quam caulis duarum triumve uncularum, acutus, sed mollis, parumque reflexus superat: in Prouincia Galliae provenit.

V. *IUNCUS* acumine reflexo trifidus: Ex radice nigra, geniculata & fibrosa, iunci plures, tenues, palmum superantes exurgunt, qui in summo intres, rarius quatuor stylos, tenuissimos, trium quatuorve

morve vnciarum, diuiduntur, in quorum summitatibus, post iunci diuisionem, panicula parua locata sunt. In monte Fracto Lucernatum, in Pyrenæis & montibus Morauia provenit.

Iuncus alpinus capitulo lanuginoso.




VI. IUNCCELLVS capitulis equiseti fluitans: Ex radiculis capillaceis, iuncus recurvus tenuissimus prodit, qui in plures iuncellos duarum triumve vnciarum subdividitur, quorum aliqui erecti,

aliqui reflexi, capitulum minimum sustinent, & iuncellis singulis foliolum tenue capillo ceu adponitur. In aquosis Angliæ fluitat, vnde D. Gillenius attulit.

VII. IUNCVS alpinus capitulo lanuginoso: Radice est subnigra, tenui, fibrosa, ex qua aliorum iuncorum more, loco foliorum, quasi styli tenues, recti, rotundi, & quidem plurimi, in læue acumen vergentes, longitudine dispari, quorum longissimi, vix palmares sunt, & ad radicem rufescunt: & subhirsuti sunt: inter quas caulis vnicus, strictus, ad spithamæ, plus minusve, altitudinem exurgit, cui capitulum vnicum, oblongum, molle, lanuginosum, haud multum leporum caudæ dissimile, insidet: cuius nomine *χοινολεσפור* in Phytopinace appellauimus: in montosis Harcyniæ provenit, ad acidulas, inter fontem acidum Ribelsæ & Griessbach, vbi Iulio mense Io. Bauhinus p.m. collegit, & nomine Iunci alpini cum cauda leporina misit.

VIII. IUNCVS alpinus bombycinus: Ex radice aliorum iuncorum simili, folia iunceæ exurgunt, inter quæ culmi plures tenuissimi, palmo minores, qui capitulum paruum, lanugine alba ornatum, sustinent. In montibus Morauia loco dicto Kessel, D. Fleisserus eruit, & communicauit.

IX. IUNCVS floridus minor: Radice est candida, geniculata, fibris plurimis adhaerentibus: caule palmari, folijs ternis, iunceis, oblongis, acutis, duobus caulem superantibus, cuius summo, singulis pediculis, qui quini sunt alternatim sibi succedentes, flores (quos non vidimus) insident, quos fructus gemini rotundi Orobi Cretici magnitudine sequuntur. In palustribus Heluetiæ circa cœnobium Eremitanorum, & in monte Fracto ad lacum Pilati Lucernarum, D. Burserus observauit.



Cyperus rotundus inodorus Germanicus.



DE CYPERO.

CAPVT III.

CYPERVS longus inodorus syluaticus: Radices habet oblongas, geniculatas, rufescentes, folia plura, palmaria, viridia, angusta, subaspera, ad principium membrana rufescente simul vestita: caulem hactenus nullum obseruauimus, in syluosis, montosis, humidis, vt in monte nostro Muteto, prouenit.

CYPERVS rotundus inodorus Germanicus, sub aquatico septentrionalium à Lobelio descriptus, cum non recte sculptus sit, figuram exhibere debuimus.

DE SPARGANIO.

CAPVT IV.

SPARGANIUM minimum: plantula est vnciarum quatuor; nam radícula ex fibellis oblongis componitur, vnde cauliculus vnciarum duarum effertur, & in capitulum exiguum subrotundum, cui aliud minus insidet, herbacei coloris & formæ, quemadmodum in sparganio maiore, desinit: circa quem folia vtrinque quaterna, vel quina, angusta, caulicum superantia. Plantulam hanc D. Furetus, anno 1617. transmisit, his ascriptis: Sparganium minimum & semestrale, Northusij in lacunis quibusdam cœnosis, quarum partes superiores per æstatem exiccantur.

DE EQUISETO.

CAPVT V.

I. EQUISETVM palustre linariæ scopariæ folio: Ex radice repente geniculata, caulis rotundus, calami in modum inanis, geniculis distinctus, cubitoque altior assurgit: folijs ad genicula pluribus, linariæ vulgaris folijs latioribus, & linariæ scopariæ similibus, viridibus, oblongis, fragilibus, subasperijs: iulos in cacumine non obseruauimus, licet quandoque velut in ramos diuidatur. Basileg, in paludibus Michelfeldensibus, & etiam in iuuulo iuxta patibulum, reperitur.

II. EQUISETVM palustre minus polystachio: Radice est repente, geniculis distincta, caule tenui, cubito minore, geniculis crassioribus articulato, folijs, aut potius geniculatis cirris, ad articulum vtrinque ternis, vel quaternis, iunceis, palmatis, quibus pene singulis minuta spica iuli instar insidet: caulis vero iulum oblongum, minus compactum, flosculis pallidissime rubentibus donatum, sustinet: in aquis Michelfeldensibus.

III. EQUISETVM palustre tenuissimis & longissimis setis: Culmo est inani, bipedali, geniculis pixidatim coherentibus articulato, cum cæteris conueniens, exceptis folijs, siue setis iunceis, longis, multoque tenuioribus: in palustribus Michelfeldensium.

IV. EQUISETVM nudum minus variegatum Basileense: Ex radice, parua nigra, transuersa, non-nihil

nihil capillata, cauliculi plures, inæquales, rarissime pedales, communiter palmares, semipalmares & multo breuiiores, striati, pallide virentes, geniculis parte inferna nigris, superne albidis, articulati: folijs carentes, & caui: in quorum summitatibus capitulum breuissimum iuli instar insidet, quod à corona alba, ex octo, nouem, etiam duodecim foliolis acutis composita, sustentatur: & quando pedibus calcatur, crepitat. Prouenit ad ripam Rheni, iuxta locum die Baar dictum. An Gesnerus libello de stirpium collectione, hoc intellexit? dum inquit: Hipparis lacustris quædam, folijs mansuarenosis, in fine Iulij floret, uti puto: plura non habet.

Equisetum fœtidum sub aqua
repens.



V. Equisetum fœtidum sub aqua repens: Radice est fibrosa, caulibus tenuissimis, rotundis, per obliquum, ut Saccharum penidium, striatis, geni-

culatis, fragilibus per terram sparsis, quandoq; cubitalibus, in plures cauliculos brachiaris, folijs aliquot breuibus, in breues apices distinctis, ad genicula iunctis. Tota planta fragilis, quæ aquis cœnosis dū innatat viridis est, at extracta & exiccata, incana & friabilis, ita ut non solum digitis in puluerem comminui possit sed sponte in puluerem abeat. Odor est lutosi & sulphurei. Solum in aquis cœnosis demersum reperitur, quod primum Patavij in fossis Thermarum Aponitarum: dein non longe Lucerna: tum Basileæ cis pontem Birsæ, Michelsfeldæ & Hunnigæ, in fossis observauimus.

DE ARVNDINE SIVE CALAMO.

CAPVT VI.

I. CALAMVS aromaticus Syriacus: Ex radice incutit, trium, quatuorve vnciarum longa, summo capite nonnihil extuberante & in paucas fibras desinente, caulis (modo vnus, modo plures) fere bicubitalis, rectus, rotundus, lauis, fragilis, multis geniculis distinctus, exurgit, qui intus cauis, spongiosus & membranula (quasi tela alba subtena) uti harundines præditus, qui assulatim frangitur, & in plures ramos diuiditur, hiq; in tenuissimos subdividuntur, ad modum Ligustri Ægyptiaci Alpini, vel Lentisci Perauiani siue Molle Clusij: qui flores paruos, foliaceos, plurimos, singulis tenuissimis pedicellis insidentes, sustinent, ex quorum medio apex styli instar prodit. Folia pauca, semper bina ex aduerso ad singula genicula sita, caulem amplectuntur, vnciam lata, sesquiunciam longa, nervi aliquot per longum excurrentibus. Caulis sapore est aromatico, valde amaro, quo in Theriaca pro calamo vimur. Huius caulis partem anno 1579. à D. Paludano ex Ægypto reduce, Patavij accepimus. Verum cum totam plantam à D. Deldio habeamus, breuem eius descriptionem (cum ab alia non proponatur) adijcere lubuit.

II. ARVNDO Anglica folijs in summitate distinctis: Hæc folijs est cubitalibus, duarum triumve vnciarum latis, nervis aliquot, per folij longitudinem excurrentibus & eleuatis: folijs in summo in duos, tres & quatuor apices diuisis: hanc D. Cargillus ex Anglia misit.

III. ARVNDO Indica latifolia flore luteo punctato: Ex radice nigricante, nodosa, & fibris crassioribus donata, alijsque nodis adnascens, caules

caules plures setquicubitales, crassi, arūdinis instar nodosi, prodeunt, circa quos folia pallide virentia expansa, lata, in acumen desinentia, nervosa & tenuia: quæ, cum primo ante caulium exortum nascuntur, corniculorum chartaceorum modo conuoluta existunt. Cauli, flores, gladioli floribus forma similes, coloris lutei, punctis aspersis variegati, capitello hirsuto inhaerent, quod flore delapso augetur, subasperum fit, & semen nigrum, subrotundum continet. Hæc vt omnibus sui partibus, ita & semine minor est, quam ea quæ florem minij, coloris habet. Hanc in horto habemus, in olla colimus hyberno tempore in cellam reponimus, quæ pri-

mo vere plures caules, antiquis relictis profert, & Julio mense floret.

DE SECALE.

CAPVT VII.

SECALE latifolia: Culmis exurgit candicantibus, rotundis, striatis, quibus spica palmum longa, crassa, aristis longissimis, & vt in vulgari tenuissimis denticulis exasperatis armata, insidet: folia habet cubitum longa, vnciam lata & per marginem leuiter exasperata: grana non vidimus: spicam & folia ex horto Nobiliss. Contareni, Senatoris Veneti, habemus.

LIBER SECVNDVS.

DE GLADIOLO.

CAPVT I.


GLADIOLVS angustio gramineo folio: pro radice bulbum geminum habet, vnum alteri insidentem, caulem lauem, teretem, pedalem: folia binatave, graminea, angustissima, striata, mucronata, palmaria: flores ternos, quaternos, pallide rubentes, supra se inuicem ad caulis summum vtrinque, ex sex folijs oblongis commissi: quibus vt in cæteris, folliculi semen paleaceum continentes, sed minores, succedunt. Ex Hispania D. Albinus, in Murana collectum attulit.

DE HYACINTHO.


CAPVT II.

HYACINTHVS minimus maritimus: Totâ plâta vnciarum sex est: ex bulbulo paruo ob-

longo, cortice villoso tecto, cauliculi duo vel tres nudi, inter folia angustissima exurgunt, quibus capitula minuta, rotunda, sursum porrecta insident, flosculis minutis cæruleis, quibus veluti siliquæ oblongiusculæ, semen minutum continentes, succedunt: Monspeßuli in litore maris anno 1595. D. Gallus collegit: eundem & loco eodem, sed vncias tres non superantem, D. Weckerlinus anno 1615. eruit, & communicauit.



Narcissus angustifolius albus minor.



DE NARCISSO.

CAPVT III.

I. NARCISSVS angustifolius albus minor: Ex radice bulbosa, tunica subnigra tecta & paucis fibris capillata, folia bina vel terna oblonga, angusta, porracea exurgunt: inter quæ cauliculus palmaris, cuius summo bini flores, parui, albi, calice oblongo, angusto donati, insident: non longe Monspelio in saxosis & montosis reperitur.

II. PSEVDONARCISSVS gramineo folio, siue Leuconarcissus æstiuus: Ex radice, oblongum, angustum bulbum imitante, exiguis capillaceis fibris prædita, membrana fusca tecta, folia bina, cruceis æmula, oblonga, exurgunt, quæ sæpe cauliculum superant, qui nudus, tenuis, trium, quatuor, quan-

doq; quinq; vnciarum, quifoliolis ternis, quaternis, breuissimis cinctus florem vnum stellatum, intrinsecus albicantem, extrinsecus venis purpurascens, variegatum, ex foliolis sex compositum, sustinet: in cuius medio caliculus breuissimus, in stylum abiens, quem staminula apicibus candidis donata, cingunt, cui capitulum triquetrum, semen continens succedit: In alpibus Helueticorum & Rhetorum, vt monte Spligel & ad Thermas Fabarias, Iulio mense floret: sed & Augusti fine, in Tauero Austriæ monte, D. Burserus eruit.

DE ALLIO.

CAPVT IV.

I. ALLIVM iunci folium bicorne luteum: ex bulbo oblongo, capillaceo, tunica alba vestito, caulis rotundis, palmo altior, folijs iunceis duobus tribusve vestitus, exurgit, umbellam paruum luteam sustinens, cuius flores singuli, filamentis oblongis insident, ex sex foliolis luteis compositi, in quorum medio staminula totidem, & in medio stylus, quibus capitula trigona, semen continentia, succedunt: ipsi vero umbellæ, foliola duo angustissima quorum alterum communiter longius, in latus expansa, subiiciuntur. Monspelio D. Saltzmannus attulit, & D. Burserus in Austria prope Stain & Baden, eruit.

II. ALLIVM montanum minus: ex radice parua, aliquantum nodosa & fibrosa, cauliculus vnus & alter tenuissimus, nudus, trium, quatuor, etiam sex vncias altus, inter folia oblonga, angusta, exurgit, qui capitulum minimum (quod apertum non vidimus) sustinet: in petra circa Oenipontem reperitur.

III. ALLIVM montanum radice oblonga: priori simile, sed caule altiore & folijs longioribus, capitulo rotundo pallide purpurascens, floribus ex foliolis sex, totidemque staminibus composito, non longe Monspelio, loco montoso, qui Hortus Dei dicitur, obseruauimus: quod forte Allium montanum siue Petroselinon Gesneri in libro de Herbis.

Moly moschatum capillaceo folio.



DE MOLT.

CAPVT V.

I. *MOLY* Affricanum umbella purpurascens: ex radice bulbosa, caulis (modo vnus, modo plures) cubito altior, nudus & cauus, vna cum folijs aliquot latiusculis, in acutum desinentibus, palmaribus & etiam sesquipalmaribus, per marginem, instar graminis hirsuti, pilosis: umbella, caulis summo insidet, cuius flores communiter ex quinque foliolis, dilute purpurascens, pediculis oblongis & firmis insident: quibus vesicula, duotriue semina nigra rotunda includens succedit. Odore est Allij grauiore. Hoc Argentina à D. Meyero acceptum, in horto ab aliquot annis alius.

II. *MOLY* moschatum capillaceo folio: bulbo est paruo, oblongiusculo, rufescente & veluti reticulato cortice tecto, ex quo cauliculus tenuis, palmaris, rarissime pedalis emergit, circa quem folia iunceae vel potius capillaceae, sed sine ordine, quæ modo vnciam, modo tres quatuorve vncias longa (quæ nimis lata in figura exprimuntur) cauliculi summo pedicelli quini, seni, septeni, veluti in umbella dispositi, à duobus exiguis foliolis sustentati, insident, quorum singuli flosculum ex sex foliolis acutis compositum, obscure albentem lineis fuscis per medium discurrentibus dissectum & staminulis aliquot donatum sustinent: his capitula rotunda semina tria vel quatuor, nigra oblonga, triquetra, continentia, succedunt. Flos Moschi vel Ziberthi odorem spirat, & in collibus Monspelio vicinis prouenit, vnde D. Saltzmanus anno 1598. attulit, & postmodum aliquot annis in hortulo coluimus.

DE ORCHIDE.

CAPVT VI.

I. *CYNOSORCHIS* angustifolia hianthe cucullo: huic radices subsunt duæ globosæ, altera maior & vegetior, altera flaccidior, quibus superne fibræ aliquot adherent: caulis cauus, striatus, cubito minor, folijs aliquot pallide virentibus, læuibus, striatis, vncias sex longis, semunciam latis inferne, & vno alterove superne, amplexantibus: spicam habet oblongam, ex floribus raris, candore purpurascens, ex oblongiusculis pediculis dependentibus, hiantem cucullum referentibus: hanc in pratis Patauinis legimus.

II. *CYNOSORCHIS* militaris montana spica rubente conglomerata: ex radicibus prædictæ similibus, caulis cubitalis, rotundus, cauus, paucis folijs angustis, striatis, vncias sex longis cinctus, exurgit, cuius summo spica, ex floribus paruis, eleganter rubentibus conglomerata, insidet: quorum labrum in quatuor paruas barbulas diuiditur, calcare tenuissimo à tergo. Nascitur in herbosis montis Mutetæ, Maio florens: quam prius circa Patauium obseruauimus.

III. *CYNOSORCHIS* militaris pratensis elatior floribus variegatis: hæc priore est testiculis minoribus, caule breuiore, folijs latioribus vncias duas longis, etiam caulis summum, tubi instar ingentibus:


gentibus: spica brevior, ex floribus priore longe minoribus, ipsæque ex albo & rubro eleganter variegatis. In pratis humidis Michelfeldenlibus, & trans Rhenum reperitur.

III. *CAMEORCHIS alpina* folio gramineo: planta palmatis est, ex cuius radice gemina, globosa, oblonga, folia angustissima, vtrinque quaterna, cauliculum nudum, triunciale, qui inter ea fertur, superantia exurgunt: spica vnciali, cui vtrinque foliolum breuissimum subijcitur: flosculi virides galericulati sunt. In monte Helueticorum Gothardo, copiose & acervatim, Iunio florens, reperitur.

V. *ORCHIS montana Italica* flore ferrugineo lingua oblonga: Testiculos duos habet paruos, rugosos, quorum alter, ut in reliquis Orchidibus vegetior, hinc communiter solum vnus testiculus reperitur: quorum summo, fibræ oblongæ, variegatæ & oblique sparæ, adpositæ. Caulis cauus, nonnunquam pede altior, quem folia angusta paucaque vncias tres vel quatuor longa, basi sua vestiunt, at cuiuslibet flori folium breue quidem, sed latius & in apicem desinens, subijcitur. Flores quini, seni, alternatim in caulis summo dispositi, coloris ferruginei, obliqui tubuli forma, quorum lingua propen-

dens oblonga est, & ex basi latiore in apicem abir, cui legumentum pallidioris coloris, vesicæ instar impositum, etiam in apicem & communiter bifidum finit: floribus vtriculi, semine puluerulento repleti, succedunt. Hanc in Italiæ montibus Bassanensibus legimus: & Matthiolum sub Testiculi tertij specie prima, in figuris maioribus exprimere voluisse, censemus, cuius tamen figura mala & sine omni descriptione; & ut in historia Lugdunensi sub Testiculo 3. Matth. At fateor peiorem esse eam figuram, quam Matthiolo meo emaculato addidi, desumptam ex Tabernamontani figuris: tunc enim quid sibi vellet Matthiolus, non constabat, imo etiamnum dubius sum: quare aliam figuram delineari curauimus. Huius haud dubie species, quam doctissimus Columna in sua Ecphrasi minus cognitarum stirpium, Orchidis macro-

phyllæ nomine & eleganter descripsit, & iconem expressit.




Orchis palmata pratensis angustifolia.

Orchis palmata angustifolia minor flore odoratissimo.



VI. ORCHIS palmata pratensis angustifolia maior: radices habet paruas, veluti palmas geminas, in binos digitos distributas, fibris paucis annexis: folia liliacea, angusta, læuia & palmaria, per quæ veluti tubum, caulis cubitalis cauus effertur, cui spica fere palmaris angusta, ex floribus dilute purpureis, breui calcare donatis composita, quibus singulis foliola oblonga acumina subiiciuntur, & capitulolum oblongum, semen aliarum instar continens, succedit. Hæc in pratis vdis Michelfeldæ, ipsa æstate reperitur.

VII. ORCHIS palmata angustifolia minor flore odoratissimo. Radice est gemina, oblonga, angusta, palmæ simili, in tres quatuorve fibras crassissimas diuisa, supra quas ex imo caule fibræ aliquot ortæ expanduntur: ex radice folia quina aut sena, oblonga, graminea prodeunt, inter quæ caulis vnicus palmaris, paucissimis & exiguis foliolis do-



natus, qui velut in spicam biuncialem abit, cui flores dilute purpurei odoratissimi insident, qui galea tecti, labro prominulo, in quatuor barbula diuisi sunt, & paruo calcar, à tergo prominente, donati. In pratis humidis Michelfeldæ prouenit & autumnofloret (quamuis etiam Monspeßuli reperiatur) & sub Satyrio octauo in Phytopinacæ descripsimus.

VIII. ORCHIS palmata flore viridi: ex radice gemina, palmata & parua, caulis palma altior, folijs paucis, neruosis, vncias tres longis, vnam latis, vestibibus exurgit, spicam habens triuncialem, flosculos paucos, sub virides, galea tectos, & labro prominulo in duas barbula diuiso, quibus singulis foliololum oblongum, angustū, subiicitur. In montibus Bohemiæ, Silesiæ finitimis in Saxo Mommelgrund, copiosam Iunio florentem, D. Fleißerus obseruauit, & attulit.

IX. ORCHIS

Orchis palmata montana maxima.



IX. ORCHIS palmata montana maxima: Radices habet geminas instar palmarum duarum sibi inuicem iunctarum, & velut in plures digitos diuisarum, quarum altera alba, vegetior ac solida, supra quas fibræ paucae conspiciuntur. Caulis est bicubitalis, striatus, vacuus, quem folia pedalia primum, mox palmaria, sesquiuinciam lata, neruis distincta, complectuntur: in cuius summo flores in spica palmari digesti, coloris dilute purpurei, qui parui sunt galeola tecti, labro exiguo propendente, in angustissimas barbulas diuisi, & à tergo oblongo, capillaceo calcaribus donati, ad quorum exortum foliola singula, quasi in filamentum abeuntia, obseruantur: his capitulum oblongum, striatum, semen exiguum scobis instar continens, succedit. Hæc in montibus vicinis, potissimum Muleto, copiose Maio mense florens, prouenit.

DE OPHRIS

CAPVT VII.

OPHRIS minima: è radice subflauescente fibrosa & Orchides redolente, cauliculus simplex, trium, quatuorve vnciarum, sub foliolis prodest, cui foliola duo Ophrios vulgaris modo apponuntur, quæ parua sunt, glabra, splendentia, coloris vni folij & nonnihil in cordatam effigiem, è rotundiuscula figura discedentia, quibus cauliculi altera pars, similiter trium, quatuorve vnciarum supereminet, cuius summo flosculi parui herbacei insident, in Ophris vulgaris floribus, exilitate sola recedentes, quibus vascula exigua succedunt. Florētis in locis vbi sponte prouenit, Iulio potissimum mense: at in hortos, cum gleba soli natalitij translata, citius. Nascitur plurimum, vt D. Furerus monuit, à quo eā (sed prius à D. Sigfrido) accepimus, Ophridij seu Bifolij Broccenbergici minoris nomine, in opacis muscosisque syluis Broccio & Offmannino vertici dicto, interuenientibus.

DE OROBANCHE.

CAPVT VIII.

I. OROBANCHE flore maiore ex cæruleo purpurascens. Radice est crassa, longa, fibrosa: caule semipalmari, foliolis paucis, brevissimis, crassis & acutis cincto, qui in quinque, sex, etiam plures pediculos triuiciales, nudos, absimitur, quamuis etiam ex foliorum alis pediculi prodeant, quorum summo calyx, vncialis sinuatus insidet, & ex quolibet flos vnicus, cæruleo purpurascens, longo pediculo donatus, exit, qui magnus, vncias duas longus, forma galericulatus, & veluti rostratus, vt in Alestorolopho, ex quo filamentum oblongum, reflexum prodest: quod flori succedat, non constat. Hanc, in Pyrenæis montibus D. Burserus legit & communicauit.

II. Mopere libet de vulgari Orobanche eā recte à Theophrasto Limodoron, quasi famem adferēs, vocari; eo quod plantæ cui adnascitur, alimentum subtrahat. Hanc enim semper alterius plantæ radici adhaerentem obseruauimus, vt Genistæ vulgari & Hispanicæ, Hieracio Sabauda, Trifolij, Astragato syluatico & alijs.

III. OROBANCHE quæ Hypopytis dici potest hæc Orobanche vulgari similis, sed humilior & nigricans, caule vnciarum quatuor, quasi squamis cōtecto: flores in summo, veluti in paruam spicam congesti. Nido auis similes, albidiores tamen, rariores ac duriores. Sub pice, abietibus & pinastris (hinc hypopitis) puenit. Sapor est aliquantulum astringens.

LIBER TERTIVS.

DE RAPVNCVLO, SIVE CAPANVLA
GLABRA.

CAPVT I.

Rapunculus spicatus cæ-
ruleus.Rapunculus alpinus siue Pyramidalis
minor.

RAPVN-

RAPVNCVLVS spicat' datur spica alba, vel cinerea, vel coloris violacei saturi, hic solum figura Rapunculi spicati caerulei adposita, cum iam descriptus sit.

I. RAPVNCVLVS alpinus siue Pyramidalis minor: Radix Rapunculi forma: caulis vnus, sesquipedalis, folijs pallide virentibus, per ambitum crenatis, acuminatis, vnciam latis, tres longis, alternatim cingitur: in summo flores pauci, caerulei, campanulae forma, pedicellis annexi & filamentis oblongo ex eorum medio prodeunte, donati propendent: quibus singulis capitulum oblongum, pertusum vt in campanula persici folia, succedit, cui semen minutum includitur: in Italia prouenit, sed locus excidit.

Rapunculus alpinus corniculatus.



II. RAPVNCVLVS alpinus corniculatus, quem nomine rapunculi alpini spicato simili, ante annos viginti duos in Phytopinace, dein in Matthiolo emaculato, descripsimus, nunc vero diligentius, cum eam ex Baldi rupium fissuris, absque radice euerimus, vt figura nostra in Matthiolo exprimit, postmodum à D. Nendorffero cum radice, & perfectiorem à D. Pona ante annos decem acceperimus.

Radice est tuberosa inaequali quasi ex pluribus grumis compacta, alba, digiti crassities, aliquando lignosa, pallida, rugosa & palmari: ex qua cauliculus (modo vnus, modo plures) tenuis ac striatus, vnciarum quatuor exurgit: folia, quae saturate virentia, tenuia, ad radicem aliquando ex rotunditate oblongata: Bellidis caerulea forma, communiter subrotunda, crenata, Alliarum forma, sed minor, pediculis vncias quinque vel sex longis praedita, ex radice vna cum cauliculis exurgunt: quae vero cauliculis & quidem pediculis breuioribus adherent. longiora sunt & angustiora, profundius, sed rarius, incisa, quorum quina vel sena, stellae in modum umbellae subijciuntur, quae cauliculi summo insidet, & ex floribus viginti, etiam pluribus, aride iunctis & ex caeruleo purpurascens. constat, qui, ex calicibus pediculis latis breuib. & striatis donatis prodeunt: ex singulo calice flos vnus, ad exortum tumidus, oblongus, sensimq; angustatus, & in extremitate crenatus, formam cucurbitae vitreae referens, in medio tumore, incisurae superficialis quinque, conspiciuntur: apertus, ex foliolis quinque compositus, filamenta aliquot exhibet, inter quae vnum longe producit, in summo bipartitum, aliquando instar capreoli vitium contortum: semen non fuit obseruatum. In Baldi montis iugis, inter precipitia propendet, vbi Augusto mense florentem anno 1578. collectum, quod cum Parauij D. Guilandino ostenderemus, Rapunculum montanum, at D. Cortusius, Catabiscam alteram Anguillare nominabat. Io. Pona in suo Baldo ante annos quindecim excuso, Trachelij petraei minoris nomine proposuit.

III. CAMPANULA alpina latifolia flore pullo: haec cauliculo est tenuissimo palmi minore, qui ad partem vsq; mediam, folijs vncialibus, subrotundis, alternatim dispositis, leuiter crenatis, pallideq; virentibus, cingitur: at pars superior nuda est, cui fere semper vnus flos, mediae magnitudinis, pulli coloris insidet. In alpibus Austriacis, vt Sneeberg
E & alijs

& alijs D. Burserus reperit, & Rapunculi alpinilatifolij nomine, misit.

IV. CAMPANULA alpina linifolia cærulea. Ex radice tenui, alba, cauliculi quaterni, quini, plures patioresq; palmares, & sesquipalmares, graciles, rotundi, simplices, emergunt: folijs oblongis angustissimis, confuso ordine septi: flores in summitate cærulei ut in Rapunculo vulgari, quibus capitula, exiguum semen continentia, succedunt. Hæc rupes & summa iuga montis Wasserfall, Iulio mense florens, exornat.


Campanula alpina rotundifolia minor.



CAMPANULA alpina rotundifolia minor à Clusio sub Campanula alpina minore describitur: verum figura quam addit est Campanulæ rotundifoliæ vulgaris minoris, quare veram figuram adposuimus.

V. CAMPANULA rotundifolia minima: plantula est vnciarum trium, ex cuius radícula alba, capillari, oblonga, exurgunt cauliculi (sæpe vnus, plerumque terni, quaterni) tenuissimi; subrubentes & ad radicem subhirsuti, maiori ex parte nudi, singuli vnicum flosculum subcæruleum deorsum nutantē, calathi forma, ex vnico folio sexangulo compositum, sustinent, quibus capitula foraminibus pertusa, ut in reliquis campanulis, succedunt: foliola habet potissimum ad radicem, exigua, subrotunda, serrata, rigidiuscula, quandoq; rubentia. Hanc in Rhætorum alpibus cum Italiam peteremus, anno 1577. Septembri mense adhuc florentem inter saxa copiosissime obseruauimus, nec altiorē inuenire licuit: quam cum D. Cortuso ostendissemus Cantabricam Plinij nominauit. Plinius l. 25. cap. 8. suæ Cantabricæ, quæ per Diui Augusti tempora à Cantabris reperta fuit, caulem iuncum, pedalem tribuit, in quo sint flosculi oblongi veluti calathi: in quibus semen perquam minutum, & quæ ubiq; nascatur.

VI. CAMPANULA Cymbalaræ folijs: ex radice exigua capillacæa & albicante, cauliculi tenuissimi, virides, nonnunquā palum superantes, & mox in alios brachiati, prodeunt: quibus folia rara, subrotunda, hederacea, vel potius Cymbalaræ folijs similia, angulosa, viridia, tenuia, longis pediculis donata, sine ordine adhærent: flores cærulei, oblongi campanulæ forma, aliquando summis cauliculis, aliquando pedicellis biuncialibus, ex eorundem lateribus exurgentibus, insident. Hæc non longe Tolosa in Ericetis provenit, & quia vix sola sustinetur, Ericis incumbens exurgit eandem: etiam circa Lutetiam D. Cherlerus legit.



Campanula serpillifolia.

Campanula folijs subrotundis.



VII. **CAMPANULA serpillifolia**: Tota planta floribus exceptis serpillum refert: nam radice est tenui, obliqua, tenuissimis fibris capillata, & hinc inde repente: cauliculis plurimis rubentibus in terram reflexis, cui novis fibellis adherent, qui in ramulos plures tenuiores diuiduntur: quos foliola Serpilli, vel potius Nummularæ, quæ flore est purpurascens, forma subrotunda, duo semper opposita, quædam maiora, quædam Serpillo minora, crenata, subtus pallide virentia, pediculis brevissimis, & leuissime pubescentibus, ambiunt: cauliculi aliquando in pediculos nudos, flores sustinentes. desinunt: aliquando ex cauliculorum lateribus pediculi triunciales, in summo nudi, floribus ornati exurgunt: flores bini vel terni campanulæ formæ, ex caruleo rubentes, deorsum nutantes, singuli singulis pedicellis donantur. Huius ramulum à D.

Bauhino fratre primum habuimus, dein in Baldo cum floribus legimus: tum à D. Paschati Gallo, qui eam in Rhætia ex rupibus dependentem collegit.

Similem, sed folijs inferne albidioribus & superne pallide virentibus, in Insula Toupinambau de Brasiliæ anorum natam, D. Burserus communicauit.

DE TRACHELIO SIVE CAMPANULA

HIRSVTA.

CAPVT II.

I. **CAMPANULA folijs subrotundis**: ex radice tenui, repente, caulis sesquipalmaris leuissimè pubescens exurgit, quæ folia pauca, subrotunda, uncias duas pene longa, lataque, pediculo oblongo donata, tenuia, subaspera, per ambitum crenata, cingunt: in caulis summo flores pauci, dilute carulei Campanulæ formæ, deorsum,

E 1 penden-


pendentes, ex quorum medio stylus exurgens, extra florem fertur. Hanc ceruicaria minoris rotundifolia nomine D. Sigfridus, Helmstadio misit.

Hæc à campanula hortensi Rapunculi radice differre videtur altitudine, foliorum longitudine, florum magnitudine & numero, quæ pro radicibus multas, tenues, transversas & oblique repentes fibras, habet, ita ut ex hortorum areolis vix extirpari possit, à quibus radices oblongæ, candidæ, Rapunculi radicibus similes, demittuntur.

II. CAMPANULA Drabæ minoris folijs: ex radice Rapunculi minoris forma, caules sesquipalmes, lanugine leuissima aspersi prodeunt, quos

folia, Drabæ minoris folijs similia, subrotunda, viridia, vnciam longa, semunciam lata, per ambitum crenata, & in acutè fastigiata, subaspera, pediculis carentia, alternatim vestiunt, flores pauci, subcerulei, sexanguli, calathi forma, mediocris magnitudinis, & pediculis oblongis donati, summo cauli insident. In pratis, circa Valesianorum Thermas copiose prouenit, vnde

D. Burserus attulit.



Campanula folijs Echij floribus villosis.



Campanula folijs Echij.



III. CAMPANULA folijs Echij floribus villosis, ex radice oblongiuscula, folia angusta quatuor & quinque uncias longa, subaspera, prodeunt, inter quæ caulis palmaris, rarius pedalis, rotundus, subasper, paucis breuibibus & angustis folijs vestitus, exurgit, ex cuius summitate flores unciales, lati, Campanulæ forma, quini, seni, cærulei, alternatim dispositi, breuibibus pediculis dependent: quorum extremitates, quemadmodum & calices, pili oblongi, pappi instar, ambiunt. Hæc in Baldo reperitur & Helueticorum alpibus Gotthardo & monte Fracto: diuersa plane à Trachalio montano historiae Lugdunensis.

Huius & minor species, quæ minus hirsuta, semipalmaris, folijs breuibibus, cauliculo gemino, ex quorum quolibet reflexo, flos vnicus, illo tamen minor, dependet: quam ex Helueticorum alpibus D. Burserus attulit.

Campanula adhuc alia datur folijs Echij, quam cum Clusius nomine Trachelij *Opusculis* descripserit, nullam verò figuram adposuerit, eam præcedenti iungere volumus.

DE RAPISTRO.

CAPVT III.

I. RAPISTRVM floribus Leucoij marini: plantula semipalmaris est, radice oblongiuscula, alba, fibellis donata, cauliculis trium quatuorve unciarum: folijs vulgari Rapistro luteo similibus, paruis, uncialibus, crenatis, & subasperis: flosculis paruis subcæruleis, Leucoij marini similibus, quibus siliquæ parvæ, angustæ, semen minutum continentes, succedunt. Circa Massiliam in rupibus D. Burserus legit.

II. RAPISTRVM monospermon: ex radice longiuscula albicante, parum fibrosa, caules pedales, quandoque altiores, rotundi, tennes, ramosi, eleganter virentes, leuiterque hirsuti exurgunt: folia humi sparsa, crassa sunt, Rapi folijs similia, ad principium laciniata, dein subrotunda, leuiter sinuata & subhirsuta: flores secundum cauliculos palmares & tennes, velut in spica dispositi: quadrifolij eleganter hinc aurei, quibus siliquæ succedunt rotundæ (eleganter propter strias, per eas quemadmodum in semine Coriandri discurrentes) in filamentum oblongum abeuntes: quæ quasi geminæ sibi insident, parte tamen superiore maiore,

Rapistrum monospermon.



cum in ea semen paruum oblongiusculum, sed vnicum (vnde ei nomen) contineatur. Huius semen, nomine Lampanæ monospermi, D. Doldius misit, & hic Basileæ in horto D. Zuingeri, Maio mense floruit.

Hoc ipsum postmodum, sed multo strigosius (illud enim: cultura elegantius) in agris quæ Augustam Rauracorum itur, ad rubram domum obseruauimus: idem sed humiliter & valde ramosum, folijs paruis, eleganter virentibus, in agris circa Huringen ad syluam, inuenimus: & simile

Monspelio, vbi quoque sponte creuit, habemus.

(33): (33)

DE N A P O.

CAPVT IV.

NA P V S syluestris Cretica : folijs est ad palmi longitudinem accedentibus, instar foliorum Rapiſtri albi, vel Irionis vulgaris, in lacinias octo vel decem diuisis, per margines crenatis, asperis: caule albido, rotundo, ramoso, subaspero, summitate, cui flores non insident, aculeata, florib. (quos non vidimus, vt nec radicem) siliqua angustissima biunciales succedunt, quæ semen exiguum nigricans continent. Buniadis agrestis nomine, ex Creta ab Honorio Belli accepimus: & à Cretensibus *ονιδοπέτε*, vacatur.

Raphanus aquaticus alter.



DE RAPHANO.

CAPVT V.

RAPHANVS Creticus: ex semine Cretico ab Honorio Belli, Ramolo nomine misso, Raphanus in hortis nostris creuit, cuius planta tota, toto habitu à vulgari nō diffidebat; radice oblonga, alba & gustus acerrimi; caule non adeo alto: folijs minus hirsutis & asperis, flore modo purpureo, modo albo: siliquis & seminibus minoribus.

Raphania aquatici duas figuras, tanquam optimas, adposuimus, sed sine descriptione: cum is, qui folijs est in profundas lacinias diuisis sub Radicula syluestri, à Dodonæo: sub Raphano syl. aquatico, à Lobelio in editione Belgica: Raphano aquatico à Tabernæmontano, siue syluestri & palustri in historia Lugdun. describatur: alter vero, nomine Rapiſtri aquatici à Tabernæmontano exhibetur.

Raphanus aquaticus folijs in profundas lacinias diuisis.



DE DRACUNCULO.

CAPVT VI.

DRACUNCVLVS alpinus folio scabioſa: radici-
bus eſt fibroſis, cauliculis rotundis, pedalibus,
in ſummo in alas brachiatis: folijs inſtar ſcabiola
laciniatis, alte incisis & crenatis, alternatim diſpo-
ſitis & pallide virentibus: floſculis, in ſummis vir-
gulis, quoad diſcum medium ſubluteis, quem fo-
liola albida vt in Chamamelo vulgari ambiunt. In
Heluetiorum pratis alpinis prope Fabarias & in
Gotthardo prouenit, Iulioq; floret.

Eruca latifolia.



DE ERVCA ET SINAPI.

CAPVT VII.

I.ERVCA latifolia: hæc caule eſt cubitum exce-
dente, albo, craſſo, ſtriato, ramoſo: folijs glabris.

pallide virentibus, ad radicem pedalibus, profun-
dis incisis laciniatis, per quorum medium neru-
latus excurrit, quem vtrinque foliorum laciniæ biun-
ciales, alarum inſtar, triangulares, corioſæ, figuræ
diuerſæ, inferne & ſuperne continuæ, cingunt: quæ
vero in caule breuiores ſunt, & horum quædam E-
rucæ vulgaris folijs ſimilia, ſuprema vero anguſta
& parum ſinuata: in caulis ſummo flores ſatis ma-
gni, aurei, quadriſolij, ſtaminibus plurimis donati,
quibus ſiliquæ oblongæ ſtriſſimæ ſuccedunt. E-
rucæ nomine in horto ſata: an forte Eruca tertia
Anglica, in horto Camerarij?

II.ERVCA ſylueſtris minor Burſæ paſtoris folio:
ex radice craſſiſcula, cauliculus palmo altior, ſub-
aſper, breuibus alis brachiatus exurgit: folia ad ra-
dicem ſparſa, ſeſquiunciam longa, Burſæ paſtoris
mediæ modo laciniata, ſubæſpera, in caule nulla,
niſi quæ alis, & quidem vix laciniata, ſubiſciuntur:
flores ſubaurei, ſatis magni, longis pediculis inſi-
dentes, quibus ſiliquæ breues ſuccedunt. Mon-
ſpeſſuli collecta.

III.ERVCA ſylueſtris minor incana: ex radice
cauliculi læues, virentes, quatuor, ſex & octo un-
ciarum, in plures alas vnciales diuiſi prodeunt: fo-
lia ad radicem plura, biuncialia, tenuiſſime lacinia-
ta, quæ etiam cauliculos alternatim cingunt, om-
nia incana ſunt: floſculi plurimi, pallide lutei, qui-
bus ſtriſſimæ & breues ſiliquæ ſuccedunt: Mon-
ſpelio D. Rumbaum attulit.

IV.ERVCA lutea ſiue Barbarea flore pleno: hæc
à vulgari magnitudine differt: caule eſt craſſiore &
ſtriato, ſed breuiore: folijs vncialibus: floribus
nonnihil quam in vulgari maioribus, aureis &
plenis. Inter ſegetes Paterniacenſes, & iuxta
Arburg arcem Bernatum, Iunio
floret.

Eruca cærulea in arenosis crescens.*Eruca maritima* Italica.

V. *ERUCA* cærulea in arenosis crescens: Ex radice rufescente, oblonga, tenui, leuiter fibrosa, caules plures palmares, rari⁹ sesquipalmares striatos, hirsutos, ramulis aliquot brachiatos, emittit: folia ad radicem per terram sparguntur, eruca vulgaris instar sinuata, & quasi circumrosa, hirsuta, aspera, sesquiuncialia, sed etiam breviora & angustiora, quæ in caule rariora sunt, minus sinuata & aliquando integra: flosculi eleganter cærulei, vel purpureo-cærulei, quadrifolij, filamentis breuibus donati, ramulorum extremis insident, quibus siliquæ oblongæ, tenues & læues, semen minutum subrufum & acre includentes, succedunt. Prouenit apud nos locis arenosis, utijs quæ Birsæ alluit: sic quibusdam in locis in muris reperitur: imo etiam altissimis iugis & petris circa Delspergam & Lauffen Rauracorum: in Phytopinace, & Marthiolo, addita figura, quoq; descriptimus.

VI. *ERUCA* maritima Cretica siliqua articulata: tota planta albicat, folia habens ad radicem breuia, angusta, in minores lacinias diuisa & subaspera: cauliculis est palmatibus, reflexis, striatis (flores non conspecti) siliquis plurimis, incuruis, articulatis, trium quatuorve unciarum, asperis semine minutum subrufum continentibus, quam ex Creta Honorius Bellimisit.

ERUCA maritimæ Italicæ siliqua hastæ cuspidi simili, figuram perfectam adposuimus, cuius tres diuersæ una cum descriptione (inter quas una ex Lobelio desumpta, qui nomine Cakite Serapionis *Eruca* folio, napi flore exhibuit) in Lugdunensi historia proponuntur.

VII. *ERV-*

Eruca Monspeliaca filiqua quadrangu-
la echinata.



VII. *ERVCA* Monspeliaca filiqua quadrangu-
la echinata. Hanc Monspessuli anni 1579. vbi col-

legissemus, sic descripsimus, quemadmodum in Phy-
topinace videre est: ex radice semipalmari, crassius-
cula, leuiter fibrata, albicante, caules ad exortum
purpurascens, terni quaternive, pedales, aliquan-
do cubitales, rotundi, striati, subasperi, in ramos
brachiati exurgunt: folia ad radicem humi sparsa,
pauca, oblonga, angusta, sinuata, hirsutia aspera,
bina ternave simul iuncta, in caulibus, praesertim
filiquis onustis, pene nulla, oblonga, leuiter sinua-
ta: flosculis est luteis quinquifolijs, quibus filiquae
succedunt quadrangulae, in apicem acutum rigi-
dumque desinentes, laeves, oblongo pediculo inli-
dentes, per maturitatem durissimae: quarum queli-
bet latera quatuor obtinet, quae ad formam alarum
perceae piscis eleuata, in medio sinum ostendunt:
his per longum dissectis, utrinque duae capsulae di-
stinctae conspiciuntur, in quarum qualibet, semen
vnicum rufum, cochleae instar contolutum acu-
minatum & acre continetur. Iunio mense floren-
tem & filiquas ferentem, legimus. Hanc videtur
Herbarij Lugdunensis auctor, sub Sinapi echina-
to voluisse proponere, verum figura vitiosa & de-
scriptio non sufficiens.

I. *SINAPI* paruum filiqua aspera: radice est ob-
longa, crassiuscula & capillata, ad quam folia plu-
ra, *Erucae* sylvestris minoris forma, sed minora, in
lacinias tenuissimas diuisa, & acra: cauliculi plu-
res, recurui, laeves, duarum triumve vnciarum (ra-
rissime cauliculus palmaris erigitur) in alas vncia-
les brachiati: flores parui, pallide lutei, quibus sili-
quae multae strictae, vnciales & asperae, in latera di-
uicatae, semen minutissimum continentes,
succedunt: circa Monspelium
prouenit.

Resedæ affinis Phyteuma.

Erysimo similis hirsuta alba.



DE RESEDA.

CAPVT VIII.

RESEDA linariæ folijs: ex radice candida, longiuscula, caulis cubitalis rotundus, in ramos palmares diuisus, folijs linariæ strictissimis, oblongis, viridibus vestitus exurgit: rami singuli, in florū oblongam, veluti spicam abeunt, quam flosculi parui, muscosi, tenuibus capillamentis ornati, vt in Reseda minore alba (quam Sefameidem paruiam Salmanticensem Clusius nominat) pallide flauescences constituunt: quibus capitula vel vascula angulosa, bifida, exili semine pallido plena, succedunt. Hæc in solo arenoso conuallium montium Pyrenæorum, à D. Bursero collecta.

RESEDA affinem facimus eam quam Phyteuma Monspeliensium, Lobelius & Lugdunen(s)vo-



DE ERSIMO.

CAPVT IX.

ERYSIMO similis hirsuta: ex radice oblonga, alba, lignosa & fibrosa, caulis modo vnus, modo plures cubitales, aliquando subrubentes, striati, hirsuti, aliquando in ramulos brachiati, exurgunt: folia plura, ad radicem humi strata, aliquando pediculis carentia, sesquiunciam longa, aspera, hispida, subalbicantia, per ambitum crenata, rarius laciniata, & quæ in caule minora sunt, cumque basilatiore cingunt: secundum ramulorum longitudinem, veluti in spica, flosculi albi, quadrifolij, pedicellis

dicellis insident, qui in siliquis oblongas, strictas, semen minutum continentes, abeunt. Prouenit locis saxosis, rudibus, muris, vt hic Basileæ ad mœnia, ad arcem Mönchenstein, primoque vere florēt: Monspeßuli quoque in rudibus vmbrosis, sed per omnia minor: rarius in arenosis, vt apud nos ad Wiesam fluuium Patauij similiter collegimus, & hanc D. Guilandinus Dryophanon Plinij lib. 27. cap. 9. Drabam alteram & Thlaspi speciem: at D. Cortufus, Erysimum tertium, nobis nominabat: post modum Barbaram muralem Ioan. Bauhinus frater appe lauit. Huius descriptionem & iconem, in Matthiolo emaculato, exhibuimus.

DE PERSICARIA.

CAPVT. X.

PERSICARIA angustifolia: ex radice nigricante, fibris oblongis capillata, caules plures cubito altiores, rubentes, laues, geniculis distincti exurgunt: quos folia, Persicariæ vulgaris folijs triplo, quadruplo angustiora, duas, rarius tres, uncias longa, ambiunt, & in summo in ramulos brachiantur, quibus spicæ oblongæ, floribus pallide purpurascensibus ornata, vt in vulgari insident.

In humidis circa Michelsfeldam, ætate florens, reperitur.

Nasturtium hortense latifolium.



Nasturtium hortense crispum angustifolium.



Nasturtium hort. crispum latifolium.



DE NASTURTIO.

CAPVT XI.

NASTURTIVM hortense duplex est, plano & crispato folio: illud latifolium, cuius solum fi-

gura adposita, & angustifolium vulgatius: hoc, quod crispum similiter duplex est.

I. NASTURTIVM hortense crispum: hoc, folijs exceptis, cum vulgari conuenit: huius enim folia crispa sunt: estque duplex, latifolium & angustifolium, quemadmodum binis figuris in Matthiolo exhibuimus (cum saepius in hortulo nostro creuerit) & hic repetere placuit.

II. NASTURTIVM pratense paruo flore: ex radice tenui, fibrosa, caulibus cubitalis, viridis, varie incuruatus exurgit, folijs atrouidentibus, oblongis, Erucæ syluestris minoris, aut Sij forma, vtrinque longis petiolis in lobos subrotundos; aliquando oblongos diuisis, & per ora dentatis, cincti in caulibus summo, flosculi parui, albi, velut in umbella dispositi, quibus siliquæ paruae semine minutissimo refertæ, succedunt. Circa Montembelgardum locis humidioribus prouenit. Suspicamur Matthiolum, quem Tabernæmontanus secutus est, sua figura Sisymbrij aquatici alterius, duas plantas miscuisse: ita ut florum umbella, huic iam descriptæ, folia vero, Nasturtio pratensi vulgato magno flore conueniant.



NASTVR-

Nasturtium aquaticum maius & amarum.

Nasturtium alpinum minus Resedæ folijs.



NASTURTIVM aquaticum maius & amarum, quod Thalium nomine Sisymbrij alterius specie secunda descripsit, & sæpe inter Nasturtium aquaticum alpinum reperitur, à quo sapore amaro potissimum distinguitur, hic describere nolimus, at figuram adponere, cum nullus eam exhibuerit, voluimus.

III. NASTURTIVM sylvestre minus: ex radice tenui capillacea, cauliculi plures (& quantum ex sicca colligere licet reclinati) trium quatuorve vnciarum emergunt: folijs Nasturtij vulgaris forma, sed minoribus, per terram sparsis & etiam cauliculos tingentibus: in quorum summo flosculi parui albicantes, valvulae exiguae, ut in Iberide, vel Bursa pastoris minima. Hoc primo vere, ad alueos aquarum salugine imbutarum Franckenhusij Thuringiorum, copiosissime erumpit, vnde D. Furerus:

cum alijs elegantissimis, Iberidis pusillæ, seu Nasturtij sylvestris Franckenhusiani nomine, misit.

IV. NASTURTIVM alpinum minus Resedæ folijs: ex radice alba tenui & oblonga, cauliculi laeves, tenues, recurvi, communiter indiuisi, palmoque minores prodeunt: folijs longis pediculis, instar Resedæ vulgaris, præditis, in lobos tres, vel quatuor subrotundos, diuisis: flores, in cauliculis summis albi, mediocris magnitudinis, quibus siliquæ strictissimæ, sesquiunciales succedunt. In Rhætorum alpibus Iulio florens, reperitur. Verum ex Helueticorum alpibus & Pyrenæis, longe minus habemus, ita ut tota planta absque radice, vncias tres non superet.

V. NASTURTIVM alpinum capsula Nasturtij hortensis: radice est lignosa, parum fibrosa, cauliculis vncias duas non excedentibus: foliolis par-

uis, angustis, crassis, vngue breuioribus: flosculis paruis albis, capsulis satis magnis, Nasturtio hortensi similibus. In Rætia monte Nombre prope Balneum Worms, estate florens, Io. Bauhin frater collegit.

VI. *NASTURTIVM* alpinum Bellidis folio maius: Ex radice caulis cubitalis rotundus, lævis, ad exortum statim diuisus, prodit: folia habet tenuissima, bellidis forma, vncias quatuor longa, quæ vero in caule sunt, pediculis carent, & instar Thlaspi vulgaris lato semine, leuiter sinuata, cum ambiunt: flores albi, in caulis summo, quasi in spica vncias sex longa, quibus siliquæ triunciales, angustæ, semine rufescente, rotundo, plano, refertæ, succedunt. Circa Fabarias Thermas, ad aquæ defluxum, D. Burserus legit.

VII. *NASTURTIVM* folijs Barbareæ: Radice est parua, capillacea, albicante: cauliculis

pluribus tenuissimis, fragilibus, reflexis, nonnihil villosis, nonnunquam in alas diuisis, semipalmaribus, palmaribus & nonnullis cubitalibus: folijs ad radicem pluribus, paruis, tenuissimis, viridibus, foliorum Barbareæ modo, sed minus frequenter sinuatis, quæ in cauliculis rariora sunt, & quædam minime sinuata: flosculis est minimis albis: siliquis oblongiusculis & strictissimis. Hoc Cardaminæ aut Erucæ peculiaris nomine,

D. Burserus ex Austria, sed in finibus Bohemiæ collectum, transmissit.

(S): (S)

Thlaspi villosum capsulis hirsutis.



DE THLASPI.

CAPVT XII.

I. THLASPI vaccariæ folio, Bursa pastoris siliquis: caule est cubitali, rotundo striato, laui;

viridi, ramoso, quem folia vaccariæ similia, attrourentia, glabra, pediculis carentia, cingunt: flores parui, albi: siliquæ Bursa pastoris forma, sed maiores: Non longe Monspelio, in horto Dei dicto, D. Burserus collegit.

II. THLASPI vaccariæ incano folio minus: Tota planta villosa, & incana est: ex radice crassiuscula, rufescente, cauliculi semipalmares, etiam minores, recurui & quasi repentes, villosi & incani prodeunt, folijs paruis incanis, vaccariæ similibus, pediculis carentibus & alternatim dispositis, vestiti in quorum summitate, flosculi plures, albi, quasi in subrotunda spica vniti, quibus thecæ parue succedunt. Hoc in agris Monspelienfibus repens, & in Prouincia prope Massiliam, paulo maius & erectius reperitur.

III. THLASPI villosum capsulis hirsutis: ex radice tenui, oblonga, albicante, caulis pedalis vnicus rotundus, villosus exit: ad cuius exortum folia aliquot humistrata, longis pediculis donata, orbiculato cuspide, hirsuta: quæ vero in caule, longe breuiora, pediculis carentia, latiore basi ipsum amplectuntur, quorum quædam leuiter crenata sunt: flores albi quadrifolij: siliquæ magnæ, hirsutæ, compressæ, longo pediculo donatæ, superiore parte fissæ, vtriculis duobus præditæ, in quibus semen rufescens, acri sapore præditum, continetur. Hoc anno 1577. in horto Patauino (postmodum Monspeffuli sponte natum) collegimus: cuius semine, in Italia pro vero Thlaspios semine, olim vltos fuisse, ex D. Corrufo cognouimus: hoc in Phytopinace primum sub 19. Thlaspi, dein in Matthiolo, figura addita, exhibuimus.

— (:) —



IV. THLAS-

Thlaspi Creticum flore albo.



IV. THLASPI Creticum flore albo radice est oblonga, paucis fibris donata, cauliculis palmum superantibus, rotundis: folijs paucis, oblongis, angustis, læuibus, alternatim caulem vestientibus: in cauliculorum summo, flores candidi magni, quib. thecæ magnæ, apice medio donatæ succedunt. Hoc Thlaspi, Cappadocici fruticantis flore albo perennis nomine, D. Doldius Norinbergæ misit.

V. THLASPI saxatile rotundifolium: Ex radice alba, longa, fibris carente, sublignosa, cauliculi plures, tenues, pedales, reflexi, & fibris capillaceis, deorsum missis, terræ affixi, prodeunt, folijs est paruis, subrotundis, tenuibus, inter quæ cauliculi palmares, nudi exurgunt, flores paucos pallidos sustinentes, quibus siliquæ parvæ, tenuissimo filamento donatæ, semen minutum concludentes, succedunt. In locis petrosis circa oppidum Lauffen M. Hagenbachius reperit.

Thlaspi alpinum minor capitulo rotundo.



VI. THLASPI alpinum folio paruo crenato: vel Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo: a radice crassa, è rupium fissuris prodeunte, caules exurgunt tenues, palmares & sesquipalmares in ramulos brachiati: folia habet ad radicem plura, breuia, acuta, leuiter crenata, longis pedicellis donata, in caule pauca & angustiores flosculi in summo albicantes, quibus folliculi copiosi, oblongis pedicellis insidentes, tenues, subrotundi, septo membranoso distincti, semen minutum flauum & acre continentes, succedunt. Prouenit in monte Wasserfall, & in Heluciorum ac Rhætorum alpibus. Huius in nostro Matthiolo & figuram & descriptionem, sub Thlaspi saxatili minori folio exhibuimus: & Thlaspi alpini maioris iconem addidimus: utramque & hic exhibemus.

VII. THLAS-

Thlaspi alpinum maius capitulis rotundis.*Thlaspi montanum incanum luteum.*

VII. *THLASPI* alpinum repens: ex radice oblonga, cauliculi plures, per terram repandi, trium quatuor vel quinque vnciarum, folijs parvis subrotundis, inordinate dispositis, vestiti prodeunt, floribus copiosis magnis & albis ornati, quibus siliquæ, *Thlaspi* bellidis folio similes, succedunt, sapore est *Erucæ*. D. Burserus ad *Thermas Fabarias* Heluetiorum, dein in *Austria* collectum, transmissit.

Variat ratione loci: illud enim folijs est leuiter hirsutis, floribus communiter purpurascens, rarius albis: hoc vero folijs est glabris, floribus albis.

Et sic *Thlaspi* montani incani lutei *Serpillifolij* maioris figura erat adponenda, cum minus recte sculptor, apud *Lobelium* nomine *Thlaspi* supini lutei, expresse.

VIII. *THLASPI* biscutatum villosum flore calcarati donato: caule est cubitali hirsutie aspero, summitate in alas brachiata: quem folia crassa, villosa, aspera, per marginem profundis incisuris crenata, quædam sinuata, vncias duas longa, semunciam lata, usque ad summum, basi lata vestiunt: flores habet luteos, magnos, calcarati ut in *linaria* donatos, quibus peltæ duæ rotundæ unitæ, semen continent, & in apicem oblongum desinentes, succedunt. In saxosis Gallo provinciæ *Bormij* non longe ab *Insulis Stechadibus* provenit, unde D. Burserus attulit.

IX. *THLASPI* fruticosum leucoij folio latifolium: caulibus est pedalis, rotundis, lignosis, quos folia pallide virentia *Leucoij* forma, sed breviora & angustiora, vestiunt: flores in summitate pallidi, magni, & vasa bifurcata. Circa *Maffiliâ* D. Burf. legit.

Idem,

Idem, sed minus & folijs angustioribus, ex Italia, Thlaspi perpetui nomine, habemus.

X. THLASPI Alexandrinum: planta est elegantissima, dodrantalis, ex cuius radice singulari, caules plures in ramulos brachiati, prodeunt, & ad diuisiones singulas, folia subrotunda perfoliata instar, ramulos ambiunt: à ramulorum extremitatibus, ex pediculis dependent filiquæ plurimæ, fere circinata, vt in Thlaspi tenui folio Fuschii, eoque ordine, sed maiores, Nasturtij vulgaris fere magnitudine, in angulum oblongum cum cuspidē desinentes, quæ in partes duas finduntur, & membranulam tenuem relinquunt. Hoc apud Iohan.

Bauhinum fratrem vidimus, quod à Cortuſo accepit, vt in Phytopinace monuimus.

Bursa pastoris maior loculo oblongo.



DE BURSA PASTORIS.

CAPUT XIII.

I. BURSA pastoris maior folio non sinuato: radice est longiuscula tenui, aliquando capitata: caule palmum superante, communiter vno (rarius pluribus) ramoſo: folijs atro uirentibus, ad radicem longis pediculis donatis, quæ circa caulem alas duas habent & bali complectuntur: floribus & thecis cum vulgari conuenit. Batileæ in arenosis: Italia syluestribus, circa Monspelium (vbi tamen longe minor est, quoque notauimus.

II. BURSA pastoris maior loculo oblongo: radix tenuis, fibrosa, inutiles & alba: cauliculus palmarem, hirsutie asperum, ramoſum: aliquando vix semipalmarem, sed alis carentem, emittit, ad cuius exortum, folia aliquot inter se viridia, humi strata, vnguis magnitudinis, equali figura, serrata, hirsutie aspera: quæ vero caulem ambiunt, pauca sunt & pediculis carent: strobili in summo multi, parui, congesti, albi, quibus loculi parui oblongi, è petiolis oblique tendentibus, succedunt: quibus semina duo, parua, fulua, acris saporis, includuntur, quæ loculo maturo aperto, & tantum altera parte foliacea relicta, decidunt: Apud nos locis siccioribus & campestribus, Martio florens & loculis onusta reperitur, vt in Phytopinace monuimus. Monspeluli, Thlaspi Veronica folio nominatur, & hanc videtur Doctiss. Columna, sub Draba minore murali discoide descripsisse.

Bursa pastoris alpina hirsuta.

Myagrum monospermon latifolium.



DE MYAGRO.

CAPVT XIV.

III. *Bursa pastoris alpina hirsuta* radice est vnciali, foliolis copiosis pallide virentibus, in orbem humi stratis, mollibus, incanis, lenticulae magnitudine, leuiter aenatis, aliquando integris: cauliculis aliquot tenuissimis, leuiter hirsutis, pene nudis, tres quatuorve vncias longis: flosculis paruis, albis: oculis flauescens oblongis, multo quam in vulgari maioribus, semen minutum rufum continentibus: in alpebus Helueticorum, vt monte Fræto & Spligel, reperitur.

I. *MYAGRUM* foetidum: ex radice caules cubitales, aliquando sesquicubitales, virides, crassi, rotundi & asperi exurgunt, quos folia pallide virentia, subaspera, leuissime sinuata, quatuor vel quinque vncias longa, sesquiunciam lata, alternatim cingunt, quibus in summo in alas breues diuiduntur, quibus flores pallide lutei, longis petiolis donati, veluti umbellae insident, hisque utriculi orbiculati, minutum semen continentes, succedunt. Hoc apud nos in arenosis ad pontem fluminis *Wiesen* repertum, quod ad differentiam vulgaris, ab odore, foetidum appellare placuit.

II. MYAGRUM monospermon latifolium: caule est cubitali, aliquando altiore, rotundo, tortuoso, varie & inæqualiter brachiato: folijs vulgari viridioribus, latioribus, linea alba diuisis, obtusis, latiore basi caulem amplexantibus, ijs quæ ad radicem sunt, Cichorij satini modo laciniatis, reliquis aliquando sinuatis: floribus luteolis, paruis, quibus vtriculi oblongi peræ similes, superne in duas extuberantias desinentes, quorum medio apex insidet, per maturitatem, vti & totus fructus, durus: in cuius vtriculi medio, cauitas vnica, semen vnicum (vnde nomen) rufum, oblongum continens. Sapore Myagro non respondet. Hoc in horto D. Felicis Plateri primum, dein in horto Illustr. Ducis Wirtembergici, quod Montembelgardii frater coluit, (cui semen Bricourrues nomine missum fuit) legimus: ex Euganeis quoque accepimus, & Pseudoisatidem ab Alpino vocari intelleximus. In Phytopinace primum sub γ, dein in Matthiolo figura addita, descripsimus.

III. MYAGRUM monospermon minus: ex radice parua, tenui, capillata, albicante, caulis vnus vel alter tenuis, pedalis prodit, folijs paucis tenuissimis, pallide virentibus vestitus: quorum ea, quæ ad radicem per terram sparguntur, parum sinuata sunt, pediculis oblongis donantur, & vnciam lata sunt: at quæ in summo caulis, basi sua in alas abeunte, caulem amplexantur: in summo strobili albi, conglobati: quibus vtriculus paruus, semen continens, succedit. Monspeffuli, non longe à monte Calcaris, D. Burserus collegit.

IV. MYAGRO similis siliqua rotunda: radix caulem cubitalem, hirsutum, fragilem, in ramos varios brachiatum, emittit: cui folia ad radicem hirsuta, aspera & succulenta, quæ masticata, cum visciditate leuem acrimoniam exhibent, sex vncias longa, sesquiunciam lata: quæ vero caulem ambiunt minora, pediculis carentia & alata: flores pallidi, minuti, quasi in spica semipalmari dispositi, quibus semen paruum, rotundum, rugosum in apicem desinens, quodlibet pedicello oblongo insidens, primum viride, per maturitatem nigrum, medulla flaua, oleaginosa plenum, succedit. An-

Myagro similis siliqua rotunda.



nua est planta, ex semine deciduo renascens, Iulio & Augusto florens. Ioan. Baphino in horto Montembelgardiano nomine alicuius Myagri creuit. Monspelio prope Lunellam natum, Lepidij & à D. Doldio, Thlaspi nomine Norinberga, accepimus.



DE DRABA.

CAPVT XV.

I. **DRABA** tenuifolia velut spicata: radice est oblonga, tenui, albicante, caulibus pedali-
bus, aliquando cubitum superantibus, fragilibus
breuib; brachiatis: folijs paucis, tenuibus, pallide
virentibus, nonnihil in ambitu dentatis, triuncia-
libus, vnciam latis, basi lata caulem cingentibus, a-
latis, gustu feruente & acri proditis: floribus albis,
paruis, in cauliculis palmaribus, quasi in spica na-
tis, quibus singulis semen rotundum paruum, lon-
go pedicello infidens, succedit. Hanc Bononiæ D.
Agerius legit, & Drabam feruentem vernam no-
minaria affirmavit.

II. **DRABA** flore cæruleo galeato: ex radice
fibrosa albicante, Asclepiadi simili, gustu ferui-
dioris aromatici, caulis vnus (aliquando dico) cu-
bitalis, læuis, striatus, in ramos brachiatus, exurgit:
quem folia pauca vestiunt, quorum inferiore sub-
rotunda, læuia, per marginem crenata, vncias duas
longa, vncia minus lata: superiora vero angusta, a-
cuminata & dentata, floribus est cæruleis galeatis,
vt in Orchide, vnciam longis, alternatim in caule
dispositis. Lutetia D. Cherlerus, ex Gallia Narbo-
nensi, D. Burserus, attulere.

DE COCHLEARIA.

CAPVT XVI.

I. **COCHLEARIA** minor erecta: Ex radícula
capillacea, cauliculus tenuis, læuis, palmo
minor, prodit: foliola habet ad radicem pauca; exi-
gua, oblongis capillaceis pedicellis donata, & quæ
cauliculum alternatim ambiunt, lente minora sunt
exiguis pedicellis donata & instar Cochleariæ Bri-
tannicæ sinuata: in cauliculo summo, flosculi albi,
quibus siliquæ parvæ, oblongæ, semen minutissi-
mum nigrum continentes, succedunt. Hæc in Da-
niæ Insula Amagria, in autumnò à D. Olao Worm
collecta, & Hassnia, Cochleariæ nomine transmi-
ssa fuit. Similem sed palmarem, cauliculo crassiore
in duos ramulos diuiso, ex eodem loco, D. Caspar.
Bartolinus misit.

II. **COCHLEARIA** Danica repens: hæc vn-
ciarum trium est, radícula & foliolis priori simili-
bus, sed numerosioribus, inter quæ cauliculi semi-
unciales, minutulis flosculis albis ornati: Hæc eo-
dem quo prior loco prouenit, humi instar herbæ
cancris serpit, omnino folijs, floribus, seminū locu-
lis & gustu priori respondens, quemadmodum D.
Olaus Worm perscripsit, & D. Bartolinus, Coch-
leariæ marinæ parvæ repentis nomine misit.

Brassica spinosa.



DE BRASSICA.

CAPUT XVII.

I. **NAPOBRASSICA.** Radicem habet Napo, aut Carotæ pene similem; admodum fibrosam & villosam, ut barbata aut pilosa, propter multiplices & minutas fibras, dici possit: & licet frequenter fibram pollicis crassiores habeat, attamen semper prima radix tuberosior & longior, quæ Napum imitatur, conspicitur; ex hac caulis sesquicubitalis, lævis, rotundus, in ramos brachiatus exurgit: folia ad radicem, una cum pediculis oblongis, palmaria, Brassicæ sylvestris modo & subrotunda, & in profundas laciniâs diuisa; quæ vero in caule, oblonga sunt; angusta, sinuata, pediculis carentia: flores lutei, intensioris coloris, quam in vulgari, magni, qui in cauli palmum excedente, inordinate longis pediculis insident, quibus siliquæ angustæ,

vinciales succedunt. In locis frigidioribus agri Norici, montanis potissimum, & versus Bohemiam colitur, & ab incolis Dorseti vel Dorschen appellatur. Radix esui apta est, quare aliqui eam ut Brassicam floridam condunt: pauperes minutim ut Rapas concidunt: sic per hyemem in cella in arena, vel ad cibum, vel ad semen sequentis anni, asservatur. Aliquando radix propter nimiam æstatis siccitatem & loci angustiam, lignosior euadit: quare post sationem, in area spaciola plantanda est.

II. **BRASSICA spinosa.** Huius solum binos ramulos habemus, quorum descriptionem subiungamus: caulis lignosus, crassus, in ramulos duos, alterum palmo maiorem, alterum minorem, rotundum, lævem, striatum diuiditur: circa quos folia biuncialia, & semiunciam lata, per ambitum leuiter sinuata, quibus & minora interijciuntur: ramuli in spinas acutas, vnciales & minores abeunt. Ramulam vnum. Patavij in horto Bembiano natum, à D. Cameratio; alterum ex horro D. Alpini priuato accepimus, cuius figuram etiam Matthiolo nostro addidimus.

III. **BRASSICA sylvestris alpina:** ex radice exigua, alba, caulis palmo altior, rotundus, lævis exurgit: folijs est tenuibus pallide virentibus, leuiter sinuatis, circa radicem oblongis, plenisque vncialibus, in caule paucis, pediculis carentibus: in summo flores albi quasi in umbella dispositi, longiusculis pedicellis donati: siliquas non vidimus. Hæc in Austriæ montibus natam, Turritis alpina nomine, D. Burserus, misit.

DE ACETOSA.

CAPUT XVIII.

I. **ACETOSA Americana** folijs longissimis pediculis donatis: ex radice caules plures, rotundi, striati, læues, cubitales, in terram reclinati, prodeunt, qui mox in plures ramos oblongos brachiantur: folia habet pallida & veluti nitroso puluere obfusa, angulosa, non tamen ut in vulgari bifurcata, aut alata, sed potius triplices forma biuncialia, & pediculis triuncialibus donata, mollia, carnosa, sapore acido, ex quorum sinibus alæ surgunt, folijs minoribus, sed eadem forma: in quorum, ut & caulis summo, flores exigui, muscosi, veluti in spica dispositi, emicant: quibus fructus foliacei (ex tenuibus rufescentibus membranis elegantissi-

gantissimis venulis, veluti in Fritillaria, per eas discurrentibus, compositi) vt in alijs, sed quadruplo, quam in vulgari maiores, ex paruis pedicellis dependentes, succedunt, quibus semina triangularia oblonga, rufescentia & splendentia inclusa continentur. Hanc aliquot annis in horto aluimus.

II. ACETOSA rotundifolia alpina: planta palma minor, ex cuius radícula, folia quina, sena, violæ luteæ alpinæ modo rotunda, vnguem lata, pediculis tres, etiam quatuor, vncias longis & tenuibus donata, prodeunt, & inter hæc, cauliculus lævis & nudus sexuncialis, exurgit in cuius summo flosculi muscosi parui, veluti in spica vnciali, cui foliolum simili forma subijcitur. Hæc in muris Noldochij, quod in monte maiore Bernhardi Helvetiorum est, provenit, vnde D. Fleisserus attulit.

III. ACETOSA scutata repens: radiculis est rufescentibus, cauliculis nodosis, tenellis, per terram repentibus, vncias quatuor longis: folijs vnguem latis, sed longis pediculis cauliculos æquantibus, donatis, formam feuti, vel potius Arenis folium referentibus, in medio tamen vtrinque finem obtinentibus & in apicem desinentibus. In horto Patavino nata.

IV. ACETOSA Cretica semine aculeato: radice est parua, rufescente, fibrosa, in summa tellure hærente: cauliculis quandoque pluribus palmam superantibus, humi reclinatis, quandoque vno, sed in ramulos brachiato: folijs paruis, oblongis, pediculo donatis, auriculis carentibus: flosculis multis, exiguis, muscosis, circa ramulos semipalmares in modum spicæ alternatim dispositis, quibus semen succedit, tenuibus membranis aculeatis inclusum, cui pediculus oblongus, incurvus, tenuis, vt in Caltha additur. Iunio floruit & semen maturuit, anno 1594. in Illustri Ducis Wirtebergici horto, qui Montembelgardis colebatur, semine Florentia à Casabona misso: Hanc in Phytopinace & Matthiolo, figura addita, Acetosæ Creticæ nomine, proposuimus.

V. ACETOSA lanceolata angustifolia repens: hæc cauliculis est pedalis, rotundis, striatis, per terram sparsis, folijs ternis, quaternisve, alternatim in caule dispositis, vncijs quatuor à se inuicem distitis, angustissimis, crispatis, vncias quatuor longis, lanceam referentibus, cum ex pediculo in alas

Acetosa Cretica semine aculeato.



duas vtrinque bifurcatas abeant, sensimque angustiora reddantur: floribus est minutulis, rubentibus, spicæ oblongæ adhaerentibus. Hæc in arenosis circa Norinbergam reperitur, vnde D. Doldius anno 1604.

misit.

55(55)

Laphatum maritimum foetidum.



DE LAPATHO.

CAPVT XIX.

LAPATHVM maritimum foetidum: radice est & caule atro rubente, pedali, incuruo, quem folia atrorubentia, subrotunda, longis pediculis donata, & vncialia interdum sinuata, communiter alata, ambiunt: ex quorum sinu ramuli exurgunt, similibus folijs cincti, quorum superiora leuiter per ambitum dentata sunt: in caulis summo flosculi quadrifolij, muscosi, quasi in spica dispositi; quibus vtriculi foliacei, subrotundi, satis magni, semen continentes, succedunt. Hæc dum viret grauis odoris est, & in maritimis non longe Monspelio provenit.

Centaurium alpinum luteum.



DE CENTAVRIO MAIORE.

CAPVT XX.

CENTAVRIVM alpinum luteum: radicem habet rectam, profunde descendentem, crassam, parumque fibrosam, subastingentem & Centaurij maioris sapore fere præditam. Caulis est sesquicubitalis, etiam bicubitalis, rotundus, striatus, in alas brachiatus: folijs ludit, quæ enim ad radicem palmaria, & sesquipalmaria, vncias quatuor lata, inæqualiter laciniata & crenata, glabra, pallide virentia, nervo albo folium percurrente: at quæ in caule sunt, planta florescente, quædam cultum superant, quædam palmaria sunt, & in partes decem, duodecim, pauciores, pluresve, vncias quatuor longas, semunciam latas, per marginem leuiter dentatas, ita secantur, vt folia peculia esse videantur.

deantur. Flores lutei, Centaurio maiori similes, ramulis insident: ex calice enim squamoso, florum stamina plura prodeunt: ex capitulo ante meridiem liquor pellucidus, & Mannæ instar dulcis, in guttis seu stillis sponte exudat, & capitulum compressum & suctum, altero tamen die hunc humorem emittit. Floribus semina Centaurij similia, aliquanto tamen minora, succedunt. In monte Baldo prouenit: plantam & semina, D. Doldius Norinberga quoque misit.

Beta Cretica semine aculeato.




DE BETA.

CAPVT XXI.

BETA Cretica semine aculeato: ex radice tereti, breui, parum fibrosa, caules plures cubitales, per terram sparsi, rotundi, striati, ad radicem leui hirsutie canescentes, in ramulos effusi, exurgunt: folia habet pauca, Betae nigrae similia, sed minora, longis pediculis donata: flores parui, ex flauo virescentes: fructus statim ad radicem multi conspiciuntur, & hinc inde per caulem, ad quodlibet fere folium asperi, extuberantijs donati, in aculeos tres, in latera reflexos abeunt: in cuius cavitare, granum vnum continetur, forma seminis Adonidis subrotundum, in apicem abiens, duplici membrana rufa tectum, interiore, proxime medullam albam farinaceam cingente. Hanc primum in horto D. Zuingeri, Iulij mensis principio florentem & Augusti fine semine pregnantem, eamq; aridam legimus & nunc à multis annis in hortulo nostro, colimus: cuius descriptionem in Phytopinace primum, dein in Matthiolo, figura addita, exhibuimus,

(5): (5)

Atriplex sylvestris lappulas habens.




CARV. XXII.

ATRIPLEX sylvestris fructu compresso roseo vel stellato: à radice caulis exurgit pedalis, rotundus, incuruus, lævis & albus, qui statim in aliquot ramos inæquales, & hic in alios minores, dividitur; folia habet alba, quasi polline aspersa, vnguem lata, sinuata vel angulosa, vt in Atriplice sylvestri, quæ Pes anserinus dicitur, pediculis carentia: his fere singulis, fructus foliaceus, pallidus, cō-

pressus, apponitur, cuius formam elegantem vix exprimere licet: is enim in medio leuiter extuberat, quatuor alijs extuberantijs, in circumferentia adpositis, quas tamen sinus leues intercedunt, ea plane forma, qua rosæ depressæ, in quorundam nobilium insignijs pingi consuevere: in singulis quatuor extuberantijs, semen compressum, mediocris magnitudinis continetur. Si fructus hi mori rudimentum exprimerent, ad Atriplicem sylvestrem bacciferum Clusij referri posset: Hanc Monspessuli circa mœnia collegimus.

II. ATRIPLEX sylvestris lappulas habens: extradice parua fibrosa, cauliculi palmares, striati, emittuntur, quos folia atrouirentia, parua, angulosa, alternatim disposita, breuib. pediculis donata, cingunt: ad quorum exortum lappulæ duæ, Coriandri seminis magnitudine, adhærent, semen nigrum, paruum, compressum continentes. Hanc Atriplicis syl. insipidæ parvæ erectæ nomine, D. Doldius misit; at in monte Ventoso Galliæ Narbonensis, altius excreuit. Hanc in Phytopinae sub octaua descripsimus, etiam in Matthiolo, vbi figura à sculptore non satis recte expressa addita, quare aliam in nostro Theatro, si Deus volet, & etiamnum, proponimus.

III. ATRIPLEX maritima angustifolia: caule est subcane, lignoso, cubitali, ramoso, in spicas alias breviores, alias longiores, pallide flavescentes, & maculis nigris punctatas abeuntes: folijs inferioribus vncias duas, absque pediculo longis, angustis, crenatis, nigricantibus, superiorib. angustioribus, & plerisque crenis carentibus: plura non licet, cum solum ramum sicum Ruppellæ collectum, D. Rumbaum attulerit.



LIBER TERTIVS.

DE HALIMO.

CAPVT XXIII.

HALIMVS minor: ex radice tenui, capillata, cau-
lis cinericeus, palmum superans, varie incur-
uatus exurgit, qui paulo super radicem, in ramulos
plures tenues vncias tres longos, abit: folijs paucis
cinericeis, & oblongo rotundis: sed in ramulis an-
gustioribus nonnullis instar Atriplicis, vtrinq; vna
lacinia diuisis: flosculi plures, parui, herbacei, mus-
cosi, intus luteoli, lōgis pedicellis, per ramulorum
summitates sparguntur: quibus vascula quadru-
plicita, semen paruum, griseum, reniforme, conti-
nentia, succedunt. Hic infra Northusam in der gūt.
den Xw prouenit, vt ex literis D. Fureri colligere est
qui plantam nomine Halimi aurei arui anno 1617.
transmisit.

Cynocrambe Dioscoridis.



DE CYNOCRAMBE

CAPVT XXIV.

CYNOCRAMBE Dioscoridis: ex radice oblonga,
tenui, fibrosa, viticuli plures, palmares, quan-
doq; longiores, rotundi, striati, læues & succulen-
ti, virides, aliquando parum rubescentes, reclinati,
geniculis plurimis distincti, prodeunt: ex quorum
singulis emergunt primum foliola duo, Alines
forma subrotunda, mox alternatim ex vna parte,
eodemq; loco folium sextuplo maius, oblongo pe-
diculo donatū, oxalidis rotundę folio oblongius,
quadam veluti aspergine obsitum, succedit: rādem
ad idem geniculum, alia decuplo minora, bina,
terna, etiam sena notantur: iuxta quæ ab ima radi-
ce, ad viticulorum summa internodia, flosculi, bi-
ni, terni, quaterni, muscosi ex herbaceo albidī, plu-
rimis filamentis donati: quibus succedunt fructus
totidem, geniculis inter folia hærentes, Mercuria-
lis forma, sed minores, rotundi, duriusculi, primum
virides; postea ex nigro cinerei, medulla alba re-
ferti. Herba gustu est insipido & aquoso. Montpes-
fuli locis vmbrosis legitur: mox Cynocrambe no-
mine & plantam & semen, à D. Cortuso accepi-
mus, quæ copiose nobis prouenit. Hanc videtur
doctiss. Columna in suo Phytobasano, Alines no-
mine expressisse, quam in Matthiolo
descripsimus, & figuram
adposuimus.

H

DE

Lactuca folio oblongo acuto.



DE LACTUCA.

CAPVT XXV.

I. LACTUCA folio oblongo acuto: hac radice, caule floribus, alijs lactucis similis est, & solum folijs differt, quę leuiter sinuata sunt, palmum longa, uncias duas lata, in acumē fastigiata, & nervo per folium excurrente eleuato. Huic, Lactuca Gallica, apud Durantem, valde similis est, quam à Ioa. Bauhino fratre accepimus, & in horto Montembelgardiano postmodum legimus.

II. LACTUCA Italica laciniata: huius folium tenuissimum est, pallide virens, in plures partes semipalmares & laciniatas diuisum: per reliqua vulgari Lactucę similis, quę esu tenerrima: ex semine Italico in horto copiose creuit.

Sonchus asper laciniatus Creticus.



DE SONCHO.

CAPVT XXVI.

I. SONCHUS asper laciniatus Creticus: ex radice, sculis cubitalis, inæqualis, striatus, asper, cauus & ramosus exurgit: folijs ad radicem palmaribus & sesquipalmaribus, primis quidem vix laciniatis, alijs vero in plures & magnas lacinias diuisis, & in circumferentia nonnihil asperis: floribus est luteis, magnis, quorum singuli singulis oblongis pediculis insident, qui aliorum more in pappum in quo semen latitat, abeunt. Hic ex semine ex Creta accepto in horto creuit.

II. SONCHUS asper subrotundo folio: ex radice exili, longiuscula, cauliculus rotundus, palmaris, aliquando sesquipalmaris, parte inferiore breuissimis aculeis exasperatus, exurgit: circa quem folia pauca,

pauca, subrotunda, sesquiuncialia, quorum quædam sinuata, omnia tamen per marginem, vt & netuus per folij medium excurrens, leuissimis aculeis exasperantur: in cauliculi summo duo tresve pediculi, quorum singuli vnum florem Hieracio similem, paruum, luteum, qui in pappum abit, sustinent. Monspelij sponte nascitur, & Sonchus aspera vulgi flore Hieracij, nominatur.

Est huius & minor species, capillari radícula à qua pedicelli bini, quatuor vel sex uncias longi, aliquot vero vix unciales, vnicum florem paruum luteolum sustinentes, exurgunt: flori, semen minus nigrum, pappo adhærens, succedit: circa radicem folia sena, septena, parua, obtusa, per latera dentata. Ibidem reperitur.

III. SONCHVS læuis in plurimas tenuissimas lacinias diuisus: caule est viridi, læui, tenui, striato & pedali, in summo in alas brachiato: folijs in plures angust. slacinias diuisis, ad caulis diuisionem maioribus: floribus luteis mediocribus & in pappum abeuntibus. Monspelluli ad muros, vt & Florentie apud quos in acetaria venit, prouenit.

IV. SONCHVS angustifolius maritimus: radice est palmari: tenui, fibris carente, folijs ad radicem pluribus, atrouirentibus, uncias quatuor, quandoque sex longis, rarius unciam latis, per margines spinulis exasperatis, & reliquorum Sonchorum instar lac fundentibus; inter quæ caulis vnicus, palmaris & sesquipalmatis, tenuis, læuis, duobus tribusve foliolis sua basi eum cingentibus, cuius summo flos vnus, (rarius duo) satis magnus & luteus infidet, & tandem in pappum abit. In litore Veneto ad Lio primum, dein circa Monspellum, æstatis initio collegimus.

V. SONCHVS montanus læuis laciniatus minor: ex radice crassiuscula caulis in principio crassus & lignosus, rotundus, læuis, statim in alas brachiatus, ad cubitalem altitudinem accedens, exurgit: folijs est sesquiuncialibus, in paucas lacinias, late distantes & acuminatas diuisis: flores in caulis summo, veluti in spica alternatim dispositi, parui, & palliduli. In montibus Euganeis frequens est.

VI. SONCHVS villosus luteus minor: ex radice rufa longiuscula, fibris carente, cauliculi bini, terni, rotundi, nonnihil villosi, palmum superantes, & in summo in ramulos binos, ternosve diuisi, prodeunt: folia pauca ad radicem, uncias quatuor longa, sed angustissima, lacinijs late à se distantibus & læuibus, diuisa, quæ circa caulem strictissi-

Sonchus montanus læuis laciniatus minor.



ma: & uncialia: flores in summis ramulis intense aurei, ex paruis capitulis, suauitomento villosis prodeuntes, in pappum abeunt. Tota planta leuiter tomentosa est, & à quibusdam Hieracium tomentosum dicitur. Monspelluli in læuco Gramuntio prouenit.

Cichorium spinosum Creticum.



DE CICHORIO.

CAPUT XXVII.

CICHORIUM spinosum Creticum: ex radice oblonga, mediocriter crassa, fibris paucis donata, denso cortice albicante tecta, caulis durus, lignosus, mox in ramos multos palmares, virides, striatos, late diffusos brachiatum, qui oēs in oblongas, communiter bifurcatas, aliquando trifurcatas quasi spinas, seu cornua finiunt: folia circa radicem plura per terram sparguntur, quae oblonga, angusta, acuminata & Cichorij vulgaris modo in ambitu circumrota, vel in plures lacinias superficiarias & subrotundas diuisa, quae in cauliculis angustiora, nec circumrota: amara sunt, non lactescunt & cito pereunt, etiam reliquis plantae partibus eleganter virentibus.

Flores, in ramorum maxime alis, ex calicibus imbricatis prodeunt, forma vulgaris similibus, sed longe minoribus, caerulei coloris, ex quinque folijs summa parte leuiter incisus, compositi, in quorum medio stamina aliquot flaua continentur: his semen vulgari simile, parique theca inclusum, succedit. Iulio & Augusto floret. Hoc primum Chondrilla spinosa, dein Cichorij spinosi, nomine & planta & semen D. Dold. misit, ex quo in horto D. Zuing. creuit: postmodum ex Creta ab Honor. Belli, Cichorij spinosi appellationes, qui monuit, vulgo *sanctusati*, hoc est, hydriam spinam dici, quo Cretenses in Cichorij defectu vtantur. Huius primum in Phytopinace anno 1596, meminimus, dein in Matthiolo iconem cum descriptione anno 1598. exhibuimus: postmodum Chondrilla peregrina nomine Clusius, & apud eundem sub Cichorio spinoso Cretico Belli, Pona an. 1601. proposuere.

DE DENTE LEONIS.

CAPUT XXVIII.

DENS Leonis latifolius caulescens: caule est cubitali, hirsuto, rotundo, striato, & cauo; quem folia basi alata, in lacinias aliquot diuisa, subrotunda, vncias sex longa, sesquiunciam lata, marginibus nonnihil pilosis, cingunt, quaeque in caulis summo tantum leuiter sinuata, proxime caulem vestiunt: flos magnitudine fere & colore, sed pallidior, ut in Dente Leonis vulgari. Plantam hanc absque radice ex horto nobiliss. Nicolai Contareni, nomine Hieracij Hispanici à D. Loretio accepimus.

II. **D**ENS Leonis tenuissimo folio: ex radice crassa, rufa & fibrosa, folia aliquot tenuissima, virore splendentia, palmaria, vncias duas lata, primum profunde laciniata, dein qualibet lacinia, ut plurimum utrinque duplici, vel triplici leui lacinia (vel potius apice) subdivisa prodeunt, ut & pediculi tenuissimi, nudi, duabus vncijs folijs longiores, florem paruum sustententes. In Austria prope montem Drauenstein/D. Burserus reperit.

III. **D**ENS Leonis minor folijs radiatis: ad radicem paruum nigricantem, folia plura per terram sparsa, vncias tres longa, semunciam lata, in plures lacinias profundas diuisa, quibus hoc peculiare, quod quodlibet folium in summo in tres profundas lacinias diuidatur, & harum qualibet apices plures, quasi radios obtinet: foliorum pediculi leuissimis

uissimis pilis pubescunt, cauliculi plures, laeues & nudi, quorum vnus palmo minor erigitur, reliqui breuiore reclinati, singuli florem vnicum, paruum, luteum, in pappum abeuntem, sustinent. D. Neudorfferus communicauit.

IV. DENS Leonis minor aspero folio: ad radicem paruum albicantem, folia plura subrotunda, duas tresve uncias longa, vnam lata, laciniata & per ambitum leuissimis spinulis, vt in Soncho, exasperata: cauliculus duarum unciarum, florem satis magnum, pallide luteum sustinet. Monspeßuli pro-
uenit.

Hieracium dentis leonis folio hirsutie
asperum minus.



DE HIERACTO.

CAPVT XXIX.

I. HIERACIVM dentis leonis folia hirsutie asperum minus: radice est parua, oblonga, ad cauliculorum & foliorum exortum rufescente, folia ad radicem pilosa, aspera, angusta, uncias duas longa, in lacinias diuisa, inter quæ cauliculi nudi, asperi, modo vnus, modo bini, ternive, palmam non excedentes exurgunt, florem vnicum, aureum, in pappum abeuntem, sustinentes. Monspeßuli prouenit.

Idem, sed longe asperius, folijsque latioribus, ex Hispania D. Albinus attulit.

II. HIERACIVM minus glabrum: ex radice albicante, oblonga, tenui, cauliculi palmares, rarius pedales, tenues, laeues, virentes, in alas diuisi, exurgunt, folia habet parua, ex virore splendentia, oblonga, angusta, raris lacinijs prædita: quorum quædam basi latiore & alata, cauliculum amplexantur: floribus est minoribus, quam in vlla specie, aureis, quorum singuli singulis pedicellis, unciam superantibus, insident & aliorum more in pappos abeunt. Apud nos circa autumnum florens, in agris reperitur.

III. HIERACIVM dentis leonis folio obtuso minus: ad radicem paruum folia sena, septenave terræ incumbunt, quæ crassa & aspera, uncias duas longa, unciam semis lata, obtusa, nec profunde laciniata: inter quæ caulis laeuis, nudus & cauus exurgit, qui florem vnum pallide luteum & magnum sustinet. Prouenit in pratis extra minorem Basilicam.

IV. HIERACIVM dentis leonis folio floribus paruis: ex radice parua, lignosa, fibrosa, capillacea & albicante, caulis pedalis, rotundus, aliquantum hirsutus exurgit, quem ad radicem folia pauca, subaspera, coriacea, acuminata, uncias tres longa, semunciam lata, cingunt: in caule ad eius medietatem pauca, solum dentata, eumque basi suæ completentia: cuius summo flosculi plures, lutei, pedicellis breuissimis insident. Hoc in Gallia Narbonensi circa Massiliam reperitur.

V. HIERACIVM dentis leonis folio bulbosum: radix ex aliquot oblongis quasi Asphodeli bulbis composita, de se mittit caulem cubito altiore, nudum, leuem, striatum, circa medium

in

in ramos pedales (vnum vel alterum) diuisum, quorum quilibet florem paruum, subflauum, sustinet: folia ad radicem per terram sparsa dentis leonis similiter sinuata & coriacea, inferne molli lanugine pubescentia, superne subaspera, vnciam lata, tres longa, Monspelio D. Saltzmanus attulit.

VI. *HIERACIUM* tomentosum Hispanicum: tota planta mollis est, incaua, tomentosa; radicem habens cortice rufescente testum, caulem palmarem, rotundum, incanum folia ad radicem oblongis pediculis donata, vncias tres quatuorve longa, semunciam lata, mollia, crassiuscula, ad formam foliorum dentis leonis vulgaris sinuata, quæ in caule angustiora, minusque profunde sinuata: cauliculi summo, flores bini, terni, lutei, breuissimis pedicellis insident, quorum singuli ex eleganti calice hirsuto in plures apices diuiso, emicant. In aridis & saxosis Aragoniæ, D. Albinus obseruauit.

Hieracium maximum asperum Chondrillæ folio.



VII. *HIERACIUM* maximum asperum Chondrillæ folio: caule est sesquicubitali, crasso, rotundo, inæquali, striato & aspero: in summo in ramos semipalmares brachiato: quorum singuli singulos flores luteos sustinent: folia habet pauca, alternatim caulem ambientia, Chondrillæ modo in laciniis diuisa, vncias tres longa & hirsutie aspera. Monspessuli in asperis, quæ loca cariges vocant, prouenit.

VIII. *HIERACIUM* alpinum angustissimo oblongo; folio: ad radicem duriusculam rufescentem, folia plura graminea, palmo longiora, glabra, atroviuentia, obseruantur: inter quæ caulis cubitalis, leuis, rotundus, striatus, paucis folijs cinctus & circa medium in plures ramulos diuisus, exurgit: ramulis singulis flos vnicus, paruus, luteus insidet, cui semen paruum succedit, quod cum suo pappo à vento excutitur. In monte Baldo reperitur.

IX. *HIERACIUM* alpinum pumilum Chondrillæ folio: tota planta palmaris est, ex cuius radice alba, cortice nigricante testata, folia aliquot prodeunt læuia, pallide viuentia, vncias quatuor longa, pediculis longis donata, vix laciniata: inter quæ cauliculus exurgit rotundus, folijs Chondrillæ modo diuisis cinctus, qui in summo in duos, tresve ramulos vnciales diuiditur, quorum singuli florem vnum, luteum satis magnum sustinent. Crescit in Sneeburg Austriæ, vbi D. Burserus legit, & anno 1616. Hieracij aphacoidis nomine, transmisit.

X. *HIERACIUM* intubaceum flore luteo. Hoc folijs est Intubi, caulem proxime ambientibus, alijs integris, alijs in sinus profundos laciniatis, longitudine vncias quatuor, latitudine sesquunciam superantibus, atroviuentibus & læuib; caulem habet tenuem, pedalem, ramosum, reclinatum & læuem: cauliculo pene palmari nudo, flos vnicus, luteus, mediae magnitudinis insidet, cui semen paruum pappo inclusum succedit. Hoc (vt & subsequens) Hieracij Aphacoidis nomine à D. Doldio, dein ex Italia, Sonchi Hieracitidis nomine, accepimus.

XI. *HIERACIUM* Intubaceum flore magno albedo: hoc folijs est priore longioribus, latioribus, magisq; laciniatis: flore etiam maiore, albedo, medio luteo, foris subrubente.

XII. *HIERACIUM* proliferum falcatum: radicem habet albicantem, oblongam, tenuem, capillatam: folia atroviuentia, dentata, aspera, vncias duas longa, semunciam lata: cauliculos læues, rotundos,

rundos, parum foliatis, palmates: capitulum paruum, ex plurimis stylis gracilibus, per maturitatem recuruis, & asperis, compositum, inter quæ flos luteus, medio fuscus: at sub floris capitulo, communiter vtrinque; ramulus vnus, rarius duo, læuis, nudus, vncias quatuor, quandq; superans, exurgit, quibus vtrinque; foliolum angustissimum subijcitur, & horum summo similiter flos insidet, & sæpe sub hoc quoque; flore, pedicellus flosculum sustinens, emergit.

Hoc minus etiam reperitur, ita vt tota planta, palmum non excedat. Monspeßuli in luco Graniuntio reperitur, & quod minus est, Hieracium medio luteum vocant.

XIII. *HIERACIVM* minimum falcatum: plantula est vncias sex non excedens, radícula longiuscula, tenuissima, rufescente, ex qua cauliculi aliquot capilli crassitie, in ramulos diuisi, inter folia laciniata, læuia, vncias duas longa, at angusta, exurgunt: flores singuli exigui, luteoli, pedicellis singulis insident, qui in star prioris in stylos minutissimos recuruos & pungentes, absumentur. In arenoso litore maris non longe Monspelio inuenimus.

XIV. *HIERACIVM* montanum rapifolium: ex radice rufescente, oblonga, parum capillata, folia pauca, ad Rapæ vulgaris modum, in lacinias subrotundas, per margines sinuatas, & ad tactum asperas, diuisa, pediculis oblongis rubentibus & asperis donata, prodeunt: inter quæ caulis cubito altior, cauus, striatus rufescens, vno alterove breui folio cinctus, exurgit, qui superne in ramulos plures diuiditur, quorum singulis, flos communiter vnus, rarius duo, pediculis tamen distinctis insidet, luteus, mediæ magnitudinis, qui tandem in pappum abit. In monte Wasserfall prouenit.

XV. *HIERACIVM* montanum folijs dentatis flore magnò: hoc folijs est atrouirentibus, lanugi-

ne, carentibus, ad radicem maxime dispositis, vncias quinque; longis, vnam latis, per circumferentiam & dentatis, & leuissima lanugine pubescentibus: inter quæ caulis pene nudus, pedalis, cauus, hirsutie asper, exurgit, qui florem vnum eumque magnum, saturate luteum, eleganti quasi calici inclusum, sustinet. Hoc in Heluetiorum montibus, Gottardo, & circa Thermas Fabarias, crescit.

XVI. *HIERACIVM* ramosum magno flore: hoc caule est bicubitali, rotundo, subaspero, in ramos diuiso, quibus singulis, flos magnus, aureus, dentis leonis forma insidet: folia habet pallide virentia, non nihil aspera, sinuata, & per margines exiguis pilis donata, longitudine palmum superantia, tres vncias lata, per quorum longitudinem, costa insignis excurrit, à qua per transversum venæ feruntur. In montibus Belluensis reperitur.

XVII. *HIERACIVM* alpinum non laciniatum flore fusco: caule est sesquipalmari, hirsuto, parte superiore aphylo: folijs ad radicem hirsutis, obscure virentibus, acuminatis, duas tresve vncias longis, vnciam latis: floribus aliquot paruis, fuscis, in pappum (cui semen paruum oblongum & nigrum includitur) abeuntibus, & caulis summo insidentibus: quod in Rhætici montibus prouenit.

XVIII. *HIERACIVM* hortense non laciniatum floribus atropurpureis: caule est bicubitali, hirsutie aspero, & pene aphylo: folijs ad radicem paucis, palmaribus, vncias tres latis, obscure virentibus, leuiter hirsutis, & per marginem leui lanugine pubescentibus, floribus atropurpureis: quod à quibusdam Pilosellæ maioris nomine (siquidem cum Auricula muris maiore Tragi, multum affinitatis habeat) in hortis colitur: & à priore cultura solum differre videtur.

Hieracium pumilum saxatile asperum, radice præmorfa.



XIX. HIERACIUM pumilum saxatile asperum radice præmorfa: ad radicem crassiusculam nigricantem, in fibras oblongas, præmorfas abeuntem, folia plura, villosa, acuta, longis pediculis donata, vncias tres, quatuorve longa, semiunciam lata, in circuitu rarioribus denticulis donata: inter quæ cauliculus palmo minor, hispidus, tenuis & rotundus, vno alterove foliolo vestitus exurgit, florem subluteum sustinens, cui semen paruum, nigricans, pappo immersum, succedit. In alpinis provenit.

Variat: nam & altera est species, folijs subrotundis, duas tresve vncias, absque pediculis biuncialibus, longis, sesquiunciam latis, per marginem crenatis: cauliculo longiore, tres quatuorve flores sustinente, & hoc Hieracium saxatile asperum radice præmorfa, folio subrotundo dici potest.

Est & tertia species, radice crassa, caulibus in


plures ramulos diuisis: quod in saxosis prope Clusam Solodurensium nascitur.

Priori plane simile Hieracij parvuli quarti nomine doctiss. Columna p. 2. proposuit, solum in eo differens, quod nostrum hirsutum sit, suum vero glabrum asserit.

XX. HIERACIUM montanum lanuginosum laciniatum parvo flore: ex radice oblonga, atrovirente, folia plura, pediculis vncias tres longis, donata, crassa, profunde laciniata, acuminata, molli lanugine pubescentia, superne atrovirentia, & quasi maculata, alia sesquiunciam lata, alia angustiora, inter quæ cauliculus palmaris, tenuis, mollis exurgit, cuius summo, flores aliquot lutei, parvi, & quidem singuli singulis pedicellis insident. Apud Monspelienfes, in horto Dei crescit.

XXI. HIERACIUM capillaceo folio: radice est Scorzonera simili, crassa, oblonga, tunica fusca & rugosa vestita, ex qua cauliculi bini; palmares, læves, singuli florem vnicum, pallide luteum, mediae magnitudinis, sustinentes exurgunt: folia ad radicem plurima, pili instar tenuia, duas, rarius tres, vncias longa, rigidiuscula, atrovirentia, rarius cauliculorum partem cingentia. Monspelio D. Salzmännus attulit. An forte Scorzonera

species?



XXII. HIERACIUM

Hieracium murorum angustifolium
non sinuatum.



XXII. *HIERACIUM* murorum angustifolium non sinuatum: ex radice crassa, rufescente, caulis sesquicubitalis, pene nudus, rotundus & asper exurgit, in cuius summo quasi in umbella, flores plures, parui, lutei, resident: folia ad radicem subnigra, mollia, uncias sex longa, vix semunciam lata, in caulis parte inferiore pauciora, breuiora, angustiora, longe à se inuicem distantia & inordinate disposita: in muris nostris reperitur: quod circa Patavium, longe minus obseruauimus.


XXIII. *HIERACIUM* profunde sinuatum pubescens: radice est nigricante, lignosa, fibrosa, caule bicubitali, rotundo, fistuloso, leui lanugine, vt & tota planta, pubescente, in ramos brachiato: folijs ad radicem oblongis, acutis, profunde sinuatis, etiam laciniatis, oblongis pediculis donatis, per caulem paucis, similiter acute laciniatis: flores singuli,

singulis pediculis, aurei, in pappum abeuntes, insident: In pratis Michelfeldenlibus siccioribus ad dumeta etiam in dumetis, prouenit.

XXIV. *HIERACIUM* fruticosum latifolium glabrum: ex radice fibrosa, nigricante, caules bicubiales, rotundi (leuissimis pilis hinc inde aspersis) exurgunt, qui in summo in ramulos breues brachiantur, quibus flores pallide lutei, vt in Hieracio Sabando siue fruticoso, insident: hos folia ambiunt alternatim disposita, tenuia, atrouirentia, acuminata, uncias quatuor vel quinque longa, sesquiunciam lata, per marginem oblongis & raris apicibus donata: hoc in montosis circa acidulas Perrinas Iulio floret.

XXV. *HIERACIUM* fruticosum folio subrotundo: caule est cubitali, rotundo, striato, subaspero, qui in summo in ramulos, trium quatuorve unciarum brachiatur, qui singuli, singulos flores, pallide luteos, in pappum abeuntes, sustinent, quem folia subuiridia, subrotunda, acuminata & dentata, uncias duas longa, sesquiunciam lata & leuiter hirsuta, basi sua cingunt: quod Hieracij foliati nomine D. Iungerm. misit.

XXVI. *HIERACIUM* fruticosum minus: huius varietas triplex occurrit; nam licet ex radice fibrosa, & quasi præmorsa, caulis pedalis simplex exurgat, attamen folijs breuibibus & leuissimis, circa Patavium: at circa Norinbergam, paucis, breuibibus, subrotundis, in circumferentia crenatis & asperiusculis prouenit.



*Chondrilla viscosa humilis.**Chondrilla purpurascens foetida.*

DE CHONDRILLA.

CAPVT XXX.

I. *CHONDRILLA* viminea viscosa Monspeliaca: ex radice oblonga, pallide lutea, caulis bicubitalis, albus, rotundus, striatus, in plures ramos brachiatus, exurgit: folia, caulis partem inferiorem cingentia (prima enim humi sparsa cum cito marcescant vt in vulgari, non notata) saligitis similia, vncias sex vel octo longa, semunciam lata & laeua, rarius vna, alterave lacinia donata: at superiora ramos cingentia, instar *Chondrilla* in tenuissimas & acutissimas lacinias diuiduntur: flores parui, lutei, vt in vulgari dispositi, in pappum, cum semen maturuit, euolantes. In aridis aggeribus viarum, estate circa Monspelim & in monte Lupi, reperitur.



II. *CHONDRILLA* viscosa humilis: ex radice longa, tenui, alba, cauliculi plures, tenues, reflexi, pedales, prodeunt, quos vtrinque ad palmam longitudinem, flores lutei, oblongi, in pappos abeuntes alternatim cingunt: folia habet ad radicem oblonga, angusta, quaedam sinuata, quaedam integra, & in caule paucissima: in agris Basileensibus autumnoplorens, inuenitur.

III. *CHONDRILLA* purpurascens foetida: ex radice oblonga, tenui, fibrosa, caules plures, ad cubiti altitudinem accedentes, ad exortum parum pilosi, ex rubore obscuro, cum foliorum pediculis splendentes, alias virides & striati, in summitate aphylli, exurgunt: folia ad radicem plura, palmum excedentia, instar foliorum *Chondrilla* Sesamoidis dicta, plus minusve sinuata, & acuminata, mollia, aliquando pilis exiguis cincta, neruo folium percurrente,

Iacobæa maritima latifolia.*Iacobæa alpina folijs rotundis serratis.*

currente, inferne (vt & foliorum pediculi) hispido: singulis caulibus, qui raro brachiantur; flos vnicus peramænus, magnitudine & forma *Parmicæ Austriacæ*, insidet, cuius discum medium, foliola sedecim & plura oblonga, diluto rubore purpurascencia, in apicibus diuisa, orbiculatim cingunt: qui, vbi semen maturuit, in pappum oblongum abit. Hanc Iulio mense florentem, primum in horto D. Zuingeri legimus, & in nostro coluimus: fœtidam vocamus, quia flos antequam aperiatur, grænem odorem spirat, qui & in folijs aliquantum aduertitur.

DE IACOBÆA.

I. *IACOBÆA maritima* siue *Cineraria latifolia*: hæc ex radice caules cubitales, rotundos, candido, mollique tomento obduetos, in alas bra-

chiatos, emittit: folia inferiora subrotunda, cum pediculis pedem lōga, vncias quatuor lata ad modum *Brassicæ vulgaris* laciniata, & per marginem sinuosa, superne ex viridi nigricantia, inferne incana, quasi cineribus aspera & mollia: at superiora minora & acutiora: flores, qui in hac quam vulgari maiores, oblongis pediculis incanis & nudis insident, quorum discum aureum, folia latiuscula, pallidiora, orbiculatim cingunt, qui tandem in pappos cum semine abeunt. Hanc a D. Doldio accepimus.

II. *IACOBÆA rotundifolia* incana: radice est crassiuscula tranſuerſa, rufescente, in fibras oblongas abeunte: caule pedali, incano: folijs subrotundis, crassius, superne virentibus, inferne incanis, vncias duas abque pediculis, longis, sesquiunciam latis, in ambitu dentatis, at in caule paucis & angustissimis: flos, qui *Scorzonera* flori similis, summo

cauli infidet, satis magnus & luteus: toti plantæ larugo quædam aspera est. In prouincia Galliarum D. Burserus legit.

Iacobæam alpinam folijs rotundis ferratis, sub

conyza alpina siue montana, Gesnerus proposuit: at Clusius, Iacobæam 4. vel latifoliam 2. nominauit & descripsit: huius figuram à nemine, quod sciam, proposiram, addere placuit.

LIBER QVARTVS. DE TANACETO.

CAPVT I.

TANACTVM alpinum: herbula est vnciarum quatuor, vel sex, odore aromatico prædita, tota incana, & pilis mollibus vestita: radice longa, crassiuscula, folijs vncialibus, tenuissime, vt in Millesolio alpino, à quo, odore potissimum discernitur, diuisis: in cauliculorum summo, flores in umbella dispositi, albi & parui. Hoc in altissimis montibus Heluetiorum & Rhætorum crescit: & hoc forsan Gesnerus in catalogo hortorum Germaniæ, Iuam Moschatam Rhætorum appellat.

DE CHRYSANTHEMO.

CAPVT II.

CHRYSANTHEMON latifolium Brasilianum: caule est aspero, striato, cubitali, quem folia rara, lata complectuntur, quæ circa basin vncias duas lata, quatuor, etiam quinque, longa, sensimque angustiora reddita aspera sunt & per margines leuissimis dentibus exasperata, ex quorum sinu pediculi oblongi prodeunt, florem luteum sustentantes, cuius discum ex pluribus oblongis luteis apicibus, compositum, folia septem latiuscula, in binas vel ternas crenas fissa cingunt, totusq; flos à quinque folijs viridibus inæqualibus veluti umbone sustentatur. Hæc in ramo exiccato, quem Chrysanthemi Brasiliani nomine, ex horto nobiliss. Contareni habemus, notare potuimus.



DE CHAMÆMELO.

CAPVT III.

I. CHAMÆMELVM leucanthemum Hispanicum magno flore: caules habet cubitales, striatos, in summo brachiatos, quos folia pediculis carentia, satis à se inuicem distita, cingunt, quæ vncialia, angusta, in lacinias tenues, obtusas, sed bifidas, diuisa: florem habet quadruplo vulgari maiorem, disco pallide luteo, quem folia circiter vicena, alta lutea, sinuata ambiunt, cui semina, vt in vulgari succedunt: annuum est & odoratum, à D. Gillenio, vna cum sequenti & vtriusq; semine, missum.

II. CHAMÆMELVM luteum Hispanicum odoratum: hoc caule & folijs cum vulgari leucanthemo conuenit, sed floribus luteis & odoratis, priori quidem minoribus, sed vulgari duplo triploque maioribus, disco luteo, quem folia quatuordecim, luteo colore splendentia, cingunt: in horto meo creuit.

III. CHAMÆMELVM leucanthemum incanum Hispanicum minus: plantula est palma minor, radice parua, fibrosa, rufescente, ex qua cauliculus tenuis, vncias quatuor altus, nudus, exurgit, florem vnicum, satis magnum, disco pallide luteo, folijs pluribus albis cincto, sustinens: foliola ad radium parua, incana, tenuissime instar Absynthij Galatici, vel Abrotani, diuisa, quæ insipida & inodora sunt. In regno Granadæ, ad agrorum margines, D. Albinus collegit.

DE ABROTANO.

CAPVT IV.

ABROTANVM campestre incanū, Carlinę odorē: huic radix est oblonga, fibrosa, rufescens, caulis pedalis, folia, eo modo quo Abrotani maris inferiora, diuisa, incana, & si terantur Carlinę odore, vt & sapore: in reliquis, cum Abrotano campestri conuenit. In Austria, ad Lintzium urbem circa vias prouenit, vnde D. Burserus misit.

DE ABSINTHIO.

CAPVT V.

ABSINTHIUM ponticum Creticum grati odoris: caule est cubitum superante, rotundo, incano, in ramos plurimos, quincunciales diuiso, folijs tenuibus, multum diuisis, mollibus & incanis: floribus vulgari forma & colore similib. paulo tamen maioribus. Hoc, quemadmodum Honor. Belli ex Creta anno 1596. (addita planta) perscripsit, in Creta frequentissime prouenit, perpetuo vires, odorem gratum spirat, nihilque amarum est, aut si quam secum amaritudinem habet, ea valde obscura est, in viridi enim, nulla percipitur: ab asinis & pecoribus, omnibusque brutis valde expetitur. Vocatur, *πικρία*, & non *αλυσια*, quemadmodum Anguillarus in Græcia vocari perperam scribit: ego legitimum Ponticum esse iudico: hactenus Belli. Hac de re dicturi sumus plenius, si Deus volet, in Theatro nostro.

II. ABSINTHIUM alpinum incanum: ex radice rufescente, capillacea, cauliculi plures palmares, reclinati, rotundi & albicantes, folijs quam paucissimis vestiti prodeunt: folia, diuisura & colore, Absinthio Pontico tenuifolio incano, similia sunt: ex cauliculorum parte media sursum versus, pedicelli tenuissimi, vnciales, cum subiecto foliolo, tenuissime diuiso, recti, alternatim exurgunt, qui capitulum squamatum, flores pallidos continens, sustinent: quibus semen minutum, nigrum, Tanacetii odore succedit: tota planta odore & sapore est Absinthij, & in Valesianorum alpibus, vt in petris supra Gemme, D. Fleisserus 1606. & D. Burserus 1614. collegit.

III. ABSINTHIUM alpinum candidum humile:

radice est crassiuscula, oblonga, rufescente, in fibras abeunte, ex qua folia candida, oblongis pediculis donata, tenuissime diuisa, cum cauliculis (aliquando vnico) trium, quatuorve vnciarum longis, rotundis, albo tomento vestitis & ad exortum reclinatis, prodeunt: quorum summo capitula squamata, plura simul, vt in stœchade lutea, sed minora, disposita, luteos flores continentia, insident: Tota planta candida est, quatuor vel sex vncias vix superans, & valde amara: ex Gletzerberg, Heluetiorum monte, non longe ab Augusta valle, D. Burserus attulit.

IV. ABSINTHIUM alpinum vmbelliferum: hoc non tanquam nouum proponimus, cum à Clusio, Lobelio, Taber. Gerardo & in historia Lugdunen. descriptum & pictum fuerit, sed quia in hoc varietatem obseruauimus, & de hoc litem esse scimus, quare de hoc pauca aspergere lubet. Nam Nicol. Clauena Bellunensis Pharmacopæus, Absinthij vmbelliferi historiam (addita figura) & vsum insignem proponens, nouum esse Absinthium, & à se primo in montibus Bellunenſibus inuentum, libello Venetijs 1610. cuso asserit: cōtra quem Pompeius Sprechis, Pharmacopæus Venetus, tractatu peculiari, sequente anno Venetijs edito, disputas, nouum non esse, sed à C. Clusio, pridem nomine Absinthij alpini vmbelliferi, propositum fuisse, affirmat. Sane occurrit varietas, sed tantum in magnitudine: nam id quod in monte seruæ Bellunatum, folijs est latioribus & longioribus, quam sint eius quod in Heluetiorum alpibus, & Baldo monte, prouenit: quo adhuc minus est quod in Austriæ monte *Trawentstein* reperitur: quemadmodum ex horto Patauino habemus, vmbella ex minoribus floribus composita, instar Millefolij vulgaris, floribus, præsertim antequam aperiantur, magis conglomeratis: quare tantum ratione loci differre censemus, & quidem ex plantæ inspectione & examine diligentiore, vt qui in Baldo & Heluetiorum alpibus collegerimus: Belluni nam.

Clus. Angelus Busti Medicus Venetus:

Austriacam vero, D. Burserus, transmisit.

DE MILLEFOLIO.

CAPVT VI.

I. **MILLEFOLIUM** maximum umbella alba: caulibus est sesquicubitalibus crassis, rotundis, striatis: folijs circa radicem palmum longis, uncias quatuor latis, tenuissime incis, & velut è multis minutissimis alatis foliolis constantibus, sed minoribus & tenuissime incis, quæ circa caule sunt, qui in ramos plures brachiantur, quibus singulis umbella, uti in Millefolio vulgari, sed maior, flosculis albis referta, infidet. In horto Patauino creuit.

II. **MILLEFOLIUM** purpureum maius: ex radice crassa satis, caules plures ad cubitum & sesquicubitum excresecunt: folijs uti in vulgatissimo Millefolio dispositis, umbella magna, flores elegantissimos rubri coloris & quinquefolios continens, in quorum medio apices pallide flauescences, qui gratiam addunt, emicant: flores contriti, medica-

tum odorem spirant. Hoc Goppingæ primum in Pharmacopæi horto legimus, & nunc in horto collimus: quod Clusius nomine Millefolij rubro flore proponere videtur: an hoc forte Matthiolo Millefolium majus?

III. **MILLEFOLIUM** incanum Creticum, siue Millefolium Dioscoridis: caulibus est lignosis, rotundis, incanis, sesquipalmaribus, folijs Chamæpatis formæ oblongis, denticulatis, incanis, vel ut Dioscorides, auicularum pennas imitantibus, caules in summitate in ramulos abeunt, qui umbellam satis compactam ex floribus ex albo flauescens compositam, sustinent. Hoc ex horto magni Ducis Hetruriæ, primum à D. Paschali (ut in Phytopinace monuimus) dein ex Creta à D. Honorio Belli accepimus: quod legitimum Dioscoridis Millefolium esse censemus, cuius in Epistola 2. Belli ad Clusium, sub Stratiote Millefolio mentio fit, qui in Creta *μαριφύλλο* vocari scribit.

IV. MILLE-

Millefolium aquaticum pennatum
spiccatum.

IV. MILLEFOLIUM aquaticum pennatum spicatum: ex radicibus fibrosis, tenuibus, rami prodeunt plures, cubitales, caui, striati, in alas brachiati, aquæ innatantes: ex quorum geniculo quolibet, folia terna, vel quaterna quasi stellatim circumiecta, tenuiter incisa, pennam & forma & tenuitate referentia, colore fusco prodeunt: at cauliculorum summitates palmares, ex aqua recti attolluntur, spicam purpurascentem, Iunio & Iulio mensibus, sustinentes, quæ in flosculos copiosos, pallide luteos, simul iunctos, Anethi semen forma referentes, expanditur: his succedunt capitula nigra ac prædura, plerumq; quaterna, quina, etiam plura, cauliculorum fastigia, quæ super aquam eminent, rotatim ambientia, quibus singulis cavitæ exigua, semen continens inest. Hoc in piscinis prouenit, quod primum in fossa arcis Weckenthal in Alsatia, obseruauimus: & Tragus, Algæ tertiæ, vel Algæ Ver-

Millefolium aquaticum cornutum.



gilij nomine, exprimere voluisse videtur. Huius ut & sequentis descriptionem in Phytopinace, Matthiolo, & Tabernæmontano emaculato, vna cum figura exhibuimus.

V. MILLEFOLIUM aquaticum cornutum: hoc prioris modo aquis innatat, caulibus cubitalibus, tenuibus, ramosis, fragilibus, dense geniculatis, quos folia ambiunt tenuia, capillata, quorum inferiora, cornua ceruina æmulantur & exiccata rigescunt: superiora vero, tenuiora, tenuiusq; diuisa sunt: ex ipsis geniculis, pediculi, modo trium, quatuorve vnciarum prodeunt, singuli, singulos flores, paruos, albicantes, quadrifolios sustinentes: quibus capitulum paruum Ranunculi forma, ex quinque senisve granulis virentibus compositum, succedit. In riuis circa Hiltelingam, non longe Basilea primum, dein in fossis horti Montembelgardiaci obseruauimus.

Consolida regalis latifolia paruo flore.

Chelidonium maius folijs quernis.



DE CONSOLIDA REGALI.

CAPVT VII.

CONSOLIDATA galis latifolia paruo flore: ex radice fibrosa, oblonga, rufescente, caulis cubitalis, rotundus, striatus, leuissima hirsutie albicans, in ramos brachiatus, exurgit: quem folia tripartito primum, dein ad formam foliorum Ranunculi aruenfis echinati, diuisa cingunt; quæ in summo caule pauciora, quædam tripartita, quædam integra: flores sunt sub carulei corniculo donati, Consolida regalis segetum similes, aut minores: quibus si liquæ oblongæ, paruæ, semen paruum cõtinentes, succedunt. Hanc Delphinijs Dioscoridis nomine, à D. Ferrando Imperato. Pharmacopæo Neopolitano insigni, accepimus: dein virentem in horto D. Zuingeri p. m. legimus, in Phytopinace descripsimus, in Matthiolo quoq; & Tabernæm. figura sub Consolida regali peregrinâ paruo flore, posita, in qua tamen sculptor prima folia omisit.



DE CHELIDONIO.

CAPVT VIII.

CHELIDONIUM maius folijs quernis, flore laciniato. hoc à Chelidonio maiore vulgato, folijs & flore tantum differt: folia enim, quercus tenera folia æmulantur, cum argutius incisa sint & teneriora, superne ex virore nigricantia, inferne pallida, leuissime, vt & caulis, hirsuta: flos luteus, communiter quadrifolius, folijs eius per ora dissectis & velut simbratis. Ex horto Philippi Stephani Sprengeri pharmacopæi Heidelbergensis, primum habuimus: dein in horto Montembelgardenfi, vbi tota æstate floruit, legimus: quod si in parietinis feratur, formam retinet, latiore vero in solo, aliquândo degenerat. Huius in Phytopinace meminimus: in Matthiolo & Tabernæm. figura addita, descripsimus: postmodum & Clesius, nomine Chelidonia maioris laciniato folio in sua historia, proposuit.

DE

DE AQVILEGIA.

CAPVT IX.

I. **AQVILEGIA** montana magno flore: hæc in *Aquilegiæ* vulgaris altitudinem excrefcit quidem, fed folijs primum differt, cum in lacinias tenuiores, easq; non obtufas, vt in alijs, fed acutas diuidantur, & folia pene fubrotunda fint: fic & floribus eft cæruleis, vulgari fimilibus, fed multo maioribus. In monte prope *Thermas Fabarias* copiofe prouenit, vnde *D. Burferus* attulit.

II. **AQVILEGIA** montana paruo flore thalictri folio: ex radice parua, folia thalictri forma, fed exigua, pallide virentia, prodeunt: inter quæ cauliculus tenuis, palmo minor, duobus tribusve foliolis breuibus, oblongis, minime diuifis, exurgit, florem vnicum cæruleum fuftinens, forma quidem vulgari fimilem, fed quintuplo minorem. In *Heluetiorum* alpibus reperitur: in *Moravia*, prope vrbein *Trebis*, fub arce *Smilo*, in pratis vernali tempore copiofiffime reperiri, mihi relatum.

III. **AQVILEGIA** hortenfis multiplex flore paruo: hæc ab hortenfis, quæ multiplici flore eft, folio flore differt, qui in hac triplo minor, & colore, qui pullus eft, in horto meo prouenit.

DE NIGELLA.

CAPVT X.

I. **NIGELLA** latifolia flore maiore fimplici cæruleo: ex radice tenui, oblonga, flauefcente, caulis cubitalis, rotundus, viridis & læuis, in fummo ramosus, exurgit: folijs ad radicem tenuiffime laciniatis, in caule vero aliquando in latiores partes, aliquando inferiorum inftar tenuiffime diuifis: flores autem quam in cæteris ampliores funt, quinquefolij, folio quolibet vnguem æquante, fupérne eleganter cærulei, inuerfa parte pallidi, venis elatis percurrentibus: floribus fuccedunt capita pentagona, hexagonave dura, in totidem cornicula in latera reflexa fupérne diuifa, quæ membranæ interne intercurrentibus, femine fubnigro, inodoro, plena funt. Hæc æftiuis menfibus in hortulo nunc ab annis aliquot floret, ex femine deci-



duo, cum annua planta fit, fele propagans: cuius semen, *Nigellæ* *Hispanicæ* nomine, miffum fuit.

II. **NIGELLA** *Cretica*: radice eft oblongiuscula, tenui, parum fibrofa & flauefcente: caule cubito minore, procumbente, ftriato, viridi, glabro, & paulo fupra radicem in alas tenues & teretes brachiato: folia prima per terram fparfa, inftar foliorum *Consolidæ* regalis vulgaris in lacinias diuiduntur, quæ vero in caulis fummo oblongæ, & vt in *Nafturtio*, diuifa, ex viridi nigricant: flos vnicus, vnguis magnitudine, quinquefolius, cuilibet cauliculo infidet, colore ab initio ex viridi nigricante, mox vero fub cæruleo, mucronibus fuam viriditatem referuantibus forma *Nigellæ* aruæ, quæ multo minor eft, respondens: in cuius medio ftamina plura, viridia, apicibus cæruleis donata: capitula pentagona, hexagonave fuccedunt, quæ in totidem

cornicula longa, instar cornuum hirci intorta, finiunt, quæ semen nigricans minutum continent. Huius semen ex Creta primo allatum, & à D. Doldio, cum planta, transmissum, vt in Phytopinace monuimus, & figuram cum descriptione Matthiolo addidimus, at in Tabernamontano emaculato, figura male sub titulo nigellæ flore pleno posita. Hanc Clusius in post. histor. Melanthium simpliciflore Creticum, nominare videtur.

Ab hac diuersa est, quæ in horto nobiliss. Contareni colitur, folijs fœniculi, floribus ex albo flavescentibus, semine nigro, anguloso & acri, quam cum integram non habeamus, plura de ea in præsens non licet.

DE HIPPOMARATHRO.

CAPVT XI.


HIPPOMARATHRI Cretici nomine, ex horto Clariss. Nicolai Contareni, Senatoris Veneti, habemus ramos cubitales, rotundos, læues, striatos, pallide virentes, in alios brachiatos: folia sunt fœniculi modo, in tenuissima, sed longe breuissima segmenta diuisa: caulium summitatibus umbellæ parue infident: gustantibus plantæ sicca folia & caulem, de sapore nihil certe pronunciare li-

cuit: quare vt totam acquiramus plantam, studebimus.

DE ANETHO.

CAPVT XII.

ANETHVM syluestre minus: radice est albicante, uncias tres longa, tenui, quemadmodum & caulis, qui pedalis, albus, rotundus: folijs est uncias quatuor longis, tenuissime, vt in vulgari, diuisis: umbella parua, ex festucis octo vel nouem uncialibus composita, flosculis luteis, semine paruo oblongo. In hortulo meo creuit, ex semine à doctiss. Columna, nomine Anethi syluestris ex Sicilia, misso: quod minus appellare lubuit, cum Cæsalpinus, Anethi syluestris in Sicilia, quod satiuo grandius sit, meminere.



Daucus montanus apij folio minor.

Daucus Alsaticus.



D. E. DAUCO.

CAPVT XIII.

DAUCVS montanus apij folio flore luteo: caule est cubitali, anguloso, glabro, in breues alas brachiato: folijs apij forma, sed brevioribus, per ambitum minime serratis, quorum pediculus striatus est: umbellas paruas habet, flores elaphobosco similes, luteos. In Callenberg & prope oppidum Baden Austriae D. Burserus legit.

Huic similem sed per omnia maiorem, caule crasso canaliculato, ramoso, folijs latioribus, minimeque crenatis, umbellis maioribus ex floribus pallidis, in horto Patavino anno 1578. collegimus, quem Daucum tertium Dioscoridis Guilandinus, at ipse successor Cornutus, Pseudopyrethrum, nominauit.




II. DAUCVS pratensis apij folio: radice est oblonga, pallide rufescente cortice tecta, sapore & odore pastinacæ, siue Dauci officinarum, superne hirsuta & villosa, ex qua alæ prodeunt, folijs pluribus vni costæ inhaerentibus, per ambitum incisfis & serratis, forma montani maioris, sed longe minoribus, pallide virentibus: inter quæ caulis pedalis, rarius cubitalis, tenuis, striatus, paucis geniculis distinctus, in ramulos aliquot diuisus, exurgit: ramorum extremis, umbellæ candidæ, flosculorum exiguum insident, quibus semen oblongiusculum, nigricans, aromaticum succedit. Hic in pratis humidis Michelsfeldæ prouenit.

III. DAUCVS Alsaticus: radice crassa, oblonga, in fibras crassiores diuisa, nititur, cuius summo, multa villosa capita, vt in plerisque ferulaceis adposita: vnde magnæ foliorum alæ exeunt, folijs multis in plures partes dissectis, vni costæ inhaerenti-

rentibus, ex aduerso nascentibus, constantes: inter
quæ caulis (modo vnus, modo plures) ad viri alti-
tudinem exurgens, subruber, striatus, geniculis a-
liquot articulatus, in ramos plures, hique in alios
diuisus, ad quorum genicula minores foliorum a-
læ: extremos ramulos umbellæ satis magne, floscu-
lorum flauescientium, exornant: quibus semina
plana succedunt. Iunio & Iulio floret in dumetis
Alfatæ superioris: eundem copiosissime in Alfatæ
inferioris, pratis humidioribus, vt inter Sclesta-


dium & Argentinam frequenter obseruauimus.
Multum similitudinis habet cum Thysselino Pli-
nij Lobelij siue Apio palustri Dodonæi: verum
Thysselinum, non ita alte exurgit, & tota stirps la-
cteo succo abundat. Hic Daucus, sapore est &
odore pastinacæ.



Scandix Cretica maior.



Scandix femine rostrato Italica.



DE SCANDICE.

CAPVT XIV.

SCANDIX Cretica maior: ex radice oblongiuscula, non nihil fibrosa, caulis cubitalis, striatus, in plures ramos diuisus, & potissimum ad alarum exoritur, leuissime pilosus; exurgit: folijs ad radicem, pediculis oblongis, Pimpinellæ saxifagiæ minoris æmulis, latiusculis, subrotundis, ex opposito correspondentibus, per ora oblique dissectis, pallide virentibus, vna cum pediculis leuiter pilosis: at caulem ambientibus & superioribus, instar foliorum Scandicis vulgaris, tenuissime diuisis: umbellæ parvæ sunt, sparsæ, flores albos, & quam in vulgari maiores, sustinentes: quibus succedit sementrostatum, decem, duodecim & pluribus rostris, f. basperis, simul iunctis, quorum cuilibet apices duo quasi aculei rigidi, præfiguntur. Hæc Patavio primum Scandicis Creticæ nomine missa, dein ex semine in horto nata, cuius descriptionem in Phytopinace sub 4. dein & Matthiolo addita figura, exhibuimus.

II. SCANDIX Cretica minor: ex radice gracili, oblonga, recurua, alba, cauliculi per breues, aliquando palmares, tenues, tenui lanugine pubes-

centes, in ramulos, paucos breues & graciles diuisi prodeunt: quibus umbellæ exiguæ, floribus albis, pusillis, paucis, quinquefolijs (licet aliquando flores corymborum modo densi conspiciantur) veluti styliorum cacuminibus insident: his succedunt rostra vt in priori, sed breuiora & pauciora (communiter quaternæ, quinæ in horto obseruauimus) in apice similiter bipartita, quæ semina sunt. Folia si terantur, non iniucundi odoris sunt & saporis aliquo modo Chærefolij vulgaris. Hanc primum ex horto magni Ducis Hetruriæ à Casabona, Anthrisci Plinij nomine, dein ex Creta ab Honorio Belli, accepimus: quam etiamnum in horto colimus, Maio florentem, & Iulio semine prægnantem. Huius in Phytopinace meminimus, & Matthiolo (vbi icon crassior est) addita figura, sub scandice Italica descripsimus, & postmodum Clusius in sua historia, Anthrisci Plinij, & doctiss. Columna, Aniso Marathri Apuli (à suauis odore & sapore, medio inter Anisum & Fœniculum) nomine proposuere.

Huius varietas à me obseruata apud Monspelienfes: nam quæ in saxosis prouenit, odore est fœniculi: altera vero, quæ in agris, inodora est.

Caucalis semine aspero flosculis sub-
rubentibus.



DE CAUCALIDE.

CAPVT XV.

I. *CAUCALIS* nodosa echinato semine, radix
oblonga, tenuis, alba, caules emittit binos

ternosve rotundos; striatos, asperos, q̄ in alios bra-
chiatur: quorū alij semipalmates, incurui, alij bipal-
mates erecti prodeunt, quos folia pastinacæ sylue-
stris æmula, at breuiora & pauciora, multoque te-
nuius diuisa, aspera, ex virore nigricantia, ad sin-
gula pene internodia, oblongis pediculis donata,
cingunt: flosculi exigui, ex quinq; foliolis compo-
siti, subrubentes, vel pallidi, aliquando albi, bre-
uissimis pediculis insident: his capitula parua echi-
nata & conglobata succedunt, in horum qualibet
semen vnicum continetur. Hanc Iunio mense an-
no 1578. in horto Patauino collegimus, & in Phly-
topinace, *Caucalidē* semine ad caulium nodos e-
chinato, nominauimus, verum & nomine *Lappu-
læ caninæ* *Cortusi* (Luretia quoque & ex Anglia)
missa fuit: cuius figuram *Matthiolo* adposuimus.
De qua doctiss. *Fabius Columna*, *Scandici* nulla
melius nostro iudicio quadrare videtur, ex nobis
obseruatis hucusq; plantis, nisi illa quam doctiss.
Caspar. Bauhinus, pro *Caucalide* altera nodoso e-
chinato semine addidit, suo *Synonymijs* ornato
Matthiolo, &c.

Caucalidis semine aspero flosculis subrubenti-
bus figuram addere visum fuit, cum à *Cordo* qui-
dem & *Thalio*, sub *Daucidide* minore describa-
tur, sed huius icon à nemine proponatur.

II. *CAUCALIS* tenuifolia montana: radice est
crassa, ex qua caulis exurgit pedalis, qui statim ad
radicem, in cauliculos palmates, rotundos, leues,
diuiditur, hiq; in minores subdiuiduntur, quorum
etiam minutissimis alis ad radicem, exiguae vmbel-
læ, flosculorum alborum minutissimorum, insi-
dent: folia ad radicem in tenuissima segmenta, &
quæ in caule, in capillacea, diuiduntur. Semen par-
uum est, oblongum, striatum: Iulio Mense flo-
rens, in Sabaudia inter Tarentesiam &
Monasterium collecta.

Apium hortense maximum.

Apium peregrinum folijs subrotundis.



DE APIO.


CAPVT XVI.

APIVM hortense maximum: ex radice oblonga albidā, & pro plantæ magnitudine tenui, folia prodeunt, pediculis palmaribus, & sesquipalmari- bus, striatis, pallide virentibus, tripartito primum diuisa, quorum quodlibet rursus tripartitur, ipseque particule triplo quadruplove, quam in Petroselino vulgo dicto maiores, per ambitum incisæ, pallide virentes: inter hæc caulis cubitalis & sesquicubitalis, tenuis, striatus exurgit, in cuius summitate folia oblonga, angusta, minime incisa, à pictore prætermissa. Umbellam habet paruam, albam, exiguis flosculis refertam, quibus semina Petroselini forma, sed duplo triplove maiora, gustu non nihil aromatico donata, succedunt. Nomine Apij Angli-



cani, primum apud nos satum. An forte de hoc Selino Anguillara opinione 7. intelligendus, quod in vniuersa Græcia, potissimum in Chio & Creta pro Selino habetur. Hoc in Phytopinace descripsimus & in Matthiolo figuram exhibemus.

APIVM peregrinum folijs subrotundis, Clusius sub Selino peregrino primo descripsit: at quia figuram non adposuit, eam hic proponimus.



DE SMYRNIO.

CAPVT XVI.

SMYRNIVM peregrinum folio oblongo: huius inferiora folia ex radice prodeuntia, Apij folijs similia sunt, in complures particulas oblongas diuisa, oblongis pediculis donata, per ambitum profundius laciniata, pallide virentia: quæ vero in caule sunt cubitali, striato, non subrotunda, nec duplicia, vt in communi Smyrnio peregrino, sed eorum primum quidem, vncias sex longum, tres latum, per ambitum profundius incisum: superiora vero per quæ caulis ad exortum transit, & simplicia sunt, vncias tres longa, duas circiter lata, & superna quæ leuiter crenata sunt, sensim minora fiunt: caulis in summo brachiatus, & cuilibet altæ, ramuli quaterni, rarius quini, biunciales infident, festucis aliquot, vmbellam exiguum strobilorum luteolorum sustinentes: quibus semen nigrum, subrotundum, succedit: radicem non vidimus. Hoc in horto D. Camerarij creuit, & D. Doldius transmisit.

DE ANGELICA.

CAPVT XVIII.

ANGELICA syluestris hirsuta inodora: radicem habet crassam & fibrosam, foris pullo cortice tectam, intus albam, rediuuiam & odore medicato: caulem cubitalem, in breues alas brachiatum, parte inferna, paucissimis pilis cinctum, nigrum: folia Angelicæ syluest. siue Podagrariæ æmula, in alas, modo binas, modo ternas, easque aliquando vncias quatuor longas, tres latas, aliquando vix vnciales, diuisa, in ambitu profunde incisa atrovi-
rentia, hirsuta, quarum pediculi hirsutæ asperi sunt: vmbellam habet paruis floribus albis refer-
tam, quibus semen oblongum nigricans succedit.

Hanc ex Lusatia, nomine herbæ Podagrariæ cognatæ, D. Francus misit, cuius in horto Lusatiæ memi-

nit.

DE SPHON-

1. P. o.
Shoc
vulgare
ribus lat
ber, in l
alque i
margine
obserua
mus.
U. Sp.
caulises
mulum
gunt p

Sphondylium alpinum glabrum.



DE SPHONDYLIO.

CAPVT XIX.

I. SPONDYLIVM hirsutum folijs angustioribus: Hoc à vulgari folijs solum differt: nam cum vulgare folijs sit amplis, plerumque ex quinque partibus latis subrotundis compositis: hoc folium habet, in lacinias oblongas, angustas, acuminatas, hasque in alias, inordinate tamen diuisas, & per marginem crenatas. Hoc in pratis alpinis Rhæticiis obseruauimus: dein ex Lusatia à D. Franco accepimus.

II. SPONDYLIVM alpinum paruum: ex radice caulis exurgit pedalis, qui in summo in alterum ramulum triunciale, diuiditur: quem folia cingunt pallide virentia, longis pediculis donata, quæ

in partes tres, vel etiam quinque alias subrotundas, alias acutas, per marginem crenatas & hirsutas, diuiduntur umbella flosculis candidis, latis tamen, summo cauli insidet, quibus semen plenum, latum ac tenue, succedit. Tota planta leuissimis pilis pubescit. Ex Austriæ alpebus, D. Burserus misit.

III. SPONDYLIVM alpinum glabrum: radice est crassa eaque alba, caule bicubitali, geniculato: folijs ficulneis, glabris, quæ absque pediculo, palmum longa, duas lata sunt, communiter tripartitis, sed non vsque ad pediculum diuisis, per marginem crenatis: quorum inferiora pediculis palmatis, hispidis & subasperis donantur: caulis summo, umbella flosculorum candidorum, sed quam in reliquis speciebus minorum, insidet: semen succedit subrotundum, planum, cuius summitati apex infigitur. Hoc solum in monte Walsersfall & quidem ab anno 1595. vsque ad præsentem annum 1618. Iulio mense & florentem & semine prægnantem, obseruauimus.

DE LIBANOTIDE.

CAPVT XX.

I. LIBANOTIS latifolia, aquilegiæ folio: radice est crassa, fibrosa, cortice inæquali, quasi rugis transuersis asperata, fusciq; coloris, recta, medulla candida, amara, modicum quid Aroma & Aristolochiam sapore redolens: ad cuius caput, pilitanquam veterum foliorum defluxorum fibræ solidiores & nigrae: etenim folia, quæ numerosa ex radicis capite longis pediculis emergunt, vna parte quasi vaginato exortu (nimirum ea quæ crassiora & latiora sunt, vt & ea, quæ ex caule proueniunt) eundem, tanquam membranacea filiqua circumdant, articulo crassiore, lineaque transuersa: quæ crassa sunt, rigida, glabra, viridia & splendunt, subtus candicante, fibris maioribus subpurpureis transcurrentibus, quæ licet instar foliorum Aquilegiæ diuidantur, non tamen omnia in pares lacinias (Aquilegiæ lacinias latiores) fissa sunt: inferiora namq; in vegetiore planta, plerumq; quinque folia habent, ex triplici rami diuisura, alias tria, tribus pediculis insidentia. Caulis vnus est, cubitos tres quatuorve superans, rotundus, striatus, nodis distinctus, subalbicans, puniceo colore aliquando admixto, in tria, quatuor, vel quinque brachia

brachia distributus, quæ umbellam magnam, ex longissimis festucis & floribus albis paruis compositam, sustinent: semen succedit longum, latum, striatum, geminum, puriceum, gustu subamarum, Cumini saporem imitans, aromaticum, modice excoletaciens, & saluam ciens. Hoc D. Doldius Norinberga ex D. Camerarij horto, nomine Sefeli Ethiopici folio Aquilegiæ misit, cuius Camerarius, (sed sine descriptione) in sui horti Catalogo, sub Sefeli Ethiopico altero meminit, & semen odore & sapore aliquantulum Cinamomum representare scribit.

II. LIBANOTIS latifolia minor semine crispo: hæc à vulgata potissimum foliorum magnitudine & numero, seminisq; forma differt: cum in vulgata singulæ foliorum alæ, magna ex parte quina folia habeant, vno extremam alam occupante: at hæc in primis duabus alis, tria tantum, & in media ala, quinque obtinent, per ambitum communiter serrata, quædam tamen vnam alteramve profundam incisuram obtinent: superne attrouirentia, inferne vero subcinericei quodammodo coloris, magnitudine vnciam, vel sesquiuunciam vix excedentia. Caule enibitali, glabro umbella parua flosculorum alborum insidet, quib; succedit semen breue, subrotundum, eleganter crispatum. Hanc ex Italia D. Neudorfferus, nomine Costi amari semine crispo, attulit.

DE CARVI.

CAPVT XXI.

CARVI alpinum: planta palmaris est & glabra, ex radice oblongiuscula nigricante, aromati-

ca, folia emittens oblongis pediculis donata, foliorum Carui modo, in paulo tamen maiora segmenta, diuisa, polide virentia: caulis modo vnus, modo duo, tenuis, ad vncias sex exurgens, supra medium nudus, in quinas senasve festucas instar umbellæ abiens, quarum singulæ flosculos aliquot, quasi in capitulum iunctos, ex flauo rubescentes, sustinent. In Pyreneis montibus D. Burserus legit.

DE PIMPINELLA.

CAPVT XXII.

I. PIMPINELLA saxifragia tenuifolia: ex radice oblonga, caulis pedalis viridis, lævis, striatus, geniculatus, statim ad radicem in ramos, & hi in tenues alas diuisus, exurgit: folia habet in tenues primum, dein pene capillaceas partes diuisa: flosculi exigui, pauci, albicantes, in parua umbella; semen non vidimus: copiose ad lacum Geneuensem prouenit.

II. PIMPINELLA sanguisorba inodora: hæc à sanguisorba minore vulgata, differt folijs & odore: nam in hac folia longiora sunt, quæ in illa magis rotunda, sunt in hac inodora, in illa odora.

Hanc Pimpinellæ minoris Hispanicæ nomine, D. Gillenius misit.

Seseli palustre lactescens.



DE SESELI.

CAPVT XXIII.

I. SESELI montanum Cicutæ folio subhirsutum: Sex radice crassa, folia lata, Cicutariæ, vel Myrrhidis Fuchij instar, in multas alas diuisa, nigricantia, leuissimis pilis, præsertim ipsis pediculis aspersis, subaspera: caule sesquicubitali & altiore, crasso, striato, cauo, nodoso, pilis paucissimis donato, in alas brachiato, folijs paucis, prioribus similibus, sed minoribus cincto: in summitate, umbella magna alba: floribus succedunt semina oblonga, gemella, tenuissimo apice donata, Carui sapore. Hoc in altissimo monte Wasserfall, æstate florens, inter saxa reperimus.

II. SESELI pratense tenuifolium, siue Dau-

eus pratensis tenuifolius: caule est cubitos duos superante, rotundo, striato, nodoso, superne in ramos brachiato: folijs instar Pastinacæ tenuifoliæ syluest. diuisis: umbellam habet ex paruis albis floribus compositam, quibus succedit semen paruum aromaticum, & tota planta pastinacæ odorem refert: in pratis vdis Michelsfeldæ prouenit.

SESELI palustre lactescens, cum Camerarius in suo horro sub Seseli palustri descripserit, eius figuram prætermittam, addere placuit.

DE LIGVSTICO.

CAPVT XXIV.

LIGVSTICVM siue Siler montanum angustifolium: caule est tenui, cubitali, in alas brachiato, quæ umbellam albam parvam sustinent, folijs paucis, in segmenta angusta, oblonga, pencedani instar (sed longe breuiora) diuisis, quæ in alis, fere capillacea: prope oppidum Stain Austria, D. Burcerus legit.

DE FILIPENDVLA.

CAPVT XXV.

FILIPENDVLA minor: radicem habet rufescentem, in filamenta extenuatam, sed per extrema glandulosam: folia duastresve uncias longa, semicircum lata, ex segmentis pluribus, tenuissime diuisis ambitu serratis composita, veluti Potentillæ, duriora tamen & saturatius virentia, inter quæ cauliculus palmo minor in medio foliolo cinctus, exurgit, aliquando simplex, aliquando in summo bifidus, cui coma flosculorum albidorum, staminulis præditorum, aliquando quasi in capitulum compactorum, insidet: succedit semen, instar racemi parui coactum. In asperis circa Monspelium legimus.

DE CRISTA GALLI.

CAPVT XXVI.

I. CRISTA Galli umbellata: radice est tenui, parua, caule palmo parum altiore, tenui & erecto: folijs paucis, unciam longis, angustis, per ambitum crenatis: caulis summo flores plures, l-

L. 3. reii

rei, quasi in umbella dispositi, triplo maiores & latiores, quam in vulgari, quibus valuula lata membrana, semen continentes, succedunt. In Castilia agris, D. Albinus legit.

II. CRISTA galli angustifolia montana: hæc caule est cubitali, anguloso, folijs oblongis, angustis, acuminatis, margine crenatis, binis sibi ex opposito correspondentibus, ex quorum alis foliola minora prodeunt, & plerumque cauliculus, vnam alteramve vnciam longus, minutissimis foliolis cinctus: ipse vero caulis, in ramos semipalmares, etiam longiores, diuiditur: quibus flores pallidi, eo, quo in vulgari, ordine, sed longe minores insident, quibus valuula, semen latiusculum includentes, succedunt. Hæc in montibus vrbi vicinis prouenit.

Valeriana alpina prima.



DE VALERIANA.

CAPVT XXVII.

I. VALERIANA palustris maior profunde laciniata: hæc è radicibus albis, oblongis, villosis, intricatis & odoratis, plures quam quinquaginta emisit caules, latos, folijs Valerianæ ex vno latere caulis dependentibus, sed multo maioribus, & incisuris profundioribus in aliquibus duplici serie luxuriantibus & propendentibus, vestitos; quæ, vt & radices, odorem Valerianæ vulgaris habent: flores non vidimus. Hæc prope urbem Budissinam in loco palustri, à D. Franco seniore inuenta & eruta.

II. VALERIANA palustris inodora parum laciniata: ex radice fibrosa, leniter Valerianam redolente, folia subrotunda, minime laciniata, pallide virentia, longis pediculis donata, prodeunt: inter quæ caulis cubitum superans, exurgit: quem rara folia, primis, forma & longis pediculis similia, bina ex aduerso respondentia, cingunt, quæ aliquando ad modum Valerianæ hortenensis, ad exortum in lacinias diuisa, inodora sunt: caulis summo, flores quasi in umbella sparsa, pallide rubentes, insident. In palustribus nostris Michelfeldensibus frequens licet raro cum flore reperiatur, cum in fœniscio abscondi consueuerit.

III. VALERIANA alpina prima: ex radice oblonga, odorata, caulis vnus (rarius plures) cubitalis, striatus, prodit: folia ad radicem plura, longis pediculis donata, ex rotunditate acuminata, sinuata, aliquando laciniata & in crenas profundiores diuisa, pallide virentia: quæ vero caulem ambiunt, pauca sunt, bina ternave iuncta, oblonga, incisa, binis alis pleraque donata: flores in summo caule pallide purpurascens, veluti umbellæ insident, quibus semen exiguum succedit. Iulio mense florentem in monte Wasserfall collegimus, vt in

Phytopinæe monuimus, quam etiam ex montibus Geneuensis cepimus.



Valeriana alpina scrophulariæ
folio.Valeriana peregrina purpu-
rea.

IV. VALERIANA alpina scrophulariæ folio: radice est nigricante, aliquantum torosa nodosa: ve: caule cubitali & sesquicubitali, cauo, striato, viridi (aliquando pluribus) folijs senis, septenis, longis pediculis donatis insident, quorum quædam subrotunda, quædam oblonga, quædam leuiter sinuata: at quæ caulem cingunt, pauca sunt, scrophulariæ folijs æmula, vncias tres longa, sesquiunciam, vel vnciam lata, acuminata, leuiter crenata, bina semper iuncta: caulis, in summo, in longas tenues alas brachiatur, quibus flores pallide rubentes, Valerianæ sylvestris similes insident: eodem loco ubi & prior prouenit: vtræque sub Valeriana montana prima & altera in Phytopinace proposita fuit. Videtur Clusius vtramque vna descriptione & figura expressisse, Valerianæ sylvest. alpinæ primæ laurifoliæ nomine.

V. VALERIANA alpina minor: planta palma minor, folijs ad radicem, primis quidem paruis, subrotundis, subsequentibus sesquiuncialibus, scabiosæ parux instar in lacinias acutas diuisis: inter quæ cauliculus vnciarum sex exurgit, binis ternisve folijs, in ternas, vel quaternas lacinias angustas diuisis, cinctus: in summo, umbella, flosculos purpurascens sustinens: ex montibus Pyrenæis, D. Burserus attulit.

VI. VALERIANA peregrina purpurea alba: ex radice parua, fibrosa, albicante, caulis exurgit pedalis, rarius cubitalis, tenellus (vt sæpe in terram reclinet) viridis, cauus, striatus, nodosus, & vt plurimum ad singulos nodos in binos ramos diuisus; horumque aliqui, in alios breues ramulos subdi-

subdiuiduntur. Folia habet pallide virentia, pauca, duas tresve uncias longa, vnam, rarius duas lata, Nardi montanæ similia, ex aduerso bina sita, mollia, crassiuscula, quorum superiora interdum sinuosa, & ad exortum in crenas diuisa, & fere insipida: ramulorum summis flores inodori, elegantissime purpurei, vel albi, plures in caput congesti, longiusculi, extrema parte aperti, & in quinque lacinias diuisi, quorum duæ superiores breuiores & latiores, inferiores tanquam labra pendulæ, & media reliquis longior, quibus succedunt vascula oblonga, latiuscula, calices referentia incurua & fibrosa, in quibus semen, altero in vasculo inclusum, quod crassiusculum, fungosum, nigricans. Annua est planta, singulis annis ferenda, quæ pro tempore satioris, citius tardiusve in hyemem vsq; floret. Sponte quidem in Latio prouenire audio, in loco quodam Siculo dicto (vnde Valeriana Sicula) & in Sabinis vbi flore albo D. Vorstius observauit: vtrâq; & purpureo & albo flore in horto meo habui. Hæc ante annos viginti tres D. Paschalis Gallus, Valerianæ Indicæ Imperati nomine, Patavio misit: dein Nardi Creticæ nomine, semine à Casabona misso, in horto Montembelgardiano creuit. Verum nobiliss. Cortusus, Tripolium esse voluit, cuius opinioni fauet icon Tripolij in manuscripto Codice Dioscoridæo, quem Illust. Pinellus Patavius in sua

Bibliotheca habebat. In Phytopinace & Matthiolo descripsimus & vtrobiq; figuram adposuimus: nunc à Clusio Valerianæ Indicæ appellatione proponitur.

VII. VALERIANA rubra angustifolia: hæc à Valeriana rubra dicta, potissimum foliorum angustia differt, quæ linifolijs angustiora, breuiora, in acumen desinentia, rigidiuscula & pallida, caulem rotundum, nodosum inordinate cingit: verum tota planta, altera minor est, & in monte Baldo collecta.

NARDO CELTICÆ SIMILIS INODORA.

CAPVT XXVIII.

NARDO celticæ similis inodora: radícula est oblonga, rufescente, capillata, ex qua folia aliquot oblonga, in latitudinem paulatim sese laxantia, longis pedicellis donata, viridia primum, dein flauescencia exurgunt, inter quæ cauliculus tenuissimus, palmaris, rarius altior, effertur, circa cuius medium foliola duo oblonga, angustissima: cauliculus in pedicellos abit, qui stilos oblongos, pallidos, vt in Celticæ sustinent, qui in semina exigua abeunt. Inodora est: hanc in Baldo & Alpibus Sumano conterminis, legimus, & in monte Dravensstein Austria D. Burserus collegit, & Valerianæ alpinæ parue latifoliæ nomine, misit.

LIBER QVINTVS.

DE SOLANO.

CAPVT I.

Solanum tuberosum esculentum.

SOLANVM tuberosum esculentum: caulem habet ad duorum triumve cubitorum, rarius in viri altitudinem exurgentem, crassum, angulosum, striatum, leuiter hirsutum, in multos ramos infirmos, in terram, nisi adminiculo sustentantur, procumbentes, brachiatum, ex quorum alis pediculi crassi, angulosi, flores sustinentes, prodeunt. Folia quæ primo nascuntur, Barbareæ similia sunt (quæ-

admodum figura nostra & Matthiolo & huic libro addita eleganter, cum omnibus plantæ partibus, exprimit) ex atro purpurascentia, subhirsuta, cæteris pallide virentibus, absque pediculo, palmum longis, in sex, octo, plures & pauciores partes, ex vna costa dependentes, diuisis, ex rotunditate oblongis, integris, quibus singulis, duo sextuplo minora interijciuntur, & semper pars vna, quæ se-

M

ptima

ptima vel nona, cæteris maior, alæ summo additur. Flores elegantes, exterius ex purpura candicantes, interius purpurascantes, vel ex cæruleo purpurascantes (flore pleno in Austria haberi aiunt) deni, duodeni aut plures, alij clausi, pauciores aperti, q magni malorum infanorum forma, singulari folio constantes, quinquanguli, lineis vel radijs quinque sub flauis, vel herbaceis per longum discurrentib⁹, ex quorum medio staminula rufescentia, vel etiam flaua communiter quinque, stylo subuiridi prominente, prodeunt: & flores, odorem Tiliæ florum quodammodo referunt. Hos fructus rotundi excipiunt, plures simul quasi ex racemo dependentes, longis pediculis, vt in Solano vulgari, donatis, quorum aliqui paruæ nucis, alij auellanae magnitudine, alij minores immaturi atque uirescentes: maturi atque rubentes, rarius albi & striati, humida & albicante pulpa pleni, quæ seminibus multis, paruis, planis, subrotundis, Solani somnifici secundi forma, fuscis, conferta est. Radix tuberosa est, aliquando pugni magnitudine, aliquando oblonga, aliquando minima, rarius singularis merabris virilis forma, inæqualia, quibusdā vestigijs donata, unde germina anno sequenti emeritura sunt, cute fusca aut atque rubente tecta, medulla siue carne firma & alba: & quandoq; tuber ex quo planta nascitur, cū erunt, inane & flaccidum reperitur. Ad caulis exortum, radices plures, fibrosæ, oblongæ, albicantes per terram sparsæ, quandoq; in profundum descendentes, cui alia tuberosa radices adnascuntur, ita vt plantam hyemem versus erutam, ultra quadraginta (alij quinquaginta notant) tubera diuersæ magnitudinis notauerimus, quas pleriq; erunt, ne per hyemem putrescant, & sicco loco, calidiore tamen, alij in vase terra sicca pleno, reponunt, vernatq; tempore terræ rursus committunt: ex ramis etiam reclinatis, terræq; tectis, Burgundi propagare solent, quo plura tubera acquirant. Florent apud nos in Iunio, & sæpe ad Autumnum vsq; & à primis pruinis offenditur. Hæc ex Insula Virginea primum in Angliam, inde in Galliam, aliasq; regiones delata est.

Huius radices in Virginea Openantk dici, eius historię autor monet. Petrus Cieca in sua Chronica (& Gomara in sua Indiarum historia generali) Papas locis Quito vicinis vocari scribit: Benzoni, Pape, & Iosepho Acosta in hist. Indiæ, Papas: hinc Papas Indorū vel Hispanorū dicitur, Italis Tartuffoli, quo nomine & tubera nominare solent, Ger-

manis Grublingbaum / id est, tuberum arbor dicitur. ¶ Plantæ huius cum anno 1590. iconem suis coloribus delineatam, à D. Scholtzio, Papas Hispanorū nomine accepissem, & à nemine descriptam inuenirem, in Phytopinace sub Solano tuberoso, & in Matthiolo, sub Solano tuberoso esculento, figura addita, descripsimus, eiusque iconem D. Clusio transmisimus. Solanum appellauimus, propter formam aliquam foliorum cum malis aureis: florum, cum malis infans: fructuum, cū baccis Solani vulgaris: seminum, cum Solanis pene omnibus: denique, propter totius plantæ odorem, quem cum Solanis communem habet.

An veteribus cognita? Pycnocomon Dioscoridis, nobiliss. Cortasus censuit, motus exemplari Dioscoridis manuscripto, cui similis figura adpicta. Et sane notæ florum ac radicem Pycnocomi Dioscoridis, huic Solano conueniunt: floris & seminibus non item: Clusius deniq; in sua historia, Arachidnam Theoph. suspicatur, & Papas Peruanorum vocat.

Indi radicibus panis loco vtuntur: quem Chunno vocant: radicem euulsam, foliq; expositam siccant, siccata in partes diffingunt, ex quibus edulium Chunno nuncupatam, admodum diu durans conficiunt. Papas adhuc vero viridis, interdum quoq; vel cocta, vel assata manducatur: hæc Acosta: qui addit, & aliud Papas genus in calidioribus fundis plantari, ex quo fercula, Locrò appellata, parant. Sic in Insula Virginea, apud quos in humidis & paludosis locis nascitur, radicibus in aqua, aut aliter coctis, vtuntur. Sic nostrates, aliquando Tuberum modo sub cineribus assant, & cuticula ablata, cum pipere comedunt: alij assatas, & mundatas, in taleolas dissecant, & ius pingue cum pipere affundunt & comedunt, ad Venerem excitandam, semen augendum: alij & tabidis viles volunt, cum bonum alimentum præbeant: non minus quam castaneæ & pastinacæ alunt, & flatulentæ sunt. Relatum mihi, nunc apud Burgundos harum radicum vsum interdictum, persuasi earum esum Leporam causare, & Artiscokos Indicos vocari.

II. SOLANVM racemosum cerasorum forma: vel Cerasa amoris racemosa rubra: ex radice fibrosa, caules exurgunt bicubitales, angulosi, aliquantum hirsuti, in multos ramos late se spargentes diuisi, qui infirmi sunt, & nigrificati sustineantur, in terram procumbunt, succi pleni: ex caulibus latere,

pedi-

pediculi tres, quatuorve vncias longi, hispidi, flores sustinentes, prodeunt. Folia habet, in multas lacínias acutas, impari semper numero, Agrimoniae foliorum instar diuisa & per marginem incisa, alijs folijs minoribus interiectis, pallide virentia, aspera & grauem odorem spirantia. Flores plures, quorum singuli singulis pedicellis insident, luteoli, ex quinque folijs acutis compositi, à calice viridi quinque folio sustentati, in quorum medio capitulum paruum rufescens, apicibus donatum: quibus fructus succedunt, quasi in racemo dispositi, Ceraforum forma & magnitudine, virides primùm, dein per maturitatem rubentes, in quibus, non secus quam in Pomo Amoris, copiosa humida medulla, & semen minutum albicans & planum, continetur. Planta annua est, & singulis annis ferenda, quamuis in horto meo ex deciduo semine renata sit.

III. SOLANVM tryphyllon Brasilianũ: ex radice tenui, oblonga, oblique serpente, cauliculus exurgit singularis, glaber, palmum superas, circa quem folia terna, ex vno centro prodeuntia, & in latus sparsa, Solano tetraphyllo similia, latiora tamen, vncias quatuor lata, quinque longa, ex rotunditate acuminata, tenuia, læuia, venosa: supra quæ cauliculus vnciarum quatuor assurgit, cui tria alia fo-

lia, vncias tres longa, longeque angustiora insident, calicis instar sustinentia florem magnum, album, venosum, ex tribus folijs, vncias duas longis, & fere vnciam latis, compositam. Hoc in syluosis Brasiliæ apud Tououpinambaultios copiose reperitur, referente Pharmacopæo Gallo, qui vna cum alijs D. Bursero communicant. Ignorans quid esset, formamque considerans, Solani nomen, propter formam quam cum Solano tetraphyllo habet, imposuimus.

IV. SOLANVM Mexiocanum, Iasminum Indicũ dictũ flore minore. Hoc à Iasmino rubro, vel Mexiocano maiore, q̃ communiter in hortis colitur, potissimum magnitudine differt, omnibus plantarum partibus minoribus & folijs rotundioribus, existētib: nam licet maioris flores, ex vno folio, conuoluuli florum instar, componantur, attamen radijs discurrētib: quasi in partes quinque diuiduntur: minoris flores, similiter quidem formati sunt, sed totus flos vnā partem maioris non adæquat: ita vt huius quini flores, maioris vnum in circumferentia non æquent: præterea staminula quaternā minutissimis apicibus donata, cum stylo paulo longiore, è medio flore emergunt, quæ longius quam in maiore, extra florem producantur: semen similiter quadruplo minus est.

Hyoscyamus Creticus luteus maior.

Papauer spinosum.



DE HYOSCYAMO.

CAPVT II.

HYOSCYAMVS. Creticus luteus maior: caulibus est cubitalibus, robustis, ramosis, rotundis, molli lanugine obfritis: folijs latis, subrotundis, sinuatis, & circumrosis, hirsutis, longiore pediculo donatis: ex quorum alis pediculi lanuginosi exurgunt flores sustinētes; ex calice hirsuto in quinque apices secto, prodeuntes; oblongos, Lamij melissophylli forma, quinquefariam diuisos, quorū tria folia superiora maiora & flaua, inferiora duo pallidiora; ex quorum medio, stamina quina, purpurascētia, apicibus flauescētibz, vna cum stylo oblongo eiusdem coloris, efferuntur: floribus dehiscentibus, calices induratur, qui semen minutum sub-



rum continent. Ex horto Montembelgardiaco, à fratre Ioh. Bāuhino primum accepimus, semine à Casabona misso, quemadmodum in Phytopinace monuimus, & in Matthiolo figura addita, descriptimus: hanc postmodum Clusius, Hyoscyami Cretici alterius nomine, absq; figura proposuisse videtur.

DE PAPAVERE.

CAPVT III.

PAPAVER erraticum Pyrenaicum luteo flore: caule est tenui, pilis exiguis, hinc inde aspersis: folijs tenerrimis, glabris, pallide virentibus instar Caucalidis, vel Apij filiorum in lacinijs diuisis per marginem incisus & serratis, quorum costae me-

diæ pili paucissimi adpositi: ex folij ala, pediculus nudus, sex, etiam octo vnciarum longus, prodit, florem simplicem, magnum, quadrifolium, & colore luteum, sustinens: plura non licet, cum hoc siccum; in Pytenæis, locis tamen vdis, natum, D. Burserus attulerit.

H. PAPAVER spinosum: ex radice tenui, oblonga, fibrosa, caulis sesquipalmaris, aliquando altior, ramosus, rotundus, striatus, minimis aculeis donatus, alba medulla plenus, exurgit: folia omnium prima ex semine prodeuntia, oblonga, angusta sunt: subsequencia vero, quemadmodum & ea quæ in caule sunt, papaueris corniculati instar laciniata: non hirsuta, sed mollia & nitida medium caulem amplectentia, quæ tres, quatuorve vncias longas, duas lata; per margines aculeis flavescentibus & acutissimis armata; parte quidem superna viridia, at neruis, quasi tenui puluere asperso, albicantibus: parte inferna canescentia & neruis ex minimis aculeis exasperatis. Flos luteus, ex quinque vel sex, aliquando quatuor folijs compositus, odorem Chelidonij maioris quodammodo referens, ramulorum summis infidet: huic succedit capitulum oblongum, pentagonum, hexagonum, & tetragonum, multis staminibus flauis id ambientibus, quod tenellum summa parte rubescit, maturum vero nigricat, spinis frequentibus & firmis horridum: hoc semine nigro, sextuplo aliorum maiore, rotundo, in apicem desinent & elegantissime striato, plenum est. Iulio & Augusto florere, & autumnio seri debet, cum planta annua sit.

Semen ex Angliâ primum, nomine Figo del inferno, id est, Ficus infernalis, à D. Camerario iunior Norinberga allatum, vnde D. Doldius primum anno 1593. & mox nobiliss. Cortusus, Patauio, & plantam & semen transmisere, primusq; Papaueris spinosi nomine donauit, uti videre est in Phytopinace, & in Matthiolo, ubi & figura & descriptio propozita est, aliquot annis antequam Clusius, hoc Papaueris spinosi nomine, in sua historia exhiberet. Tota planta succo flavescente, instar Chelidonij maioris abundat, quam ob causam Glaucium ne sit Dioscoridis, dubitamus: eos enim qui Chelidoniam maiorem, & eos qui Poma amoris volant, & eos qui Papauer corniculatum phœniceum, substituunt, non probamus. Dioscorides etenim suo Glaucio, foli Papaueris corniculati tribuit, addens *αἰπὴρ τῆς φύλλου*, nitidiora interpretor, qualia sunt Papaueris spinosi, non hirsuta, ut cornicu-

lati: addit totum croceo succo madere: quem sane vel leuissimo vulnere copiosum hoc Papauer fundit. Sed de his, in Theatro, Deo volente plenius.

DE ARGEMONE.

CAPVT IV.

ARGEMONE alpina lutea: huic folia sunt, ad radicem parua, multa, in multifidas tenueq; alas instar foliorum Scandicis incisa, viridia & laeui, inter quæ cauliculi bini, terni, palmares, nudi, leuissimis pilis vestiti, recta assurgunt, qui florē vnicū mediæ magnitudinis, luteū, quadrifolium sustinent: ex floris umbilico, plurimi apices flavescentes exurgunt: flori capitulum paruum subrotundum, asperiusculum, semen continens succedit. Hanc in monte Sneeberg Austriæ, qua parte ex pago eiusdem nominis perpendiculariter ascenditur, inter saxa D. Burserus reperit.

DE ANEMONE.

CAPVT V.

I. ANEMONE tenuifolia Cretica albo magno flore: folijs est Ranunculi pratensis, vel hortenensis repentis, specie trifolia, rarius quinquefolia diuisis, per marginem crenatis: caule pedali, rotundo, flores duos vel tres albos, ex sex, vel septem folijs compositos, Papaueris erratici florem magnitudine superantes, sustinente: quibus capitulum, semimibus aliorum Ranunculorum more confectum, succedit. Hanc delineatam, Patauij naram, Laurentius Rosena & Germanus Pharmacopæus, vna cum alijs anno 1595. transmisit: cuius iconem etiam Phytopinaci addidimus.

II. ANEMONE sylvestris alba minor: ex radice subnigricante, fibrosa, folia subrotunda, vnguem vix superantia, longis pediculis villosis donata, terna, quaterna, Ranunculi pratensis modo, tribus vsque ad umbilicum incisuris, dein singulis, alijs tribus minoribus laciniata, pallide virentia, mollia & hirsuta exurgunt, inter quæ cauliculus candida lanugine pubescens, vnciarum septem altus, in medio duobus foliolis paruis laciniatis cinctus, cuius summo flos vnicus, paruus, triplo quam in vulgari minor, quinquefolius, candidus, in cuius medio capitulum exiguum, multis breuissimis sub-

luteis staminibus cinctum insidet. In summa, ab Anemone sylua alba maiore, quam tertiā Matthiolum facit, solā magnitudine differre videtur. Hæc prope Herbipolim sponte nascitur.

III. ANEMONE alpina alba maior: ex radice nigricante, folia exurgunt acuta, Cicutariæ modo, multis diuisuris secta, atrouitrentia, & parte prona, secundum venarū ductum, villosa, inter quæ cauliculus tenuis, leuiter hirsutus, vncias sex altus, cuius summo flos albus, maior quam in vlla Anemone syluestri, vel etiam Pulsatilla vulgari, ex septem folijs compositus, ex rotunditate in acumē desinentibus, & pluribus in medio staminulis luteis donatus, insidet: an vero tandem huius, vt & sequentis flos, in plumosi seminis congeriem transeat, non constat.

IV. ANEMONE alpina alba minor: tota planta vncias quatuor non excedit, radiculam habet paruum, nigram, folia longe minora, quam prioris, magisq; villosa: cauliculo est biunciali villosa, quæ circa medium folia similia amplectuntur, cuius summo flos albus, sex folijs donatus, priore quadruplo minor, multis staminulis luteis præditus, insidet: hæc q; ad Anemonem syluestrem 2. Clusij accedit. Vtraque in Austria prouenit: illa in Blankenstein: hæc, in Taurero Rastadiensi, vbi D. Burserus collegit.

DE PULSATILLA.

CAPVT VI.

I. PULSATILLA palustris: hæc folijs est ad radicem in tenuissima & angusta segmenta diuisis eorum pediculis hirsutis, inter quæ caulis pedalis, rotundus, rufescens, leui lanugine aspersus, cuius medium folia capillacea acuta cingunt, ipsiusque summo flos vnus, villosa capitulo ex capillaceis folijs composito sustentatus, insidet, qui vulgari longe minor, ex folijs sex acutis, violæ nigræ colore compositus, staminibus in medio luteis: capitulum villosa cæsarie comosum, & incanescens, cum semen succedit. Hæc apud nos in pratis vdis & paludosis Michelsfeldæ prouenit: & in hortum translata, cum vulgari, vegetior quidem fit, sed formam & colorem referuat.

II. PULSATILLA apij folio venalis flore maiore: ex radice nigra, longiuscula, folia plura, pediculis oblongis, pilosis donata, crassa, dura, rigida, Apij

foliorum instar in quinque lacinias, & hæc in alias diuisa, margine piloso, prodeunt: inter quæ cauliculus vnciarum quatuor, nudus, at hirsutie incanescit, qui florem magnum, trium vnciarum longum latumq; ex sex folijs compositum, multifque apicibus luteis, vt & duæ sequentes, donatum, sustinet, qui colore variat, aliquando ex albo & subpurpureo mixtus, aliquando intrinsecus albus, extrinsecus subpurpureus, vernali tempore florens: in syluis circa Francofurtum ad Oderam, D. Fleisserus, vt & sequentem, collegit.

III. PULSATILLA apij folio vernalis flore minore: hæc ex radice crassa, nigra, oblonga, folia crassa, pauca, oblongis pediculis donata, Apij instar, sed in tres tantum lacinias ad umbilicum diuisa, quarum quælibet in alias binas, ternasve lacinias, per marginem incisæ, secantur, & pilis vix conspicuis donantur: cauliculo villosissimo, vncias duas alto, flos priore media parte minor, & dilute purpureus insidet: Aprili, folijs plerumque carens, floret.

IV. PULSATILLA apij folio autumnalis: radice est longa, foris nigra, intus candida, folijs ad radicem plurimis, Apij modo in tres tantum lacinias, & has in alias diuisis, glabris, inter quæ cauliculus triuncialis, albis pilis villosus, florem præcedenti minorem obsoleti coloris, instar vulgaris, sustinens, qui, vt & priorum flores, in capitulum hirsutum, quod semen continet, abit. Septembri mense florens, in Lusatia, vnde D. Francus misit, reperitur.

V. PULSATILLA, folio Anemones secundæ, vel subrotundo: radix crassa, nigra, aliquot propagines quandoque fundit: ex quibus prodeunt folia, pediculis oblongis hirsutis donata, instar Anemones bulbocastani radice subrotunda, inferne & per marginem leui lanugine candicante, semper in lacinias tres latas, & hæc in alias bifidas, vel trifidas, minus profundas secta: inter quæ caulis emergit pedalis, subhirsutus, infra medium angustis oblongis folijs (qualia & flori subiiciuntur) cinctus, florem subcæruleum, septem folijs donatum, & reliquorum more in pappum abeuntem, sustinens: ex

Lusatia à D. Franco, Pulsatilla latifolia nomine, accepimus.

DE RANVNCVLO.

CAPVT VII.

I. RANVNCVLVS nemorosus Anemones flore minor: tota planta vncias sex non superat: radícula est tenui, obliqua, cauliculo tenuissimo, triunciali, quem folia, vt in Ranunculo nemoroso albo, in tres lacinias, & hæc in alias, diuisa, sed vix vnguem lata, cingunt, ita vt tota planta cum flore, vnam vulgaris Ranunculi nemorosi albi laciniam, latitudine non superet: hæc, cauliculus vncialis superat, florem paruum album sex foliorum sustinet. A vulgato nemoroso non distinguerem, nisi hic paruos, copiosissime in editissimo monte ad Curiam Rhætorum, & circa Monspelium faisset obseruatus.

II. RANVNCVLVS rotundifolius repens echinatus: ad radicem nigricantem, capillaceam, folia sunt rotunda, crenata, vncialia, pediculis longissimis donata, quæ vero in caule, maiora, pleraq; rotunda, etiam in lacinias, sed non vsque ad umbilicum, diuisa: caulem habet pedalem, in terram reclinatum & quasi repentem, ac in alios diuisum, circa quem folia pediculis palmaribus donata: flores pallide lutei, paucis ad umbilicum staminibus: flore deciduo, capitulum ex pluribus seminibus rufescentibus subasperis echinatis simulq; congestis compositum, succedit. Tota planta ob pilos asperos mollis est, atrouirens, & circa Bononiam in agris prouenit.

III. RANVNCVLVS palustris echinatus: è radice in multas fibras longas capillatas diuisa, prodeunt folia glabra, atrouirentia, longis pediculis donata, communiter vnguem pollicis lata, pampini fere diuisura & in ambitu incisa, in caule tamen latiora & profundius laciniata: ramis est recuruis, aliquando pedalibus, & in alios breuioribus, hique adhuc in minores, diuisis: aliquando tamen tota planta vncias quatuor non excedit, & tunc ramuli plures à radice, duas, tresve vncias non superantes exurgunt, quorum extremitatibus flores pallide lutei, quinque folij insident: singulis succedit capitulum ex seminibus compressis, echinatis tuberculis obstitis, in apicem recuruum acutum desinentibus, pluribus, paucioribus, aliquando duodecim simul iunctis, compositum.

Locis humidis & aquosis Monspelii gaudet.

Huius licet aduersaria sub Ranunculo palustri rotundiore folio semine echinato obiter meminerint, attamen quia cum Ranunculo palustri rotundifolio læui confundunt, vt in Phytopinace monuimus, integram veramque descriptionem proponere volumus: hunc videtur Clusius in postrema sua historia, nomine Ranunculi Apuleii, figura minus fideliter expressum, exhibere.

IV. RANVNCVLVS grumosa radice folio ranunculi bulbosi: ex radice alba, grumosa, veluti ex paruis bulbis, sed firmiter compactis, composita, fibris oblongis intermixtis folia: Ranunculi vulgaris radice verticelli folijs similia, subrotunda, sed profundius dissecta, oblongis pediculis donata, leuissime pilosa, prodeunt: inter quæ caulibus pedalis, hirsutus, rarius in ramos diuisus effertur, quem folia in angustos lobos secta bis cingunt, cuius summo flos luteus, aliorum forma infidet: cui capitulum, breuissimis aculeis armatum succedit. Hic Ranunculus agris Bononiensibus familiaris est, & à D. Agrio collectus. Huius etiam meminimus in Phytopinace, sub Ranunculo racemosa radice Ioh. Bauhini qui in montibus Bononiensibus reperit. An hunc intelligit Anguillara opin. ii. dum meminit Ranunculi circa Sebenicum Dalmatiæ oppidum, radicibus. Chelidonia minoris, qui polyanthos sitide quo & Camerarius in suo horto, sub Ranunculo pleno flore luteo repente maiore?

V. RANVNCVLVS geranii tuberosi folio: radice est fibrosa, caulibus multis cubitalibus, viridibus, leuibus, striatis & ramosis: folijs à radice absq; pediculis palmaribus, vncias sex longis latissq; superne atrouirentibus, foliorum Geranii tuberosi instar in multas lacinias, sed longiores & latiores ad pediculum diuisis, & rursus in alias scissis: at in caulibus summitate, in segmenta graminea partitis: flores in ramulorum summis plures, parui, lutei, multis in medio staminibus, quibus capitulum paruum rotundum cum seminio succedit. Non longe Patauo in Arqua, vbi Petrarchæ sepultura, anno 1578. legimus, quem nobiliss. Cortusus

Batrachium verum nominavit.

§(:)§



VI. R. A-

Ranunculus montanus subhirsutus
latifolius.



VI. *RANUNCULVS montanus subhirsutus latifolius*: ex radice oblonga, fibrosa, folia prima *Geranio columbino* similia, subnigricantia, mollia, in tres primum lacinias ad pediculum diuisa, & hæc in alias tres, hæq; in alias secta, pediculis palmaribus, subhirsutis donata prodeunt, quorum tamen superiora latiora & acutiora: inter quæ caulis sesquicubitalis, cauus, striatus, pene glaber, in ramos brachiatus, effertur: quibus flores parui, pallide lutei, quinquefolij insident; his semina, in capitulum congesta, succedunt. Hic in humidis montis *Muretæ* prouenit.

VII. *RANUNCULVS montanus lanuginosus* folijs *ranunculi pratensis repentis*: radicem habet fibrosam, rufescentem, à qua, cum caule tenui, cubitali, lanuginoso, superne in alas diuiso, prodeunt folia pallide virentia, tactu mollia, pediculis pal-

maribus, lanuginosis, donata, instar *Ranunculi pratensis repentis*, in tres primum lacinias, oblongis pedicellis donatas, & hæc in alias acutas, per marginem crenatas, diuisa; flos aureus, quinquefolius, priore maior est. In altissimis montibus, vt in *Belken Marchionatus*, reperitur.

VIII. *RANUNCULVS saxatilis* magno flore: radix ex oblongis fibris capillaribus composita est; folia habet ad radicem plura, oblongis pedicellis non nihil lanuginosis donata, vnguè vix lata, in tres paruas lacinias, & hæc in binas, vel ternas acutas diuisa, inter quæ cauliculus palmo minor; tenuis, lanuginosus, cuius summo flos magnus, aureus, splendens, quinquefolius, multis in medio staminibus rufescentibus, insidet. Circa *Monspelim* in saxosis creuit.

IX. *RANUNCULVS saxatilis* folijs subrotundis: radix in fibras oblongas, capillaceas abit: folia per terram sparsa, subhirsuta, crassa, pedicellis vncialibus donata, vix vnguem lata, in petiola parua, subrotunda, & hæc in alia diuiduntur: cauliculus tenuis, lanuginosus, sex vnciarum, ad exortum statim diuiditur: flos luteus, quinquefolius, multis staminulis donatus. Eodem quo prior loco reperitur.

X. *RANUNCULVS minimus saxatilis hirsutus*: radice est pusilla, capillari, circa quam foliola plurima, in tres lacinias subrotundas, & per marginem incisas, diuisa, longis pedicellis hirsutis donata quæ cauliculus, duarum triumve vnciarum, hirsutus exurgit, florem luteum, aliorum *Ranunculo*rum similem, multis in medio croceis staminibus, sustinet: cui capitulum paruum, vt in alijs succedit. Non longe *Monspelio*, ad *Lattes*, prouenit.

XI. *RANUNCULVS villosissimus Monspeliacus*: radice est fibrosa, rufescente, folijs ex ea prodeuntibus crassis, villosis, paruis, in lacinias primum ternas, alias subrotundas, alias acutas, & hæc in alias incisas & per marginem crenatis: quæ vero in caule sunt, in oblongas & acutas, & quasi aculeo armatas lacinias, sed longitudine impares, diuiduntur: inter quæ caulis palmaris, in breues alas brachiatus, quibus singulis, folium in plures lacinias diuitum, subiicitur: flos aliorum *Ranunculo*rum forma, mediæ magnitudinis, lutei coloris est. Tota planta ob pilos rufescentes, molles, villosa & rufescens est, & *Monspessuli* in saxosis reperitur.

DE DORONICO.

CAPVT VIII.

I. DORONICVM Helueticum incanum: ex radice geniculata, & quasi squamata, caulis emergit pedalis, rotundus, incanus, cui flos magnus luteus, folijs aureis longiusculis non crenatis, discū cingentibus, qui tandem in pappum abit cum semine aliorum simili: folijs est crassis, ad radicem aliquibus subrotundis, alijs ex rotunditate oblongatis, in ambitu dentatis & serratis, parte inferiore vna cum pediculis ob incanam lanuginem mollioribus, superne vero pallide virentibus & neruo albicante: quæ vero caulem ambiunt, longa sunt, angusta & acuminata, acris & amari saporis: ex Helueticis alpihus D. Burserus attulit.

II. DORONICVM Helueticum humile crassis folijs: planta palmaris est, folijs crassis & densis, superne atrouirentibus, inferne pallidis, non nihil hirsutis, primis quidem ex rotunditate oblongis, per ambitum crenatis, pediculi basi caulem ambientibus, subsequenter vero, vncias sex longis, sesquiunciam latis, quorum superiora pediculis carent: caule est breui, hirsuto, in ramulos biunciales diuiso, quorum singuli florem luteum, mediæ magnitudinis, sustinent. Iulio mense in Valesiano iugis (auss der Gemme vocant) floret, vbi D. Fleisserus eruit.

DE ELLEBORO.

CAPVT IX.

ELLEBORVS niger Saniculæ folio minor: radices nigræ sub sunt & ab vno exiguo capitulo fibræ quamplures tenues descendunt: folia, quæ oblonga pediculis donata, subrotunda sunt, vnguem pollicis lata, in septem lacinias breues & angustas, ad vmbilicum vsque diuisa, per margines crenata, in caule vero, breuissimis pedicellis tenuissime fissis: inter quæ cauliculi bini, terni, tenuissimi, palmares, & glabri exurgunt, vno alterove folio vestiti: aliquando in summo, pedicelli ad latera prodeunt, qui flosculos complures simul factos, candidos, quasi in muscario ita natos, sustinent. In summa, veratrum nigrum Dodonæi, siue Astrantiam nigram Lobelij, per omnia refert, sola quæ magnitudine dif-

fert. Hic in Alpibus solum reperitur, vt in monte Fraeto, Spligel Rhætorum & in Pyrenæis.

DE GENTIANELLA.

CAPVT X.

I. GENTIANELLA alpina latifolia magno flore: ad radicem nigricantem, fibrosam, folia humi sparsa, quaterna, quina ve subrotunda, crassa, plantaginis, vel Calthæ alpinæ forma, vnciam lata, duas longa: inter quæ cauliculus vncias quatuor altus, vno alterove folio donatus, cui vtriculus insidet, vnicum florem oblongum, cæruleum, calathio similem sustinens: cuius calici vtrinque folium oblongum adponitur: ex Helueticæ alpinis habemus.

II. GENTIANELLA omnium minima: ex radice oblonga, tenui, albicante, foliola oblonga angusta, viridia, plurima simul instar cespitis coniuncta, prodeunt, inter quæ pedicelli breuissimi (tota enim planta, radice excepta, ad vnciam non excedit) quibus singulis flosculus, pro plantulæ ratione magnus, pallide cæruleis, staminulis donatus, caliculo inclusus, insidet: hæc nisi summe amara esset, Muscus aliquis floridus censeretur: in summis Alpium Helueticarum ingis reperitur.

DE PLANTAGINE.

CAPVT XI.

I. PLANTAGO maxima tota glabra: ex radice nigricante, fibrosa, folia sex, septem, octo, glabra, carnosa, & neruosa vncias sex longa, quatuor lata, pediculis penè palmaribus, initio rubetibus donata, prodeunt: inter quæ pediculi nudiores, quatuor, quinque, bicubitales, atrorubentes, rotundi, striati, spicam pedalem sustinentes, exurgunt: circa Montpelium reperitur.

Reperitur quoque folijs laciniatis, tenuibus, glabris, pedilibus, vncias sex latis, caule etiam superante, & ad spicæ exortum, folia habente.

II. PLANTAGO quinqueneruia caulium summitate foliosa: hæc à vulgari in eo differt, quod cauliculi spicam florum sustinentes, in caulem palmarem excrefcunt, in cuius summitate, folia plura, eo modo quo ad radicem disposita: spicis, non ob-

longis, sed rotundis, brevissimis pediculis lanuginosis insidentibus.

Reperitur etiam quinqueneruia vulgaris, spicis bifidis: vel loco spicarum, sunt capita mire variantia, à pediculis nudis sustentata, quorum quædam ex infima spicæ parte, vtrinque; vnum capitulum obtinent, alia pluribus capitulis, vtrinque; spicæ circumiectis, donantur.

III. *PLANTAGO* trineruia angustissimo folio: radice est tenui, fibrosa, albicante; folijs aliquando palmaribus, aliquando uncias quinque; longis, striatis, atromitentibus, tribus nervis distinctis, per marginem potissimum pediculis, pilosis: inter quæ cauliculi plures exurgunt, alij cubitales, alij pedales, alij palmares, aliquando triunciales, ad exortum aliquando villosi, glabri nonnunquam, quibus spicæ breues, oblongæ & subrotundæ insident. Hanc sæpius ad vias, maxime ad rudera, notauimus.

IV. *PLANTAGO* angustifolia paniculis lagopi: ex radice oblonga, fibris oblongis capillata & rufescente, cauliculi plurimi, aliquando supra viginti, nudi, leuiter hirsuti, rotundi, recurui, altitudine impares, alij palmam excedentes, semipalmares, alij duas tresve uncias non superantes, prodeunt, qui capitulum lagopi forma, modo longum, modo breue, molle, rufescens sustinent: ad latera flosculi parui, rufescentes, tenuissimis pedicellis insidentes conspiciuntur, quibus semen minutissimum succedit: folia habet plura, neruosa, uncias quatuor longa, uncia angustiora, hispida, & in exquisitissimum apicem desinentia. Hæc copiose in agris Neomausensibus prouenit.

Hæc aliquando ita parua, vt uncias tres non superet, magis villosa, & capitalis minimis rotundis donata.

DE HOLOSTIO SIVE LEONTOPODIO CRETICO.

CAPVT XII.

HOLOSTIVM. siue Leontopodium Creticum: Hex radice rufescente & quasi squamata, paulatim gracilescante, & in fibras diuisa, folia viginti, etiam plura, palmaria, angusta, nervis tribus per longitudinem discurrentibus distincta, & hirsutio subaspera, prodeunt: inter quæ pedicelli plures, molli rufescente lanugine pubescentes, duarum triumve unciarum conspiciuntur, quibus singulis capitulum crassiusculum, rufescens insidet: flosculi albicantes, umbilico nigricante præditi, quandam foraminum speciem præbent: at in senescente, & arescente planta, pediculi crassiores & rigidi facti, vna cum capitulo terram versus, ad radicis caput adeo curuantur, vt pedem leoninum quodam modo referant. Hoc in Creta prouenit, & Patavio à Laurentio Rosena Pharmacopæo, Leontopodij Cretici & Catanæ Cortusi nomine: dein pro Holostio minore, ab Imperato Neapoli accepi, & ante viginti & aliquot annos descriptionem, figuram addita, in Phytopinace proposuimus: postmodum & Clusius Leontopodij Cretici nomine, exhibuit.

DE CORONOPO.

CAPVT XIII.

CORONOPVS maritimus minimus: radiculæ est longa, capillari, foliolis multis per terram sparsis, in lacinias tenues instar foliorum Scabiosæ minoris siue Stæbes diuisis: inter quæ plures pedicelli recurui, unciales, thyrifulos paruos spicatos & hirsutos sustinentes, flosculis minutissimis donatos: tota planta hirsuta est: hanc

D. Gillenius misit.

DE PSTE-

Pſyllium minus.



DE PſYLLIO.

CAPVT XIV.

I. PſYLLIVM Indicum folijs crenatus: radice est oblonga, tenui, fibris capillata: caule circa radicem lignoso & rufescente, rotundo, subaspero, pedali, in frequentes ac foliosos ramulos diuiso, qui capitula plura, singula singulis pedicellis insidentia, sæpius dena, duodena, squamata sustinent, e quibus flosculi pusilli, pallide lutei, lanuginosi refulcent: semen nigricans, paruum, splendens, succedit: folia habet oblonga angusta, acuta, crenata, instar foliorum Coronopi, nonnihil laciniata, hirsuta: ex semine Pſyllij Indici nomine sato, in horto aliquoties Iulio florens, enatum. Et hoc Dioscoridis Pſyllium censemus.

II. PſYLLIVM minus: huic radix est tenuis, ob-

longa, subalbida, fibris paucis capillata ramuli semipalmates, rotundi, tenues, rufescentes, in terram reclinati, in summo in minores diuisi: folijs breuib. angustis, binis sibi ex opposito respondentibus, quæ alis subijciuntur, aliquando ternis, nonnunquam quinis simul iunctis: ramulorum fastigijs, capitula squamata insident, quibus vtrinque foliolum vnum (aliquando plura & impari longitudine) paruum recuruum & per maturitatem rigidum subijcitur: flosculos habet pusillos, albos, pedicellis inhaerentes, quibus semen longe vulgari minus, subnigrum relucens, succedit, Augusto florens in horto collegimus, semen Parauio ex nobiliss. Bembi horto, Gottne rubri & albi nomine misso: sic & Alpinus, Gottne rubrum nominauit, differentiam inter Gottne rubrum & Gottne album (hoc enim Holostij species est) faciens. Idem & Borrio rubro nomine, a Sprengero Heidelbergæ accepimus.

DE LIMONIO.

CAPVT XV.

I. LIMONIVM maritimum minus foliolis epedatis: ad radicem crassam, lignosam, rufescentem, parumque fibrosam, folia plurima, densa, carnosa, læuia, subrotunda, per terram instar cespitis sparguntur, in quibusdam plantis obtusa, nulloque mucrone prædita: in alijs, in summo sinum habentia, & cordis formam referentia: inter quæ cauliculi plures, inæquales, trium, quatuor, etiam sex uncularum teretes, nudi, prodeunt, in plurimos breues & recuruos ramulos diuisi, flosculis frequentibus paruis, pallide rubentibus onusti. Hoc in litore maritimo, vt circa Massiliam & Louornum, reperitur.

II. LIMONIVM maritimum minimum: tota plantula uncias quatuor vix excedit: nam ad radicem oblongam, rufescentem, in summo diuisam, foliola minima, subrotunda, crassa, instar Sedi compacta, inter quæ cauliculi unciales, paucos flosculos pallide rubentes, vel subcæruleos sustinentes, exurgunt. Hoc in insula quadam non longe Massilia, prouenit. De alijs Limonij differentijs, in Theatro agetur.


DE BISTORTA.

CAPVT XVI.

BISTORTA alpina maxima: ex radice quadruplo quam in vulgari maiore, contorta, geniculata, fibriscapillata, foris nigricante, intus alba, caules bicubitales, nodosi, striati, maiori ex parte nudi exurgunt, quorum quælibet spicam florum sub-purpureorum, vnciarum quatuor sustinet: folia

habet oblonga, in acumen desinentia, venosa superne virentia, inferne castia, vel etiam incana: quorum quedam ad cubiti altitudinem accedunt, sed angusta, vncias tres lata. In altissimis Silesiorum montibus reperitur, vt in Sudetorum iugis, velut ad Gigantum, Albis fontes.

Schnee-gruben.



DE PYROLA.

Pyrola alfinis flore minor.

CAPVT XVII.

Pyrola alfinis flore maior.



hactenus figura posita fuit: Europæam tamen, primus Val. Cordus in obser. sylua sub herba trientali proposuit; dein Iohannes Thalius, in sua Hircynia Saxothuringica, sub Alsmâthemo descripsit: & Iohann. Francus in horto Lusatia, nomine herbæ pusillæ trientalis, & tandem Casp. Schwenckfeldus, in suo Catalogo plantarum Silesiæ, Alfinem alpinam nominauit: nulla differentia ostensa. Alfinanthemi maioris & minoris nomine, à D. Sigfrido Holmstadio: Pyrola Bohemica maioris & minoris, à D. Doldio: minorem vero, nomine Anonymi Belula folio, in betuletis Scotia nata, D. Cargillus, ex Scotia misit. Huius descriptionem, à prædictis propositam, præterire, & Brasilianam maiorem describere, in præsens lubet.

PYROLA Alfinis flore Brasiliana: ex radice alba, tenui, capillata, cauliculus effertur singularis, tenuis, læuis, sex, septemve vnciarum, inferiore parte nudus, circa medium duobus foliolis paruis sibi oppositis donatus, superius vero folijs sex vel septem per ambitum cinctus: quæ magnitudine imparia sunt, aliquibus vncias duas, alijs vnam longis, vnciam vel semunciam latis, Plantaginis quinqueneruæ forma (cū & per huius folia quinquenerui discurrant) sed glabra, tenera & viridra, in acumen fastigiata, ex quorum medio pedicellus tenuis, vncialis exurgit, florem singularem, pallide luteum, vngui pollicis æqualem, quadrifolium, striatum, cuius folia (stella modo disposita) lateralia, alijs duobus latiora sunt: ad floris vmbilicem, staminula plura exigua, rufescentia occurrunt.

Hæc in Brasilia apud Tououpinambaultios reperta

PYROLA Alfinis flore duplex est. Europæa & Americana, vtraque maior & minor est: nullius

reperta est, & ab Europæa, potissimum folijs quinquenerijs differt, cum per Europæe, tam maioris, quam minoris folium medium, vnicus neruus feratur, à quo fibræ per latera sparguntur: dein flore, quintuplo maiore: At minor Brasiliana, ab Europæa minore, solum foliorum magnitudine, quæ in Brasiliana longiora, angustioraque sunt, differt.

DE POTAMOGETO.

CAPVT XVIII.

I. POTAMOGETON racemosum angustifolium: radice est capillacea, rufescente, cauliculis tenuissimis, palmaribus, in aqua fluitantibus, folijs angustis, longis, binis ex opposito respondentibus: aliquibus in ambitu leuiter sinuatis, aliquibus minime sinuosis: petiolo tenui, breuique, flosculi pusilli, vix in morem congesti, insident, quibus granula aculeata, simul iuncta succedunt. Hoc prope Monspelium, ad molendinum in aqua fluitans reperitur: idem tribuli aquatici minoris nomine, D. Francus ex Lusaria misit.

II. POTAMOGETON gramineum ramosum: ex cauliculo pedali, etiam cubitali tenuissimo, rotundo, albicante, in plures alas brachiato, folia graminea, oblonga, atrouirentia, non alternatim, sed multum ab inuicem distita, prodeunt, quæ in alia folia, fere capillacea, abeunt, nihilominus tamen exprimi folijala, cauliculus in similia folia abiens, exurgit: in extremo caulis, pediculus triuncialis, flosculos minutos, & granula subsequentera minuta & subaspera, non racemi modo, sed magis, & velut in spica, dispersa, sustinet. Hoc in paludibus Austriæ fluitans, Fontilapathi graminei nomine, D. Burserus misit.

III. POTAMOGETON minimum capillaceo folio: hoc paruum est capillaceo & caule & foliolis oblongis, inordinate dispositis, pallide virentibus: in summo, pedicello paruo, modo vno, modo duobus, capitulum minimum & acuminatum, prioris tamen forma, quod minutissimo flosculo pallidulo successit, sustinens, quorum aliud expansum, aliud quasi vesiculæ foliaceæ in acumen desinentis, inclusum est. Hoc cum sequenti, Monspelio D. Burserus attulit.

IV. POTAMOGETON capillaceum, capitulis ad alas trissidis: hoc cauliculo est palmari, pilo non crassiore, ramoso, articulado, ad quemlibet articu-

lum, folia bina, oblonga, quouis pilo tenuiora, ex aduerso respondentia: quorum alis, minutissimi flosculi palliduli insident, qui iuncti, nodulum quasi referunt, quo maturato, nodulus siue capitulum, ex tribus portuunculis semicircularibus in apicem abeuntibus & rufescentibus compositum, conspicitur: nihilominus tamen, ex priorum foliorum alis, pedicellus exurgit, qui in tria, etiam plura foliola absimitur, similisq; in medio nodulus adponitur; in summitate namque capitulum nullum est.

DE SERPENTARIA.

CAPVT XIX.

SERPENTARIA triphylla Brasiliana: hanc integram describere non licet, siquidè solum caulis portio cū folio & flore ad manus sit: quare ex caule rufescente, striato, exurgit, folij pediculus palmaris, & læuis, in cuius summo folium tenue, albide virens, fibrosum, subrotundum, trifidum, in exquisitum apicem desinens, duabus partibus inferioribus, & quidem inferne sinum obtinens, quorum quodlibet, vncias binas cum dimidia latum, longitudine vero vncias quatuor superat: flos serpentariæ maioris forma, similiter pediculo triunciali donatus, longitudine vnciarum quinque, latitudine sesquiuncialis, atrorubens, striatus, venis albicantibus per medium, maxime extrinsecus, excurrentibus: pistillo nigricante, oblongo, in summo bifido. Ex Touëpinambault Brasilie anno 1614. allata.

DE TVSSILAGINE.

CAPVT XX.

TVSSILAGO alpina folio oblongo: ex radice nigricante, minimi digiti crassitie, plurimis fibris donata, caulis exurgit cubitalis, hirsutus, rufescens, striatus & asper: folijs ad radicem quinis, senis, longis pediculis donatis, oblongis, nigricantibus, duris, hirsutis asperis, per marginem crenatis, & imparis longitudinis: at in caule binis, tenuius angustioribus: cuius summo, aliquando in ramos diuiso, flos muscosus, luteus, latis magnis insidet, qui tandem in pappum evanescit. In Helvetiorum alpiibus & Baldo (sed angustioribus folijs) prouenit.

DE CACALIA ET LAPPÄ.

CAPVT XXI.

CACALIA tomentosa: folia habet Tussilaginis folijs maiora, figura instar Personatiæ oblonga, in ambitu serrata, nonnunquam sinuata, superne ex virore nigricantia, venis tamen, in cana lanugine albicantibus, percurrentibus: inferne, propter densam & molliissimam lanuginem qua pubescunt, candidissimis: quorum pedicelli oblongi, striati,

non secus ac folia, lanuginosi: de floribus nil constat, cum solum folia aliquot D. Paschalis ad nos miserit, in Sumano monte prope Vincentiam collecta: eandem circa Thermas Fabarias, sed floribus, cauleq; carentem, postea obseruauimus.

LAPPÄ rosea: hæc à vulgata differt capite; nam circa floris capitulum, folia plura, veluti in Plantagine rosea, dense stipata, iunguntur, quæ singula in mollem aculeum desinunt: hæc apud Lipsenses frequenter reperitur, vnde à D. Jungermanno accepimus.

LIBER SEXTVS.

DE LEVCOIO.

CAPVT I.

I. LEVCOIUM luteum magno flore: hoc à vulgari Leucoio luteo Keiri dicto, differt magnitudine & colore, quia paruum fruticem, valde ramosum & totum virentem refert: folijs est maioribus, viridibus, splendentibus: floribus quadrifolijs magnis, ita vt huius folium, vulgaris totum florem pene adæquet, odoratissimis, intensiorisque lutei coloris: siliquis copiosis, semen minutum, planum rufum continentibus. Hoc Maio mense & maiore ætatis parte floret, pertenuis est, & frigoris patiens, cuius semen, Leucoij lutei Hispanici nomine misum est.

II. LEVCOIUM luteum serrato folio: hoc à præcedente folijs potissimum discrepat, quæ duplo pene longiora, angusta, per latera crenis asperis serrata, & in aculei finientia, quæ similiter crassa, sed pallide virentia, mollia, quia parte inferna quasi lanugo aspersa est: flores lutei sunt & magni. Hoc D. Doldius Norinberga misit.

III. LEVCOIUM luteum sylvestre hieracifolium: hoc circa radicem crassiusculam, albicantem, in oblongas fibras capillatas abeuntem, folia plura habet per terram sparsa, eaque oblonga, angusta, subaspera, sinuosa & per ætatem in planta luxuriant. Hieracii instar sinuata, quæ circa caulem pedalem, striatum, non nihil in canum alternatim disposita, oblonga, latiuscula, vt in Keiri vulgari pal-

lide virentia, ob raras crenas inæqualia, tactuq; ob leuissimam hirsutiem aspera: caulis maior pars floridus est: flores lutei sunt, quadrifolij, Keiri floribus minores, oblongis pediculis donati, quibus siliquæ triuiciales strictissimæ, in summo vtrinque parum reflexæ, succedunt: hoc in syluis prope Neustadium Hærcyniæ reperitur, vnde D. Furerus misit.

IV. LEVCOIUM album odoratissimum folio viridi: radice est multifida, caule viridi, ramoso, aliquando minimi digiti crassitie: folijs viridibus, splendentibus, crassis, Keiri folijs forma respondentibus: floribus albis, quadrifolijs, suauiter a modum & quidem vesperi Hesperidum modo, olentibus, cuius nomine nostrates, *Bisem Nâgeln*, id est, moscui redolentes garyophyllos vocant: quibus siliquæ longæ, crassiusculæ, virides, duplicem planorum seminum ordinem, membrana intercurrente, continentes, quod Leucoii albi Cretici nomine primo accepimus. Hoc per aliquot annos durat, si hyeme in cella asseruetur.

V. LEVCOIUM minimū Creticum: cauliculo est palma minore, viridi, striato, leuissimis tamen pilis aspersis: foliolis subrotundis, pallide virentibus, longis pediculis donatis, aliquando binis ex opposito, aliis alternatim sitis: cauliculi summū in duos pedicellos abit, qui flosculum oblongum, cæruleum, quadrifolium, modo vnum, modo duos, sustinent.

stinent. Hoc ex horto nobiliss. Contatani, D. Le-
ritzii attulit.

VILLEVCOIVM maritimum minimum: radicu-
lam habet tenuissimam, oblongam, albam, ad quā
foliola minima quina, senave, subrotunda & pal-
lida; cauliculus sesquiuncialis, rufescens, quinis, se-
nis, foliolis oblongis, obtusis, hirsutis subcanis,
alternatim dispositis, cingitur: flosculum vnum vel
alterum subcaeruleum. cauliculus & pedicellus
hirsutus sustinet. Hoc in litore maris prope Terra-
cinum reperitur.

DE HESPERIDE.

CAPVT II.

I. HESPERIS sylvestris flore paruo: caule est cu-
bitali, viridi, striato, nodoso, multis alis fere
palmaribus, donato & concavo: folijs quam in vul-
gari acutioribus, in ambitu profundius serratis, vi-
ridibus, subhirsutis & minus vulgari asperis: flori-
bus plurimis, subcaeruleis, quadrifolijs paruis, ita
vthuius flos integer. vix vulgaris foliolum adae-
quet, quibus siliquæ strictissimæ succedunt. Hæc,
circa Monspelium in horto Dei, ad aggeres aqua-
rum, à D. Bursero collecta fuit.

II. HESPERIS sylvestris Hieracij folijs hirsuta:
tota planta hirsuta est, caulem habens pedalem,
angulosum, hirsutum, pallide virentem, in summo
in ramos aliquot alternatim dispositos diuisum;
folia Hieracinis instar laciniata & sinuata, oblon-
ga angusta, acuminata, crassa, hirsutis aspera, quo-
rum superiora pediculis carent: flores in calicibus
hirsutis rubri, magnitudine Hesperidis vulgaris
flores æquantes: quibus similes siliquæ, semen cō-
tinentes succedunt. In faxosis humidis Prouinciæ,
D. Burserus legit.

DE SAPONARIA.

CAPVT III.

SAPONARIA concava Anglica: planta est elegans,
radicibus fuscis, crassis, longis, lentis, repentibus
fibellis paucissimis adhaerentibus: vnde caules ex-
urgunt cubitales, rotundi, striati, glabri & albi, ge-
niculis distincti, in terram reclinati, & concavi:
circa quos folia viridia, glabra, subrotunda, ner-
uosa, vncias duas lata, paulo longiora, rarius ex sin-
gulis geniculis bina, sed ex quolibet geniculo vnū
tantum, nullo certo ordine vel numero enascitur,
quod antequam expandatur, fistula instar caulem
complectitur: flores in summo caulicorum, ex su-

periorum foliorum sinu, tenerrimis pedicellis sub-
nixi, ex caliculis oblongis, nonnihil hispidis pro-
deunt, Saponariæ vulgaris forma, ex quinque folijs
per oras crenatis, commissi, qui colore albi sunt, le-
ui carneo colore asperso, in quorum medio stami-
nula quædam exigua: semen non vidimus.

Hæc æstate media floret in Angliæ, quæ in Co-
mitatu Northampton, in nemore quodam Spianie
dicto, à D. Gerardo Chirurgo Londinensi reperta,
Gentiana concava nominata, & Londino à D. Li-
stero, vna cum figura suis coloribus illustrata, mis-
sa fuit.

DE LYCHNIDE.

CAPVT IV.

I. LYCHNIS auriculæ vrsi facie: hanc in Phytopi-
nace sub Lychnide viscosa Cretica exhibui-
mus, cuius hæc perfecta descriptio est: radice est
alba, longa, & fibrosa, folijs ad radicem pluribus,
etiam viginti numero, per terram sparsis, incanis,
lanuginosis, Auriculæ vrsi folijs forma & crassitie
similibus, vncias tres, etiam quatuor longis: quæ ex
longissimo & latiusculo pediculo sensim rotundā
figuram acquirunt, & raris vaguam latitudine su-
perant: caulem habet sesquicubitalem, ramosum,
rotundum, hirsutum, firmum, in summo læto suc-
co glutinosum: flores ex viridi flauescens, plures,
quasi in umbella congesti; quinquefolij & bifidi:
quibus caliculi parui, semen minutum nigricans
continentes, succedunt. Hanc à Ioh. Bauhino, Vis-
caginis auriculæ vrsi facie Candia, quo nomine se-
men à Calabria Florentia acceperat; primum ha-
bui: dein Lychnidis auriculæ vrsi facie: & hanc
postmodum Clusius, Lychnidis syl. latifoliæ no-
mine, exhibuit.

II. LYCHNIS syl. minima exiguæ flore: ex radicu-
la oblonga, tenui, cauliculus rotundus, rufescens
geniculatus, trium quatuorve vnciarum, in alas
minimas brachiatus exurgit, foliolis binis exiguis,
acutis, ad quemlibet geniculum & alam, & ex qua-
libet ala, pedicelli oblongi, angustissimi, rigidi,
quibus flosculus purpurascens, ex quinque foliolis,
singulis cordis formam referentibus, compositus
insidet. Hæc circa Monspelium, in pede montis qui
est prope Boutonet copiose reperitur, quam Cen-
taurium minimum appellabant. Verum ante qua-
driennium eandem, sed palmum superantem, &

Florentiæ ad agrorum margines natam, Tu-
nicæ peculiaris nomine, à D. Burf.
accepimus.

DE CARTOPHYLLO.

CAPVT V.

I. **CARYOPHYLLVS** arborefcens Creticus: ex radice crassa, alba, dura, & lignosa, caules cubitum superantes exurgunt, albi, rotundi, læues, geniculati, lignosi, in alas brachiat: folia habet ad radicem plura, longa: angusta, in acutum mucronem desinentia, pallide virentia, in caule paucissima: flores, e calicibus viridibus, tenuissimis & acutissimis foliolis cinctis quinquefolij, eleganter, sed non profunde, fimbriati, ex diluta purpura rubentes, prodeunt: ex quorum medio staminula plura breuiaque prominent: semen vero paleaceum in caliculis continetur. Ex semine Cretico, in horto Montembelgardiano velut in arbusculam excreuit.

II. **CARYOPHYLLVS** sylvestris repēs multiflorus: ex radice crassa, lignosa, subfusca, cauliculi plurimi, etiam quandoque supra triginta, trium quatuorve vnciarum, tenues, partim in terram reflexi, partim erecti, paucis foliolis cincti, quæ circa radicem plura, breuissima, angustissima, dura, mucronata, viridia: quibus singulis flos, modo vnus, sæpe duo simul caliculis ad exortum iunctis, quinquefolij aliorum forma, pallide rubentes insident. In saxosis circa Monspelium prouenit.

III. **CARYOPHYLLVS** sylvestris biflorus: ex radice parua, folia pauca angustissima, vt prioris, sed multo longiora, exurgunt, & inter hæc cauliculus tenuis, plus minus palmum altus, in summitate in duos pediculos semper distinctus, quorum singuli florem magnum, Caryophylleo syl. vulgatissimo multo maiorem, quinquefolium, leuiter laciniatū colore pallide rubentem sustinet. Circa Geneuam D. Cherlerus collegit.

IV. **CARYOPHYLLVS** pumilus latifolius: a radice cauliculus, statim in duos ramulos sex vncias altos, tenues, rotundos diuisus prodit, cui ad radicem folia breuia, latiuscula, in ramulis longiora, mollia & pallida, binis sibi inuicem ad geniculos respondentibus: cuilibet ramulo, flos vnus, priore multo minor, pallide purpurascens, magisq; albēs, ex breuicalice prodiens, insidet: ex Austria D. Burserus misit.

V. **CARYOPHYLLVS** holostius alpin⁹ latifolius: ad radicem tenuem, albicantem, fibrosam & re-

pentem, cauliculi aliquot in terram reclinati, hirsuti, trium, quatuorve vnciarum, folijs paruis, subrotundis, latis, binis, sibi inuicem respondentibus, hirsutis, & crassis cincti: ex alarum sinu, pediculorum instar ramuli exurgunt, singuli florem vnum, calici vindi primo inclusum, dein quinquefolium magnum & album sustinent, cui capitulum oblongum, semen continens succedit. Hic in Valesianorum alpibus, loco *Gemmæ* dicto, & circa Fabarias reperitur.

VI. **CARYOPHYLLVS** holostius alpinus angustifolius purpurascens: & hic radícula est repente, cauliculo tenui, triunciali, leuiter hirsuto, circa quem foliola parua, oblonga, acuminata, bini sibi opposita: flores in summo bini, terni, prioribus minores, purpurascens, stellæ in modum dispositi, calicis foliolis viridibus alternatim velut intercedentibus: ex Pyrenæis Hispanicis, D. Burserus attulit.

VII. **CARYOPHYLLVS** holostius alpinus gramineus, radiculâ habet exigua, caule palmarē, exilem, rotundum, geniculatum, pilis leuissimis donatum, circa medium in ramulos & hi in alios brachiatum: folia ad radicem pauca, ad geniculum bina, ex opposito respondentia, atrouirentia, angustissima, vnciam longa; flosculi albi quinquefolij, ex calice prodeuntes, singuli, singulis pedicellis insident: quibus exiguum capitulum, minuto semine refertum, succedit. In alpibus prouenit: in Austria monte Taurero, D. Burserus legit.

VIII. **CARYOPHYLLVS** holostius montanus angustifolius albus: & hic cauliculo est tenui, geniculato, rufescente, glabro, trium quatuorve vnciarum: folijs oblongis, angustis, glabris cincto, floribus albis quinquefolijs, & prædicto quinto multo minoribus. In horto Dei, D. Burserus legit.

IX. **CARYOPHYLLVS** holostius tomentosus latifolius: ex radice tenui & repente, caulis tenuis, rotundus, geniculatus, in terram reclinatus prodit, qui statim in ramulos plures palmares, semipalmares, etiam minores subdiuiditur, quos folia oblonga, latiuscula, quædam subrotunda, ob lanuginem aspersam mollia & alba, bina & opposito respondentia, cingunt: flos non est conspectus: Hunc ex horto Pisano & quidem secundo, primum opera D. Wolfhardi Ocymoides tomentosus nomine, accepimus.

X. **CARYOPHYLLVS** holostius tomentosus angustifo-

gustifolius: hic cauliculis est palmo minoribus, rectis tenuibus, rotundis & parte infera geniculatis, superiore parte nudis & pene glabris, qui statim in ramulos breuissimos, ex alarum sinu, ex aduerso sitos, diuiduntur: folia habet oblongiuscula, angustissima, reflexa, ob tomentum mollia & ex viridi albicantia: cauliculus in tres pedicellos, binis foliolis sustentatos, eosque oblongos, sed longitudine impares, ab it, qui singuli calicem viridem sustinent, cūctos vnus, isque albus & quinquefolius insidet: hunc in Granada, ad radicem montis copiose D. Albinus obseruauit.

Caryophyllus aruenfis glaber minimus.



XI. CARYOPHYLLVS aruenfis glaber minimus: ex radice capillacea rufescente, cauliculus vnus vel alter, tenuissimus, geniculatus, pedalis prodit, in summo valde ramosus, ramulis capillo tenuiori-


bus, quorum singuli, singulos flosculos albos, minutissimos, in duos apices abeuntes sustinent: folia habet pauca, longa, angusta. Variat magnitudine, nam & semipalmaris est, paucissimis, capillaceis, breuioribusq; foliolis. Illum ex Euganeis collibus habemus: hunc vero Monspelio: & hoc adhuc minus ex syluis prope thermas Wisbadenses infra Moguntiam.

XII. CARYOPHYLLVS saxatilis ericæfolius umbellatis corymbis: ex radice tenui, contorta, lignosa & reclinata, cauliculi plures, geniculati, rufescentes, semipalmares, attolluntur: ad quorum exortum foliola breuia, angusta, ericæ similia & ad genicula singula bina breuissima & rigidiuscula: cauliculorum summitatibus, veluti umbellæ ex corymbis compositæ insident, vnde flores candidi, ex quatuor, aliquando quinque foliolis constantes, prodeunt. Hic in Galliæ prouincia locis saxosis, in monte edito prope Vigan reperitur.

XIII. CARYOPHYLLVS saxatilis ericæfolius ramosus repens: hic instar musci eleuati per terram repens, ex radice caulem lignosum emittit, in ramos plures, & hos in alios subdiuisum, quos folia exigua ericæ folijs similia tingunt: quorum summitatibus flores copiosi, niuei, magni, elegantissimospectaculo insident: ex Pyrenæis D. Burserus attulit.

Hunc floribus rubris, sed maioribus, folijsq; ad cauliculos longioribus & latioribus, ex Hispania habemus, Vterque à Caryophyllo muscolo, siue musco florido, diuersus est.

XIV. CARYOPHYLLVS saxatilis siliquosus: è saxorum fissuris in Hærcyniæ promontorijs, planta perennis erumpit, foliolis ad radicem pluribus bellidis forma, sed multo minoribus, oblongis pediculis donatis, tenuibus pallide virentibus, inter quæ cauliculi tenues, læues, palmares, in oblongos ramulos diuisi, folijs paucis, longis, angustis cincti, prodeunt; ramulorum summis flores candidi, quadrifolij insident, quibus siliquæ strictissimæ, minutissimum semen rufescens continentes, succedunt. Gypsophyti siliquosi nomine, D. Furer. communicaui.



DE ANTIRRHINO.

CAPVT VL.

ANTIRRHINVM saxatile folio serpilli: radice est parua, ramis multis, reflexis, tenuibus, leuiter hirsutis: folijs Serpilli vulgaris forma, sed minoribus: floribus rubris, aliquando pallide cæruleis, pedicellis oblongiusculis insidentibus, forma & magnitudine vna cum capitulo succedente, Anthirrhino arueni minori similibus. Massilia in saxosis prouenit.

DE LINARIA.

CAPVT VII.

Linaria bellidis folio.



LINARIA latifolia Dalmatica magnò flore: caulibus est lignosis, rotundis, firmis, cubitis

superantibus, in ramos brachiatis, quos folia, præsertim inferiora, vnciam lara, duas longa, pediculis carentia, in apicem acutissimum desinētia, nullo ordine seruato, ambiunt: flores habet Linariæ vulgaris florib. forma similes, sed triplo imo quadruplo maiores, ex luteo rufescentes, aureosve, quibus vascula vt in alijs, succedunt. Hanc anno 1594. in horto Montembelgardiaco collegimus, enatam ex semine à Catabona Florentia misse nomine Linariæ maximæ Dalmaticæ lauri folijs: eandem quoque nomine Linariæ perennis fruticantis Creticæ accepimus.

II. LINARIA Americana paruo flore: ex radice: caules plures sesquicubitales, rotundi, lautes, rufescentes, in ramos plures diuisi, exurgunt, quos folia triplo quam in prioribus angustiora, in exquisitum apicem desinentia, atrouirentia, alternatim nulloq; ordine disposita, cingunt: floribus est aureis, ijsque longe quam in vulgata minoribus. Hæc an. 1601. Argentina, in horto D. Saltzmanni creuit.

III. LINARIA latifolia tryphylla: caulibus est viridibus, rotundis, striatis, glabris, sesquipalmariibus, in summo brachiatis: folijs vt in Linaria Valentina Clusij, terno, & aduersis inter se petiolis ordine adhaerentibus, dispositis, quolibet folio vtricia latiore & duabus longiore, tenui, ex glauco virescente, venis ternis, vt in plantagine per longitudinem discurrentibus: at in caulis summo, modo terna, modo bina, modo sine ordine sita sunt: extremo ramo veluti spica oblonga florum Linariæ vulgari simillimorum rictu flauo, calcari vero pallide cæruleo. Hanc Linariæ latifoliæ Valentina Clusij nomine D. Doldius misit, cuius in Phitopinace sub Linaria 5. meminimus. An hæc Linaria Cretica latifolia Clusij, in sua historia?

IV. LINARIA capillaceo folio erecta flore odor: hæc caulibus est cubitalibus, rotundis, ramosis: folijs plurimis, capillaceis, nulloq; ordine dispositis: floribus paruis ex cæruleo, alboq; mixtis, cuius rictum linea flauescens distinguit, suauem & subtilem odorem spirantibus: quibus capitula Lino fere similia, minutum semen in pericarpis continētia succedunt. Planta perennis est, Monspeßulifonte proueniens: nonnunquam ibidem in muris reperitur: flore vario, coloribus ex albo, cæruleo & luteo mixtis.

In hortis, cultura omnibus sui partibus maior est, duos cubitos superans, & quidem duplex, altior flo.

ri flos odoratior, alteri inodorus: quæ ex radice repente & perenni mire se propagat.

V. LINARIA aruenfis cærulea erecta: hæc radice est exili, capillacea, cauliculis palmâribus, folijs capillaceis, sed rarioribus & breuioribus, quam in priore: floribus paruis, violaceis, lini capitulis exiguo semine refertis. Hæc in agris Lusitiæ flore est cæruleæ: at Monspessuli in aruis ad montem Cetium violaceis reperitur.

VI. LINARIA aurea affinis: caule est cubitali, rotundo, lignoso, in ramulos brachiato, quorum summitatibus flores lutei, Senecionis maioris forma, & similiter in pappum abeuntes, insident: folia oblonga, angusta, Kali maioris cochleato semine, folijs & forma & modo dispositis (sed densiora) habet. In Aragoniæ locis desertis, D. Albinus collegit.

LINARIAM bellidis folio, à C. Clusio, Lobelio & alijs sub Linaria odorata, descriptam, sed non recte icône expressam, cum calcaribus careat, figuram veram adponere visum fuit.

DE LINO.

CAPVT VIII.

I. LINUM frutescens subflauum: fruticosum est, caulibus cubitalibus, tenuibus, leuibus & ramosis; folijs angustis, breuibus, sine ordine dispositis: floribus in summis cauliculis multis & magnis, subflauis, quinquefolijs, totidem in medio staminibus. Hoc in Granada D. Albinus legit.

II. LINUM syluestre cæruleum folio acuto: caule est pedali, rotundo, lignoso, statim ad exortum in

ramos palmares diuiso, quos folia atrouirætia, basilatiore alternatim cingunt, & in exquisitissimum, & veluti aculeatum mucronem definût: ramorum summitatib⁹, cauliculi multi quasi in umbella dispositi, calices aliquot apicibus donatos sustinent, è quibus flores magni, cærulei, quinquefolii, in medio staminibus donati, prodeunt, quibus vascula subrotunda succedunt. Hoc in saxosis Prouinciæ, non longe Massilia prouenit.

III. LINUM minimum stellatum: tota plantula duarum, rarius trium vnciatum est, radícula capilli instar tenui, albicante, cauliculo vno vel altero tenuissimo, foliolis breuib⁹, in exquisitissimum paruumq; apicem definëtibus: inter quæ flosculi parui, pallide virentes, stellati, ex quinque radiolis, exiguum circulum veluti vmbonem cingentibus, cõpositi. Hoc Monspessuli in Gramuntio & Boutoneto prouenit, & ab alijs lingua auis minor ab alijs Passerina minor saxatilis, dicebatur.

DE HYSSOPO, HYSSOPI FOLIA, SIVE
Gratiola minore, & Thymo.

CAPVT IX.

HYSSOPVS latifolius: caulibus est lignosis, rufescentibus, striatis: folijs triplo quam in vulgari latioribus, obtusis, in reliquis cum vulgato conueniens. Londino D. Cargillus misit.

2. Addidit & alium, à vulgato solum foliorum colore diuersum, qui in hoc atrouirens, in illo vero pallide luteus.

3. Sic & tertium hirsutum, cuius caules & folia, molli lanugine pubescunt.

Hyssopifolia siue Gratiola minor.



HYSSOPIFOLIA siue Gratiola minor: ex radice modo crassiore, modo tenuiore, ac fibrosa albidâ, caulis exurgit cubitalis, in plures ramulos diuisus, subrotundus, rotundus, striatus, quem folia Polygoni masculæ æmula cingunt; pallide virentia, alternatim disposita, & pediculis carentia: ex quorû alii flores singuli, oblongis caliculis inclusi, eleganter cærulei quadrifolij; hos sequuntur vascula oblonga, semina minuta subfusca cõtinentia. Hæc omnis odoris expers est, & pene insipida, licet aliqui nitrosum, alij subdulcem saporem in ea notant.

Variat folijs: altera est latioribus, quæ altius exurgit: altera angustioribus & oblongis, quæ vix palmaris, Iunio mense flouet. Floribus item, nam ex Hispania habemus, quæ flores habet oblongos. forma Gratiolæ vulgaris similis, qui saturatoris collis: et ubi sunt. Locis humidis & vliginosis nascitur,

quam primum in paludibus Patauinis & ad portam S. Iustinæ & quidem latioribus folijs, legimus: dein circa Monspelium in riuiulis, vbi Anagallidem aquaticam vocabant: tum in Alsatia non longe Mulhusio, item locis vdis: quæ vero folijs angustioribus est, Monspelluli, ad lucum Gramutium prouenit. Hanc videtur notasse Cordus in obs. **Grasæ Poley.** & Gesnerus libel. de coll. stirp. Gratiolæ minoris nomine. Camerarius, qui in Fræconia obseruauit, Hyssopoidem nominauit, & in Hassia, Halimum aquaticum vocari monet: in Phytopinace sub Hyssopifolia Ioh. Bauhini: & in Matthiolo emaculato sub Gratiolâ minore, figura addita (quâ hæcenus nullus exhibuit) proposuimus.

THYMVM inodorum: suffrutex est, ob læuam lanuginem, quæ pubescit, incanus, caule lignolo, cortice incano, rugoso vestito, qui in plures ramos palmo minores, recuruos, hinc in alios & velut in orbem dispositos, diuiditur: quos per interualla folia breuissima, angustissima, plura simul iuncta, inodora & pene insipida, sed astringendi vi prædita, cingunt: cauliculorum summis flores plures purpurei, forma & dispositione Thymi vulgaris floribus similes, insident. Hoc in regno Valentia, locis arenosis in litore ad Alicanta, copiose prouenit, D. Albino referente.

DE SERPILLO ET POLIO.

CAPVT X.

SERPILLVM latifolium hirsutum: tota planta obmollem lanuginem, quæ pubescit, præsertim caulibus, incana est: cauliculis donatur frequentibus, tenuibus, longis, recuruis: qui folijs subrotundis, pediculis oblongis, binis ex aduerso nascentibus, cinguntur: cauliculorum summis capitula flosculorum purpurascantium, vt in vulgari, insident. Hoc sæpius locis aridioribus apud nos reperitur.

POLIVM latifolium incanum Creticum: & hæc planta tota, tomento albo, molli, tecta est, habens caules pedales, rotundos, in ramos palmares, hosque in breuiore subdiuisos, quos folia subrotunda crenata, instar Alfinis hederulæ folio, vel Chamedrys, crassa, rugosa, bina ex aduerso nascentia, inferne candida, superne ex viridi statescerit, quæ masticata pene insipida (in sicca platra) & non secus ac si tomentum dentibus contereretur sensum præbent: flores non vidimus Hoc ex Creta ab Honorio Belli, nomine Polij platiphylli Cydoniensis, accepimus.

Ocimum latifolium maculatum.



DE PVLEGIO ET ORIGANO.

CAPVT XI.

PVlegium folijs nummulariæ: ex horto Parauino. D. Heyl ante vndecim annos attulit, huius ramum tenuem, palmarem, quasi geniculatum, quæ folia & singulis geniculis bina, tenuia, instar Nummulariæ rotunda, sed sextuplo minora, pedicellis donata, & ex aduerso sibi respondentia, cingunt, & floribus ex albo cæruleis, caulem verticillatim ambientibus, subiiciuntur. Hoc odore vulgari multo est gratiore.

ORIGANVM syluestre humile: ex radice lignosa, rufescente, fibrosa, cauliculus communiter vnus, rotundus, rufus & asper, vnciarum sex vel septem, exurgit: qui in summo in ramulos plures diuiduntur, hique flores, vmbellæ forma ex cæruleo purpureoque mixtos, sustinent: folia habet parua oblonga, subhirsuta, compacta & inordinate dis-

posita, potissimum cauliculi partem summam ambientia, vulgaris Origani odore. Hoc circa Aureliam Gallorum copiose reperitur.


OCIMVM latifolium maculatum, sub latifolio à Cæsalpino, Basilici Indici vel potius Hispanici nomine, à Camerario exhibitum: cum eius figuram hactenus apud Herbarios non viderim, non abs re fore iudicaui, si his adderetur.

DE MENTHA ET CALAMENTHA.

CAPVT XII.

I. **M**ENTHA rotundifolia minor, seu flore globoso: caule est pedali, anguloso, rufescente, hirsuto; aliquando incana lanugine cincto: quem folia ex rotunditate oblongata, mollia, hirsuta, per marginem crenata, subtus incana, superne attrouirentia, bina semper sibi mutuo opposita, ambiunt: ex foliorum alis, nonnunquam ramuli prodeunt, quibus flores, veluti in capitulum globosum collecti, purpurascens insident: tota planta grauis odoris est. In scrobibus humentibus & riguis, secus fossas aquarum, reperitur.

II. **M**ENTHA radice geniculata: ex radice modice trassa, geniculata, fibris distincta, caulis exurgit oblongus, quadratus, tactu aliquantum asper, quem folia oblonga, Menthae spicatae similia, parique modo disposita, mollia, nigricantia, nonnihil rugosa, in ambitu serrata, ambiunt: flores habet in spica oblonga, galericulatas, vt in Mentha Cattaria, dilute purpurascens: quibus vascula succedunt, semen rotundum, quod tritum aromatici odoris est, vt & tota planta odorata est. Hanc & Mentha ruberosa & Nepeta angustifolia odorata nomine, accepimus.



III. *MENTHA* Cattaria minor: caulem habet cubitalem, quadrangulum, geniculatum, in multos ramos, & hos in alios, diuisum: quos folia oblonga

Mentha Cattaria minor.



acuminata, in profundas crenas veluti lacinias diuisa, odore quam in vulgari vehementiore quidē, sed suauiore, ramulorum extremis flores pallidi, vulgaris forma insident, quibus calices exigui, semen nigrum subrotundum continentes, succedunt: quod Iunio & Iulio, in horto floruit, semine Parauio ex horto Bembiano, Nepetellæ nomine misso. Hanc à Cattaria tenuifolia Clusii, quæ folia habet angusta, leuiterq; crenata, totaq; incana est, diuersam facimus, vtriusque figuram in Theatro exhibitur.

IV. *MENTHA* Cattaria minor alpina: hæc caule est pedali, anguloso, rufescente & ramoso: foliis priore quadruplo minoribus, Nepetæ vulga-

ri forma respondentibus, quasi triangulis, subcanis, serratis: floribus pallidis, galericulatis, veluti in spica dispositis & prioris similibus. Hæc in montosis circa Neapolim Italiæ prouenit, vnde semen Nepetæ alpinæ nomine, ab Imperato accepimus.

CALAMENTA vulgaris flore exiguo caules habet pedales, angulosos, lanugine asperfos, & veluti geniculatos, vnde folia bina subrotunda, attrourentia, hirsuta, sibi mutuo opposita prodeunt, ex quorum alis, maiore caulis parte, pedicelli gemini, hirsuti, efferuntur, flosculos minutos, vulgari formæ similes & colore nonnihil purpurascens, sustinentes: quibus semen exiguum nigricans succedit. Hæc in Sabaudia inter monasterium & Aymè, locis accliuibus, Iulio florens, collecta.

DE MARRUBIO.

CAPVT XIII.

I. *MARRUBIVM* palustre hirsutum tenuius laciniatum: caulem habet cubitalem, quadrangulum, leuiter hirsutum, quem folia dura, hirsuta incana & aspera, Scabiosæ montanæ calidarum regionum modo, ad costam median, in plures oblongas, angustas, acuminatas, & crenatas lacinias diuisa, ambiunt: flores parui, albicantes, ex calicibus asperiusculis prodeutes, caulem verticillatim, vt in Marrubio palustri-vulgari glabro, cingunt. Hoc locis humidioribus in Austria reperitur, vnde Sideritidis 2. Matthioli nomine, accepimus.

II. *MARRUBIVM* album villosum: cauliculos edit pedales, lignosos, rotundos, albos, villosos, in ramulos diuisos: folia sunt subrotunda, parua, crassa, per ambitum crenata, ob tomentum album inferius adpositum. Gnaphalii instar mollia superius rugosa & nigricantia: flosculi, vt in vulgari, caulem verticillatim ambiunt. Hoc in agris Luterianis collegimus.

III. *MARRUBIVM* album crispum: & hoc cauliculis est lignosis, rotundis, albis, sed foliis minoribus, crispis, crenatis, vtraq; parte cinereis, ne ita tomentosis: flosculi subcandidi in pungentibus conceptaculis caulem per interualla verticillatim ambiunt. Hoc à D. Neudorffero accepimus.

DE LAMIO.

CAPVT XIV.

I. *LAMIUM* peregrinum Scutellaria dictum: radice est vrticæ simili, flauescens, obliqua & fibrosa, à qua

à qua primo vere exurgit caulis singularis, rectus, quadratus, geniculatus, hirsutus, & cubitalis, quem folia ambiunt per genicula bina, oblonga, hirsutie leui incana & mollia, profunde incisa, obscure viridia, petiolis oblongis, hirsutis, & mollibus donata: ad quorū exortū, circa caulis mediū, vtrinque ramuli palmares prodeunt in quorū, vt & caulis summo, folia angusta, parua, acuminata, non serrata, floribus subijciuntur: flores in oblonga spica, vt in Horminio luteo dispositi, purpurei sunt, rarius albi, oblongi, Lamij modo galericulati, erecti, longa ceruice donati, aliquando bini, aliquando et simplices, ex vno pericarpio, galeam militarem imitante, producuntur: floribus delapsis, semina quatuor rotunda, dura, verrucosa, obseruantur. Hoc in Calabria, potissimum montosis copiose prouenire D. Vorstius significauit: in Campoclarensum collibus & Aequicolorum montibus syluosis, locis humentibus & saxosis D. Columna notauit. Ex horto Patavino Scutellariae nomine primo habuimus, & in Phytopinace, sub Teucrio simili Scutellaria (quia tunc summitas tantum fuerat conspecta) descripsimus: & quae vulgo in Calabria, Scutellariam dici, D. Vorstius monuerat, qui tamen ad Horminum aliquod syl. referendum putabat. At postmodum doctiss. Columna, qui medium inter Horminum & Lamium censuit, à singulari & priuata fructus, siue pericarpij forma, militaris galeae iconem exprimēte, Castidam appellauit: quia huius fructus rotundi sunt & compressi, hirsutiae crassa, asperginosa, viscosa & odora, manus inficiente, dum virent, obstiti: quorum pars anterior in acutum producit, fissuram habens oris specie, & desuper veluti in fronte limbum eleuatum sui proportionem magnum, elatum veluti diadema, aut crista obliqua, qua ornari videtur, vt in militum galeis.

DE SIDERITIDE.

CAPVT XV.

SIDERITIS folijs oblongis glabris, caules habet quadrangulos cubitales, velut geniculatos, in quorū summitate rarissimi pili conspiciuntur: folia tenuia, pallide virentia, penitus glabra, bina semper ex aduerso nascētia, quorum inferiora, tres uncias longa, vnam lata, minimeque serrata sunt: flores, forma quidem Sideritidis vulgarissimae floribus respondent, sed longiores & maiores, galeati & albi, è calicibus asperiusculis prodeuntes, ad foliorum exortum, ab imo fere ad summum caulem verticillatim ambiunt: quibus semen paruum, nigrum, in aqua

le, in vasculis plantaginis, succedit. Hanc Heidelbergae Sprengerus senior, ex horto suo misit.

II. SIDERITIS alinae trixaginis folio: hæc radicem habet paruam, fibris capillatam: caulem pedalem, quadrangulū, sub hirsutū, qui mox ad exortum in ramos dispergitur, h. q; in alios, in terrā reclinatos, quemadmodū in Alinae trixaginis folio, qua tamē multo maior est: folia habet rara, dictæ Alinae forma, per ambitum serrata, sed maiora: ad foliorum exortū, flores subcærulei, oblongi, è calicibus asperiusculis prodeunt, quibus semen paruū subrotundum succedit. Hæc circa Argentinam reperitur.

DE EUPHRASIA.

CAPVT XVI.

EUPHRASIA lutea radice squamata: radice est velut bulbosa, alba, ex quatuor crassiusculis squamis coagmentata, caule pedali, aliquando palmari, læui, cauo, & ramoso, ramulis ex alarū cauis prodeuntibus: quæ folia bina, petiolis carentia, basi sua situ aduerso cingunt, Alinae trixaginis folijs forma similia, sed acutiora, flores lutei, Euphrasiae floribus respondentes: quibus succedit semen nigrum, rotundum, in apicem exiguum desinens, quod geminum paruo petiolo insidet. Hæc montosis asperis & humidis gaudet: hancque primum an. 1606. ex Bienensium Helueticorū alpibus habuimus: dein, non longe ab Einsidlen: tum, ex Pyrenæis: tandem D. Burserus ex superiore Austria, ex *Blankenstern* prope oppidum Hallstadt natam, transmisit.

II. EUPHRASIA purpurea minor: radicem habet lignosam, paruam, nigricantē, in tenues fibras diuisam: caulem palmarem (altiores non vidimus sed minorem duarum triumve unciarum) quadratum, rubentē, leuiter hirsutū, aliquando simplicē, aliquando statim ad exortū in duos, rarius plures, paruos ramulos diuisum, quem folia pauca, crassa, hirsuta, rotunda fere & bina, in crenas profundas, inferiora quidem quæ minora, in ternas, superiora v. in quinas senasve diuisa, sua basi cingunt: flores è foliorum sinu, aliquando à medio caule, aliquando tanquā ex spica comaue, ex vtriculis, velut oblongo calice, prodeunt bini, galericulati, purpurascētes (candidos aliqui notarunt) quibus semen oblongū, angulosum, candicās, in vtriculis succedit. Hæc in pratis collium Italiae frequens est, ita vt quibusdam locis, tapetem purpureum humum ornare videatur: hæc in via Romana, etiam Romæ in monte Testaceo prouenit: passim etiam in Castilia, et xime circa Escorial, reperitur. Amara est, & me-

nente

nente doctissimo Columna à pharmacopæis pro Euphrasia altera Matthioli usurpatur. Hanc cum primum collegissemus, Brunellam Italicam nominavimus, hocque nomine ante viginti quatuor annos in Phytopinace descripsimus: Vlyses Aldroandus, Euphrasie speciem, ostendenti nominavit: & Columna, Eufragium tertiam siue mediam vocat.

DE MELAMPTRO.

CAPVT XVII.

Scrophularia flore luteo.



MELAMPYRVM luteum linariae folio; radice est candida, fibrosa, caule pedali, rotundo, atrorubente, in ramos plures palmo minores, matremq; superantes, non tamen aequali & contrario situ positos, diuiso; folia sunt oblonga, linariae fo-

lijs angustiora, ex quorum sinu folia alia breuiora & angustiora prodeunt: in caulis summo, spica oblonga, ex pinnatis cristatisve & ob crenas exasperatis ac subrotundis folijs composita, vnde flores pallide lutei, oblongi, concaui, hiantes, antrorsum exporrecti, prodeunt: semen in siliquis foliaceis oblongum, nigricans continetur. In syluis nostris montosis, & in Mureto monte, Maio Iunioq; florens reperitur. Linopyron forte dici posset.

DE SCROPHULARIA.

CAPVT XVIII.

I. SCROPHULARIA flore luteo: ex radice crassa, nigra, fibrosa scrophulis carente, caules plures exurgunt cubitales & sesquicubitales, quadranguli, subrubentes, leuiter hirsuti, mollive lanugine pubescentes. Ceteris: folia habet ad radicem per terram sparsa, vncias quinque; vel sex longa, similiterque lata, subrotunda, ob pilos breuissimos asperfos, mollia, longissimis pediculis donata, & profunde crenata: at quæ caulem cingunt minora sunt, binis semper ex opposito respondentibus: ex foliorum sinibus, ab imo fere ad summum, vtrinque prodit pediculus vnus, vncias tres longus, laevis & nudus, qui in alios breuiiores subdividitur, vno alterove breui folio diuisioni subiecto: his, quasi corymbi plures insidet, ex quibus singularis flos orbiculatus, luteus, in breues lacinias diuisus, vna cum staminibus aliquot oblongis prodit: capitula subrotunda, Scrophulariae vulgaris maiora acuminata succedunt, quorum acumini filamentum capreoli instar insidet, & hic semina minuta nigra includuntur; Maio & Iunio floruit, semen Autumno maturuit. Hanc à D. Doldio primum accepimus, & velut indictam censentes, breuiter in Phytopinace, & Matthiolo, figura addita, descripsimus: nunc vero plenius, cum eam annis aliquot in horto coluerimus: quam postmodum doctiss. Columna Scrophulariae montanae maximè nomine descripsit & in valle Campoclarensum atq; etiam supra Matesium vmbrosis Septentrionalibus niuosis inuenit, & à C. Clusio in Pannonicis, pro Lamio Pannonico descriptum censet: sane, notæ aliquot à Clusio Lamio suo Pannonico 2. exotico tributæ, nostræ cōueniunt: non desunt tamen, quæ in nostra obseruare non est (vt nec figura cum nostra conuenit)

nisi

LIBER SEXTVS.

113

nisi forte cultura, varietatem hanc caufarit, quamvis & ipse solum in horto obseruari.

II. SCROPHULARIA foliis laciniatis: hæc caule est crasso, striato, subrubente, & læui: foliis atrourentibus, læuibus, tenuibus, longis pediculis donatis, inferiorib. palmaribus, instar foliorū Raphani, in lacinias quinq; oblongas crenatas diuisis, ex quorum sinibus folia minora, etiam laciniata prodeunt: at folia in caulis summitate non vidimus: flore est magno, elegantissimo, croceo inferiore parte galere, intrinsecus rubro: plura nō licet, quia solum ramum, nomine Scrophulariæ Hispanicæ non scriptæ, à D. Gillenio Castellis accepimus: An forte Scrophularia Indica, cuius capitula quadruplo maiore esse, quam in vulgari, in Phytopinace monuimus.

DE PSEVDOSTACHYDE.

CAPVT XIX.

I. PSEVDOSTACHYS Cretica: è radice lignosa, caules quadrati, cubitales, tomento albo vestiti exeunt: folia cinericea, molliter hirsuta, oblonga, quæ ad radicem vna cū pediculo oblongo palmum superant, latitudine vnciam non æquantia, pene inodora, vel saltē odore aliis suauiores, quæ floribus subiciuntur & caulem ambiunt, breuia sunt & angusta, pediculis tarentia, è singulis articulis bina sibi mutuo opposita, duriuscula: flores purpurei, ex verticillis aculeatis caulem cingentibus, prodeunt: semen rotundum est & nigricans. Hæc pro Marrubio Cretico lata fuit.

II. PSEVDOSTACHYS alpina: à radice dura, rufescente, in fibras crassas & longas diuisa, folia plura, hirsuta prodeunt, Horminō similia, sed tenuiora, vncias tres lata, quatuor longa, longis pediculis, molli lanugine albicantibus, donata, per ambitum crenata: nonnihil odorem grauem spirantia, inter quæ caules sesquicubitales, quadranguli, camulati, geniculis distincti & hirsuti, efferuntur, qui foliis rugosis, asperis, prioribus longioribus circumdantur: ad quorum exortum, sæpe vtrinq; ramulus vnus semipalmaris, etiam palmaris egreditur: flores circa summa genicula verticillati, galericulari, ex albo rubentes, ex vtriculis asperiusculis, in quibus semen rotundum nigrū continetur, prodeunt. Hanc Iulio mense florentem in altissimo monte Wasserfall dicto, aliquoties obseruauimus.

Eandem, cubitos duos superantem, foliis multo maioribus, minime graui odore molestant (quæ culturæ adscribimus) Marrubii nomine, ex horto Friderici Meyeri Argentina accepimus.

DE SALVIA.

CAPVT XX.

I. SALVIA folio serrato: hæc à vulgari foliis potissimum differt, quæ in hac latiora, rotundiora, tenuiora, manifestis per marginem serris donata, & suauiori odore prædita: quædam etiam vncias quatuor longa, tres vero lata: in reliquis cum vulgari conuenit: hanc D. Cargillus ex Anglia misit.

II. SALVIA folio subrotundo: hæc caule est etiam quadrato, villosa, foliis rotundis, ad Violariæ, vel Aristolochiæ rotundæ folia arcedentibus, at in acumen finientibus, scabris, vulgari magis candidantibus, & tenuibus: quam Schmalcaldio à phar-macopzo accepimus.

III. SALVIA lanuginosa angustifolia: caule est rotundo, crasso, lignoso, ob candidam lanuginem, molli, cubitali, ramoso: foliis candidis, angustis, breuibus, semunciam latis, duas longis, densis & scabris, odore Tanacetii: floribus in caulis summo quasi in spica, Lamii floribus similibus, purpurascentibus, è quorum medio stamina oblonga efferuntur: hanc D. Neudorfferus communicauit.

DE SCORODOTI.

CAPVT XXI.

SCORODOTIS Cretica: radicem habet magnam sperennem, caulem quadrangulum, striatum, villosum: folia per terram in orbem sparsa, alba sunt, tomentosa, subrotunda, rugosa, crassa, Mentastro similia, per ambitum serrata: flores verticillati, pallidi, Stachydis forma, quibus vascula, semen nigrum, rotundum, includentia, succedunt. Hanc ab Honorio Belli ex Creta, vna cum seminibus Scorodoniz Creticæ nomine accepimus: & sub Stachyde Cretica in Phytopinace descripsimus: sed cum in horto ex semine enatam diligenter perpendissemus, & in virente, vtm Scordio, Allii odorem notassemus, ad Scordotim Plinii accedere censuimus: cuius nomine in Creta, apud

P

quos

quos ubiq; inter saxa, secus vias, & ad agrorum margines prouenit, Sepalsarij pro Scordio promiscue vtuntur, monente Bello, & Pona in suo Baldoreferente.

DE HORMINO.

CAPVT XXII.

Horminum Syriacum.



HORMINVM Syriacum: planta est Sclæreæ forma, caulibus cubitū superantibus, quadrangulis, leuissime hirsutis, in alas diuisis: folijs inferioribus palmum longis, latis, subasperis, sinuosis, superioribus angustis, oblongis leuioribus: flores albi sunt, galericulati, florum Sclæreæ forma: semē vasculis inclusum, paruum est & compressum, rubris costis donatum, cinereum, nigris lineis sine ordine conspersum, quod sub lingua vt Ocymi semen lentescit, & in odorum est. At planta, quæ facili ex semine nascitur, cum flores producit, odore quam Colicodouis gratiores est, & Ocymum non-

nihil æmulatur. Huius semen Bisarmar nomine D. Bernhardus Paludanus, cum Patavium ex Syria anno 1578. rediisset, communicauit. Bisennas Camerarius in suo horto nominauit: at sunt qui Aman quoq; vocitent.

II. HORMINVM angustifolium laciniatum: caule est quadrato, pedali, hirsuto, rarius ramoso: folijs paucis, nonnihil hirsutis, pollicem latis, vncias tres longis, aliquando sinuosis, aliquando, potissimum inferioribus, in profundas lacinias diuisis: floribus albis, paruis, verticillatim caulem ambiens, spicam oblongam & inflexam efformantibus, quibus decidentibus semen nigrum succedit. Hoc Montepessuli, folijs Scolopendriæ modo diuisis, legimus: at Helmstadio, Hermini Cretici albi nomine, D. Sigfridus misit.

III. HORMINVM minus album Betonicæ facies: ex radice lignosa, fibrosa, nigricante, cauliculus vnus, aliquando geminus, palmū minor, rotundus, villosus oritur: folijs est paucis, ad radicem rotundis, crassis, lanuginosis, crenatis & longis pediculis donatis: in caulis medio bina, Betonicæ folijs æmula, sed crassiora & breuiora, basi caulem ambiens, & capitulo duo minima subiiciuntur: flores sunt albi, Betonicæ forma velut in spica congesti: In montibus Pyrenæis Hispaniam versus, D. Bursarius legi.

DE VERBASCO.

CAPVT XXIII.

VERBASCVM folijs rotundis flore blattariæ: caulibus est cubitalibus, viridibus, rotundis, striatis, leuiter villosis, nec ramosis: folijs inferioribus oblongis, reliquis omnibus subrotundis, paruis, caulem basi sua alternatim amplexantibus, inferne incanis, superne nigricantibus, ad quorum fere singulorum exortum, duo minora adijciuntur, ex quorum sinu pediculi, vnus, duo, tres, rarius quatuor, prodeunt, quibus singulis, flos vnicus, luteus, paruus, ex quinque folijs compositus insidet, cuius medio, stamina aliquot purpurea, quasi ex caliculo, vt in Blattaria, emergentia insident: huius vasculum, semen miratum, rotundum continens.

succedit. Hoc in horto Ioh. Haintzmanni.

Pharmacopæi nostri defuncti creuit.

DE ÆTHIOPIDE.

CAPVT XXIV.

ÆTHIOPIS laciniato folio: hæc folijs est pedem longis, vncias quinq; vel sex latis, in acumen desinentibus, mollibus, alba lanugine pubescentibus, in multas lacinias profundas, acutas, easq; crenatas diuisis, per terram sparsis: caule quadrangulo, lanuginoso, in ramulos distributo: quem folia parua basi sua complectuntur: flores candidi, per intervalla ordine digesti, Lamij floribus forma & magnitudine similes: semen rotundum, nigrum, geminum, in pericarpio continetur: ante plures annos in horto coluimus.

DE SANICVLA MONTANA.

CAPVT XXV.

I. SANICVLA montana minor: radice est crassiuscula, multis fibris capillaribus donata, & à lateribus propagines agente, folijs per terram sparsis ex rotunditate oblongis per ambitum incisis, aliquantulum hirsutis: inter quæ cauliculi (sæpius vnus) semipalmares, etiam minores, rarius altiores, nullis, vel certe paucis pilis cincti, in summitate in exiguos ramulos diuisi: singulis ramis flosculi albi, quinquefolij, punctati, staminibus in medio insident: quibus capitulum, exiguo nigroque semine plenum, succedit. Variat: nam vel folia magna, subrotunda, vel parua & oblonga existunt: in Hel-

uetiorum alpibus provenit. An apud Clusium, Sanicula montana alterius speciei secunda?

II. SANICVLA alpina minima pilosa: plantula est duarum circiter vnciarum, radiculam habens exiguam, ramulos vnciales: per terram sparsos, foliola breuia, angusta, incana, nonnulla pilosa, plura, stellata in modum disposita: flosculi sunt oblongi, lutei, pro ratione plantæ magni, qui singuli singulis pedicellis, minutissimis, & fimbriato obtusiore calice prodeuntes, insident. Hæc in summitate Ventosi montis & Pyrenæis reperitur.

DE DIGITALI.

CAPVT XXVI.

DIGITALIS angustifolia luteo paruo flore: huic folia sunt angusta, vnciam lata, binas ternasve longa, vtraque parte virore splendentia: caulem habet simplicem, cubitalem, rectum, rotundum, læuem, à medio sursum versus floribus compluribus ornatum, qui ab vna caulis parte supra se invicem dispositi, deorsum pendent, lutei, oblongi, concaui, forma Campanulam, vel Dactyliothecæ, referentes, ore diuiso, per margines hirsuto, staminibus intus luteis: quos vascula rotunda, in pilum desinentia, semen exiguum continentia, succedunt: hæc in monte Baldo provenit, & an ad

Ephemerum Dioscoridis referri possit, considerandum.

LIBER SEPTIMVS.

DE LYSIMACHIA.

CAPVT I.

I. *LYSIMACHIA* hirsuta filiquosa paruo flore: hæc duplex est, maior & minor. Maior caule est bicubitali, rotundo, hirsuto, concauo, in ramos brachiato: folijs oblongis, angustis, leniter crenatis, hirsutis, lanugine incanis & mollibus: in summis virgis, filiquæ, strictissimæ & longæ; quarum extremitatibus flores purpurei, parui & quadrifolij insident: at in ipsis filiquis, semina exigua, subrufa, candida, lanugine implicita, continentur. Apud nos in arenosis ad Wieselam, æstate floret.

II. Minor, ex radice tenui, fibrosa, caulem vnum vel alterum, pedalem, lanuginosum protrudit, foliaq; caulis, foliorum & filiquarum breuitate, à priore differt: quam & in Italia legimus.

III. *LYSIMACHIA* Chamænerion dicta alpina: ex radice fibrosa, cauliculi rotundi, superne albicantes, palmares, nonnunquam pedales exurgunt, folijs duplicibus cincti: alijs Rorismarini forma, sed breuioribus & angustioribus, nullo ordine dispositis: alijs breuissimis, ijsque vel prædictis interiectis, vel ex eorum sinu prodeuntibus: cauliculorum summis, flores, longis pedicellis subcæruleis, vel candicantibus insident, elegantes, purpureo cærulei, vel albo cærulei, quadrifolij, satis magni, quibus foliola quatuor breuia & viridia, subiiciuntur, & ex eorum medio stamina aliquot exurgunt: filiquæ longæ, angustæ, semen minutum cum lanugine continentes, succedunt. In alpihus Helueticorum prouenit.

DE VERONICA.

CAPVT II.

I. *VERONICA* alpina bellidis folio hirsuta: radice est per terram transversum repente, fibris

oblongis nigricantibus donata: cauliculo semipalmari, vel paulo altiore, tenui, hirsuto, duro, flexili, reclinato: cuius folia ad radicem plura, Bellidis cærulea folijs formæ respondent, parua, subrotunda, atrouirentia, hirsuta & crassa, in cauliculo pauca, binis: ex opposito sitis: cauliculorum summitatibus flosculi aliquot cærulei, quasi in umbella, ex paruis hirsutis caliculis prodeuntes, quaternis, quinifve foliolis & staminulis binis cum stylo compositi, insident: semen vero in vasculis breuibus compressis, ex medio veluti umbone stylo prodeunte, continetur: Hanc in Helueticorum alpihus reperimus.

Eandem, sed minorem, sine nomine, F. Greg. de Regio Capuccinus, ex montibus Tyrolensibus, vt & D. Burserus maiorem, ex Pyrenæis, misit.

DE TEVCRIO.

CAPVT III.

TEVCRIVM alpinum in odorum magno flore: radice alba, oblonga & capillacæa, per terræ superficiem repit: cauliculos aliquot habet, lignosos, rufescentes, hirsutos, nonnunquam in alas diuisos, semipalmares & in terram reclinatos, folijs subrotundis, paruis, quorum maximum, ne minimi digiti vnguem adæquat, hirsutis, rugosis, & crenatis, folijs saluæ syluestris superioribus formæ respondentibus, cinctos: in cauliculorum summitatibus, flores quasi in spicam congesti, qui magni, purpureo cærulei, galericulati: semen non vidimus. Ex monte maiore S. Bernhardi, & Augusta valle Helueticorum, D. Burserus attulit.

Chamædrys spinosa.



DE CHAMÆDRI.

CAPVT IV.

I. CHAMÆDrys spinosa: planta est palmaris & scæpæ palmaris, rarissime cubitalis, molli lanugine incana & hirsuta: cauliculis quadratis, geniculatis, virgultis hinc inde spatis: folijs oblongis, subrotundis, aliquibus laciniatis, at plerisque leuiter serratis, summis tamen integris: flores ex caliculis lanuginosis, Chamædryos forma, ex flauo rufescentes, ex foliorum alis prodeunt, vnde & aculei bini, aliquando plures, modo breuiiores, modo longiores, exurgunt: aliquando ex geniculis vnum virgultum prodit, cuius summitati spina subtilissima insidet: semen rotundum, subnigrum, caliculis inclusum, floribus succedit. Parauio ex horto Bem-

biano accepimus, in Phytopinace & Matthiolo descripsimus.

II. CHAMÆDrys Austriaca folijs tenuissime laciniatis: caule est lignoso, rotundo, hispido, pedali, in ramos brachiato, folijs nonnihil pilosis & rigidiusculis, in angustas lacinias diuisis: floribus subcæruleis, in spica oblonga dispositis, quos capitula subrotunda, bifida, seminum minutissimorum conceptacula, sequuntur. Ex Austria D. Agerius attulit.

III. CHAMÆDrys Hispanica, folijs tenuissime diuisis: hæc caule est priore multo teneriore, rotundo, leuiter piloso, geniculis pluribus distincto: folijs breuioribus angustiusque diuisis, & ad singula caulis genicula, iunctis, at cauliculus in tenuissimorum & paruorum foliorum quasi cespitem absumitur, & ad summum geniculum, in duos pedicellos triunciales, folijs nudos, diuiditur: quibus flosculi parui, stylo oblongo donati, insident: plura non licet: ex Hispania D. Albinus attulit.

IV. CHAMÆDrys alpina minima hirsuta: ex radícula capillacea, ramulus tenuissimus (modo bini ternive) duarum triumve ad summum vnciarum, prodit: foliola ad radicem exigua, subrotunda, hirsuta, crenata & crassiuscula, in ramulis nullis, qui in pedicellos absumuntur, hiq; singuli flosculum cæruleum sustinent: ex cuius medio stylus muscæ proboscidi fere similis, prominet: valcula exigua plana & compressa, vt in Chamædry sylvestri, floribus succedunt. In iugis alpium Helueticarum & Tyrolensium, vt & Baldi summitatibus reperitur.

V. CHAMÆDrys spuria minor angustifolia: hæc radice est nigricante, lignosa & fibrosa: ramulis plurimis in terram reflexis, palmaribus, rotundis, rufescentibus, nonnihil pilosis, rigidis, duris, & in ramulos plures subdiuisis: folijs ad radicem nonnunquam oblongis, latiusculis, obtusis minime crenatis: reliquis vero ad cauliculos, breuibibus, angustis, crenatis & in apicem desinentibus: flores habet copiosos, in spica oblonga dispositos, modo pallide cæruleos, modo carneos, quadrifolios, staminulis & stylo donatos: quibus vt sylvestri, semen minutum in paruis thecis succedit. Æstate floret in agris nostris siccioribus & incultis, copiose

circa Balneum Bruglingen
occurrit.

DE ALSINE.

CAPVT V.

I. ALSINE palustris minor serpillifolia: radicula habet paruatam, capillarem, cauliculum nodosum reflexum: à quo fibræ exiguæ vt in Serpillo prodeutes, terre figuntur: hic in cauliculos plures, oblongos, repentes, diuisus, folijs Serpilli forma, sed multo minoribus, & quidem binis contrario situ vestiuntur: foliorum alis parui flosculi insident, quibus vasculum vtrinque vnum, eo quo in Glauce modo, semen minutum continens, succedit. Hæc locis palustribus prouenit.

II. ALSINE palustris minor folio oblongo: & hæc radice est tenui, oblonga, capillaceis fibris prædita, cauliculis frequentibus, tenuibus, humi fusis, & sabinde ad internodia fibris sese firmitantibus: folijs oblongis, angustis, pallidis, binis ex aduerso nascentibus: flosculis paruis, racemi modo iunctis & tenuissimis pedicellis insidentibus, quibus semine minutum succedit. Hanc Portulacæ aquaticæ nomine, D. Sigfridus Helmstadio misit.

III. ALSINE alpina glabra: ex radice albida, oblonga, fibris capillata, cauliculi plures, iiq; palmares, tenues, laues, rotundi & geniculati, in ramulos aliquot, hique in alios diuisi, prodeunt: qui folijs pallide virentibus, Lini forma, sed breuioribus & acutis, binis ex aduerso sitis, cinguntur: flores plures albi, staminibus aliquot donati, pedicellis insidentes, ex caliculis prodeunt, capitulis minuto semine refertis, succedentibus Hæc locis saxosis humidis gaudet, quæ copiose circa balneum Sultzbergense in Marchionatu superiore obseruauimus: verum ex Rhetorum alpibus monte Spliegel, radice lignosiore, totaq; planta omnibus partibus minore & semipalmari, habemus.

IV. ALSINE alpina iuncea folio: planta est ad palmi altitudinem accedens, cuius cauliculus statim à radice in duos, hique in alios ramulos breuiorres diuiduntur, inter quos vnus vel alter semipalmaris, exurgit, in summitate florum vnum sustinens, velis vno altero ve pediculo donatur, & cuilibet vnus, isq; albus, quinquefolius, satis magnus, ex calice prodiens, insidet: folijs est capillaceis, viridibus, rigidis & inordinate dispositis. Hæc Iulio florens, in Helueticis & Geneuensium montibus reperitur.

V. ALSINE minor Androsaces alterius Matthioli facie: radiculam habet oblongam, tenuem, rufescentem, circa quam foliola multa per terram sparsa, parua, oblonga, oris crenatis, inter quæ cauliculi plures, nudi, nonnihil pilosi, inæquales, duas, tres, etiam quatuor uncias alti, summo fastigio quasi umbella, ex octo, decem, duodecim pedicellis composita, insidet: quorum singuli flosculum paruum album ex pericarpio prodeuntem, sustinent. In arenosis prouenit, prope pagum Warfersen quarto ab vrbe Herbipoli miliari, D. Burserus, collegit.

VI. ALSINE verna Androsaces capitulis: plantula est subhirsuta unciarum trium, ad cuius radiculam simplicem & breuem, foliola Bursæ pastoris minimæ loculo oblongo, dictæ, similima, orbiculatim per terram sparsa sunt: ramulos habet tenuissimos, biunciales, nudos, reflexos, circa quorum medium quasi corolla quinque; minutissimorum foliolorum, vnde pedicelli quaterni, aut plures emergunt, & singuli caliculum exiguum, quinque; apicibus donatum, è cuius medietullo flosculus paruum albus emergit: hæc planitieci Northusana alumna, D. Furero monente.

VII. ALSINE alpina minima glabra: plantula est flosculis elegantissimis placens, ex cuius radice rufescente, in fibras oblongas abeunte cauliculi plures in terram reclinati, foliolis multis prioribus similibus, sed glabris vestiti, prodeunt, ex quibus pedicelli unciales, rarius triunciales, nudi efferuntur, qui in summo in duos, tres, & plures petiolos diuiduntur, & singuli flosculum elegantem, stellatum, quadrifolium, punctulis insignitum, album vel etiam purpurascens, ex caliculo emergentem, sustinent. In Helueticorum montibus vt monte Fracto & ad Thermas Fabarias, æstate florens, reperitur.

VIII. ALSINE nodosa Germanica: ad radicem fibrosam, albam, folia plura, oblongiuscula; pilotenuiora & viridia, aliquando velut cespitem constituentia: cauliculi tenuissimi sunt, glabri, modo erecti, modo reclinati: aliquando palmares, nonnunquam vix duarum, triumve unciarum, geniculati, vel nodosi: ad quemlibet nodum, foliola exigua, vnde & ramuli prodeunt, in quorum summitatibus flosculi plures, albi, quinquefolij, ab alijs quinquefoliis viridibus sustentati, singuli singulis pedicellis insident. Hæc cum in arenosis proueniat, ab aliquibus Arenaria vocatur, quo nomine etiam ex Scotia, D. Cargillus: ex Lusatia, sine nomine, D. Francus misit.

IX. AL-

IX. ALSINE Spergule facie, siue Spergula minor subcæruleo flosculo: radice nititur oblonga, simplici, parum capillata & albicante: cauliculis est multis, vncias tres quatuorve longis, in terram reflexis, geniculatis: geniculis singulis, bina foliola breuia, incana, lata basi vndiq; cingentia, adponuntur: ex quorum sinu folia alia oblonga, angusta, viridia, incerto numero prodeunt, vt & pedicelli, quibus singulis, singuli flores subcærulei, vel purpureocærulei, aliquando striati, insident: quibus, vt in Spergula, vascula orbiculata minutum semen continentia, succedunt. Apud nos ad semitas reperitur, maxime inter nouam domum & arcem Ottingen.

DE ANAGALLIDE.

CAPVT VI.

ANAGALLIS aquatica angustifolia scutellata: radicem habet rutam, per terram repentem & fibrosam: caules cubitales, striatos, læues, geniculatos: folia ad singula genicula semper bina, pediculis carentia, situ aduerso sita, angustissima, acuminata, duas tresve vncias lata: ex foliorum pene omnium sinu, pediculi prodeunt palmares, etiam breuiores, sursum spectantes & capreolorum modo se intorquentes, quibus vtrinq; pedicelli, alij absq; ordine adpositi, qui flosculos paruos Alsine forma trifolios ex albo purpurascens sustinent: his thecæ siue scutellæ geminæ, ex quarum medio filamentum prodit, semen continentes, succedunt. In locis paludosis & fossulis Heluetiæ, Lusatiæ: sic circa Francofurtum ad Oderam, Viennam quoq; reperitur.

DE ECHIO:

CAPVT VII.

ECHIVM Hispanicum flore calcari donato: radicem habet lignosam, fibrosam, cortice ad-

rufum vergente tectam, à qua cauliculi plures, alij palmares, alij breuiores, rotundi, nonnihil villosi humum versus reclinati prodeunt, qui folijs rarioribus, breuibus Veronicæ alpinæ similib. crassiusculis & asperiusculis cinguntur: flores in cauliculorum summis cærulei, oblongi, caui, calcare vt Linaria donati ex hirsuto breuiq; calice prodeunt, ex vno folio compositi, at in summitate in lacinias quaternas diuisi, quibus delapsis in conceptaculis semen oblongiusculum, durum, rugosum, vt in Echio vulgari, succedit. Hoc in Granadæ montibus, D. Albinus collegit.

II. ECHIVM S. orpibides minus flosculis luteis: hoc cauliculis est tenuibus, reflexis, hirsutis & semipalmaribus, folijs paucis & quidem inferioribus oblongis, longoq; pediculo donatis, pilosis: cauliculorum fastigia, vna cum florum rudimentis, caudæ scorpionum instar recurvantur, hisq; sensim sese explicantibus: flosculi exigui, lutei, aureive, quinquefolij, sese offerunt. Monspelii in muris humidis horti Dei, D. Burserus legit.

DE CYNOGLOSSO.

CAPVT VIII.

CYNOGLOSSVM semperuirens: caulem habet cingulem, striatum, leui hirsutis asperum, cauum, cubitoq; altiore: folia, quæ non incana, sed semper atrouirentia, acuminata, palmu longa, vnciam vel sesquiunciam lata, parte superna læuia, inferiore aspera, neruo satis crasso, per longitudinæ æqualiter delato, basi caulem ambiunt: & ex eorum alis, rami palmares, et longiores exurgunt, quorum summum fastigium Heliotropii maioris instar reflectitur & sustinet flores, forma vulgaris similes, sed minores & rubentes, staminulis donatos: quibus lappulæ vulgaris similes, semen, ex quo deciduo se propagat, continentes, succedunt. Tota planta canitie siue albedine & odore graui (quæ in vulgari) destituitur: Aprili & Maio floret: in montibus ymbrosis Alsatiæ Lotharingiam versus, vt circa Rapperswilam & circa Masmunster frater p. m. Ioh. Bauhinus reperit, in hortum Montembelgardiacum ante annos 26. transtulit.

*Consolida media alpina.**Bellis alpina maior rigido folio.*

DE CONSOLIDA MEDIA.

CAPVT X.

CONSOLIDA media alpina: radice est fibrosa, caule pedali, quadrato, striato, leuiter hirsuto, inani: foliis paucis, oblongis, longoque pediculo donatis, angustis, crassis, asperis, per ambitum crenatis, binis caulem ambientibus, & ex aduerso respondentibus: flores cærulei veluti in spica, caulis summo insident: in Baldo monte Italia reperitur.



DE BELLIDE.

CAPVT XI.

I. BELLIS alpina maior rigido folio: ex radice nigra, repente, ab vna parte fibras spargente, & lignosa, caulis rotundus, striatus, cubito altior exurgit, circa quem folia pediculis carentia, quinque vel sex uncias longa, vix unciam lata, rigida, partim obtusa, partim ex rotunditate acuminata, per circumferentiam profunde crenata; nulloque ordine disposita: in caulis summo flos vnicus, Bellidis vulgaris maioris flore maior, medio luteus, folijs albis discum cingentibus, cui semen oblongum vt in vulgari, succedit: in monte Baldo prouenit.

II. BELLIS alpina minor: ex radice cauliculus vnus, vel alter, læuis, semipalmatis incuruus prodit, quem cingunt folia rigidiuscula, angusta, breuia, per

Bellis montana maior folio acuto.



per ambitum profundis & asperiusculis crenis donata: cauliculo summo, flos vnicus, magnus, disco luteo, aliquando purpurascens, folijs albis multis cincto, infidet. In alpinis Helueticorum prouenit, vt in Valesia supra Gemme, & supra Thermas Fabarias: aliquando tota plantula, vix vncias duas, superat.

III. *BELLIS montana maior folio acuto*: hæc cauliculo est Bellide prima breuiore, folijs brevioribus, duplo triplove angustioribus, leuius crenatis nec rigidis, in acumen exquisitum desinentibus flore primæ simili, sed minore: in montibus Euganeis collecta.

IV. *BELLIS montana folio obtuso crenato*, radicem habet lignosam, fibrosam, caulem vnum, tenuem læuem & pedalem, folia angusta, longissimis pediculis donata, per marginem crenata, obtusa, in tres apices desinentia: in caulis summo flos


vnicus, parvus, disco luteo & foliolis albis eam cingentibus: Monspessuli versus Vigan.

V. *Bellis maritima folijs Agerati*: plantula est palmo minor, ad cuius radicem paruam, albam, cauliculus pilis leuissimis aspersus, in binos ternosve tenuissimos ramulos diuiditur, quorum vnus sex, alij tres vncias non excedunt, ad quorum partem inferiorem, pauca & parua foliola, Agerati foliorum instar, per margines crenata, superiore & maiore cauliculorum parte, vacante; singulis vnicum florem, qui parvus, disco viridi, foliolis albis ultra viginti cincto, sustententibus. Hæc copiose in insulis Storchadibus in arenosis prouenit, vnde D. Burserus attulit.

BELLIS spinosa duplex est: alia folio Agerati, q̃ Lobelius in parte secunda aduersariorum descripsit: alia forma Bellidis cæruleæ, cuius descriptionem subiiciemus.

VI. *BELLIS spinosa flore globoso*: hæc tota fere facie Bellidem cæruleam, Globulariam dictam refert, cuius ad radicem folia plura sunt, parua, rigida, crenata, & cuilibet crenæ aculeus infidet: cauliculo est palmari atrouirente, quem folia oblonga angusta, non crenata, sed in aculeum abeuntia, inordinate basi sua vestiunt, cuius summitati capitulum rotundum, cæruleum, Globulariæ capitulo maius, multis flosculis vt in succisa hirsutum: hanc copiose, pluribus simul cespitem constituentibus, in Granadæ montibus, D. Albinus obseruauit.

VII. *BELLIS hortensis pediculo foliato*: hæc à communi hortensi in eo tantum differt, quod pediculus, qui leuiter hirsutus, foliolis oblongis, subrotundis, duobus, aut tribus longe distantibus, cingatur, & flori folia quina subiiciantur: in hortis reperitur.



Gnaphalium roseum.*Gnaphalium roseum hortense*.

DE GNAPHALIO.

CAPUT XII.

I. *GNAPHALIUM roseum*: plantula est exigua, tomentosa, incana, vix unciam superans: radícula simplici, capillacea, rufescente, cauliculo femunciali, parvis tomentosis. & conglobatis folijs donato, flosculo roseo, disco flavescente. Monspeffuli ad pedem montis Cetij & Massiliae in saxosis reperitur.



II. *GNAPHALIUM roseum hortense*: ex semine minuto, in horto provenit planta tota incana, tomento molli, radice tenui, capillacea, quatuor virciarum, ex qua aliquando plures, quandoque pauciores ramuli triunciales, reclinati, folijs subrotundis cincti, quorum summitatibus flos roseo modo expansus, disco luteo, etiam aureo, foliolis ut in ramulis undique sustentatus, elegantissimo spectaculo infidet.



Helichryson Orientale.



Helichryso syl. similis.



DE HELICHRYSO.

CAPVT XIII.

HELICHRYSO Orientale: caule est rotundo, lanuginoso, pedali, folijs oblongis, angustis, lanuginosis & ob tomentum crassis & incanis, iisque ad radicem oblongam, nigricante cortice tectam, pluribus: caulis in summo in plures pediculos vnciales, incanos diuiditur: quibus singulis flos rotundus, rarius oblongus, quasi ex plurimis squamis compositus, quintuplo quam in vulgari, quæ Stachas citrina dicitur, maior, flauus & splendens. An hæc Chrysocome Dioscoridis l. 4. c. 55. & Plin. lib. 27. c. 7. Chrysites, nostro enim corymbi auri fulgore splendent: quod Comæ aureæ primum, dein ex Creta ab Honorio Belli, Elichrysi Orientalis nomine, accepimus. Simile, sed caule cubitali, fo-

liisque latioribus, minusque lanuginosis, vmbella multo latiore floribusque minoribus & pallidioribus, Helichrysi Cretici appellatione, ex horto nobiliss. Contrareni habemus.

HELICHRYSO syluestri flore oblongo similis: caule est sesquipalmari, rotundo, lanugine candidissima vestito, in ramulos aliquot inæquales, palmo breuiiores brachiato: folijs Stachadi citrinæ alterius in odoræ similibus, latioribus ramen, aliquibus leuiter sinuatis, sesquiuncialibus, inferne incanis & tomentosis, superne virentibus: ramuli in pediculos tenues, nudos, vncias quatuor longos, abeunt, quorum summitatibus capitulum vnicum, squamosam, cum flore insidet, qui in papum breuem, vt in Elichryso syluestri angustifolio, abit. In montibus Italiæ prope Terracinum, prouenit.

DE CONYZA.

CAPVT XIV.

I. **C**ONYZA cærulea alpina maior: hæc ex radice lignosa, rufescente, caulem crassum, pilis asperum, palmarem, mox in ternos ramulos, & horum aliqui in pediculos diuisum, protrudit: circa quem folia pauca, hirsuta & aspera, crassa, vncias tres, quatuorve longa, vncia angustiora, nervis aliquot distincta: singulis pediculis flos vnicus, cæruleus, Conyza cærulea vulgari similis, & similiter in pappum euanescentes: hæc in monte S. Bernhardi prouenit.

II. **C**ONYZA cærulea alpina minor: plantula est semipalmaris; aliquando minor, lauis, rarus, nonnihil pilosa, radice nigricante, fibrosa, cauliculo rotundo, tenui, vnicum florem cæruleum, illius quidem flori forma similem, sed triplo minorem, multis apicibus donatum, & in pappum abeuntē, sustinente: foliola habet ad radicem plura, angusta, triuncialia, pediculis donata, pallide virentia; ad quæ caulem basi sua cingunt, breuiora sunt: hæc in monte Gotthardo reperitur.

III. **C**ONYZA aquatica Asteris flore aureo: caule est cubitali, rotundo, hirsuto, geniculato, in plures ramos brachiato, qui folijs tres, quatuorve vncias

longis, semunciam latis, villosis, per marginem & hispidis, & crenis rigidioribus exasperatis, cingitur: flores magni Asteris forma, aurei, singulis singulis pediculis insident, discum enim aureum folia plurima, & angustissima aurei coloris cingunt, at aliorum more in pappum auolant. Hanc in Valesia prope Sedunum ad aquas, D. Burserus legit: non tamen Conyza palustris serratifolia, quam alij consolidam palustrem vocant, censenda est.

DE ASTERE.

CAPVT XV.

ASTER hirsutus Austriacus cæruleus magno flore: caule est rotundo, hirsutie aspero, pedali, in vnum alterumve ramū brachiato, folijs latis, subrotundis, per marginem nonnihil exasperatis & in apicem rigidiores desinentibus, rigidis, crassis, hirsutie leui exasperatis & scabris, cincto: cuius summo flos magnus insidet, eiusque orbem pallidū, folia multa, tenuia, oblonga, pallide cærulea, ambiunt, qui maturus similiter in pappum abit. Hic licet in Austria circa Cremam reperiatur, attamen cum Astore montano cæruleo magno flore, qui etiam in Austriacarum alpiū iugis (imo & Heluetiarum, vt in lura) oritur, confundi non debet.

Verbenanodiflora.



DE VERBENA.

CAPVT XVI.

VERBENA nodiflora: ex radice tenui, fibris capillata; caulis tenuis, quadratus, geniculatus, glaber, in terram reflexus & sesquipalmaris, prodit, quem folia, ad geniculum bina aduerso situ, vngue non multum longiora, per extremum crenata & acuminata, cingunt: ex quolibet pene geniculo, & ramulus folijs aliquot cinctus, & pedicellus nudus, duas tresve uncias longus, exargit: hicq; capitulum subrotundum squamarum sustinet, vnde flosculi Verbenæ vulgari similes exeunt, semenq; paruum, vt in vulgari, succedit. Hanc Neapoli vna cum semine, ab Imperato accepimus.

DE SCABIOSA.

CAPVT XVII.

I. SCABIOSA peregrina rubra: ex radice annua; Caulis bicubitalis, ramosus, parte inferiore leuiter hirsutus exurgit: folia tenuia, ad radicem Rapæ forma laciniata, subrotunda, longis pediculis subhirsutis donata, & per ambitum serrata, ad ramulos superiores, oblonga, angusta & integra, pediculis pedalibus & palmaribus læuibus & maiore parte nudis, & quidem singulis flos vnicus atrorubens, Scabiosæ globulariæ maioris forma, oblongis filamentis puncto albo notatis, donatus, suauis odoris, insidet: huic capitulum oblongum, rufum, oblongis filamentis, vt in Caryophyllata vulgari exasperatum, & semen stellatum succedit. Hæc ex semine Scabiosæ Hispanicæ rubræ nomine misso (vt in Phytopinace monuimus) æstate in horto floruit: & a Clusio Scabiosa Indica nominatur.

Hanc, sed folijs in tenuiores lacinias dissectis, floreq; minore & nigro, ex horto Patauino, D. Peckius, nomine Scabiosæ nigræ odore Zibethi, attulit.

II. SCABIOSA folio Sinapi syluestris: caule est cubitali, striato, in ramos palmo longiores brachiato, qui ex foliorum alis, vbi pili paucissimi, prodeunt: folijs glabris, forma Sinapi syluestris modo, ad neruam vsque laciniatis, & sparsim crenatis, inferiorib. subrotundis: flores rubentes, mediæ magnitudinis, & singuli, cauliculorum summis insident. Neapoli ex horto Imperati habemus.



Q;

IIISca-

Scabiosa prolifera.



III. SCABIOSA prolifera folijs Gingidij: Scabiosa prolifera duplex est: altera folijs in latiores lacinias diuisis à Lobelio & Clusio proposita, cuius figura addita, de qua sermo non est. Altera folijs est tenuius incis, ad modum foliorum Gingidij, quod Vismaga dicitur: quæ caule est cubitali, viridi, striato, geniculato, folia vtrinq; ad geniculum triun-

cialia, ex quorum alis ramuli aliquot trium quatuorve vnciarum, exurgunt: at maior caulis pars, nudus & nonnihil asper est, cuius summo, flos purpureo caruleus insidet, & ad huius latera plures cauliculi modo vnciales, modo palmares & glabri, minores quidem in orbem funduntur, at maiores florem superantes eriguntur, singulis flosculum eiusdem coloris, ex filamentis compositum, sustentibus, quibus folia fœniculacea subiiciuntur: semina aliorum modo succedunt. Vtramque D. Doldius Norinberga misit: illa tamen, Patavij inter dumeta, circa Thermas D. Virginis, etiam observata.

IV. SCABIOSA montana dentis leonis folio: caule est sesquipedali, viridi, rotundo, striato, lævi & cauo, superiore parte nudo: folijs latiore basi caulem amplexantibus, paucis, lævibus, crassis, inferioribus obtusis, & parum crenatis, superioribus ad modum foliorum dentis leonis, in binas ternasve lacinias diuisis & acuminatis, per oras crenatis, vncias sex longis, & duas circa folij medium latis, per quod nervus excurrit: caulis summum, quem duo folia, fere vt in Diplaco complectuntur, flores aliquot subcerulei, pedicellis hirsutis, inæqualibus insidentes, exornant. Hæc Monspeßuli, in monte Calcaris reperitur.

V. SCABIOSA stellata minima: plantula est, trium quatuorve vnciarum, leui hirsutis canescens, radícula simplici, cauliculo vt & folijs biuncialibus, angustis, in parvas & profundas lacinias diuisis: cauliculi summo, capitulum rotundum, ex caliculis paleaceis compositum, insidet, flores subcaruleos, paruos continens, quibus exiccatis in caliculorum medio stella parva conspicitur, à qua filamenta capillacea, oblonga, rufa, quinque numero extra cauliculum producantur. Hanc in Provincia locis incultis observauimus, & à Scabiosa minore Hispanica Clusij: quam in litore Veneto notauimus, diuersam facimus.

Scabiosa argentea angustifolia.



VI. SCABIOSA argentea angustifolia: ex radice lignosa, caules bini, terni, sesquipalmes, rotundi, incani, parum reflexi, exurgunt: circa radicem folia quatuor aut quinque vnciarum longa, angusta, graminea, albicantia, & argenti colorem referentia, inordinate disposita, in superna caulis parte nulla: caulis vnicum discum orbiculatum planum, molli lanugine incanum sustinet, qui plures flores cæruleos, vel pallidos, aliarum forma continet: quibus cauliculi membranacei, etiam stellati cum staminibus, sed quam in priore brevioribus, semen continentes, succedunt. In monte Sumanio prope Vicentiam provenit.

DE IACEA.

CAPVT XVIII.

I. IACEA nigra angustifolia, vel Lithospermi aruensis, folijs: radice est nigricante, in fibras aliquot diuisa, caule pedali, rarius cubitali, rotundo, aspero, in alas inæquales diuiso: quem folia incana, angusta, breuia, rigidiuscula & aspera, Anchuse siue Lithospermi aruensis similia, alternatim sua basi cingunt: cauliculorum summis capitulū squamatum, & nonnihil asperum, aliarum lacearum forma, sed minus, insidet, ex quo flos multis exiguis, oblongis foliolis, pallide rubentibus, vel ex purpura candicantibus, prodit, cui semen exiguum, nigrum succedit. Hanc passim Monspessuli & Patavii observauimus.

2. Huic & altera similis, sed caule molli tomento vestito, & folijs incanis, mollibus & longioribus.

II. IACEA integrifolia humilis; hæc cauliculis est pedalibus, rotundis, alba lanugine hispidis & terram versus refflexis: folijs vnciam latis, duas longis, nec laciniatis, nec crenatis, sed integris, lanugine, præsertim per marginem, pubescentibus & tubas peris, basi sua cauliculum ambientibus; in cuius summo, capitulum ex multis squamis imbricatum dispositis, constans: ex quo flos laceæ vulgari similis, subpurpureus, ex foliolis oblongis, in filamenta aliquot diuisis, compositus, prodit. In Austria ad S. Hippolytum provenit, vnde laceæ Austriacæ repentis nomine, D. Burserus misit.

III. IACEA capite longis aculeis spinoso: tota planta subincana, brevibus & rigidulis pilis hirsuta: radicem habet fibris crassioribus implexam, fragilem, candidam, sed membrana subfusca recta: caulem cubito altiore, rotundum, incanum, asperum, in ramulos inæquales diuisum: folia prima & renella, pilis densioribus, albidioribus, mollioribusque stipantur, reliqua vero oblonga, vncias duas lata, crassa, rigida, per ambitum profundius crenata, nonnunquam ad pediculum laciniata, per quæ fibræ crassiores albæ, transcurrunt: caulis summitati, capitulum squamosum ex pluribus squamis, etiam triginta numero compositum, & in conum piniamulum compactum, insidet, quarum apices in spinas oblongas, rectas, subflauas & rigidas desinunt, & squamarum ora, firmis pilis albescentibus, tanquam

tanquam setis vndiq; circumdata sunt: inter quas flos multis folijs oblongis, laciniatis & candicantibus emergit, cui semen Cnico simile, sed vulgari maius, succedit. Hæc à lacea montana echinato capite Clusij diuersa est, & à D. Doldio missa fuit.

IV. IACEA laciniato Sonchi folio, siue lacea latifolia purpurea capitulo spinoso: radice est recta, fragili, fibrosa, membrana subfusca tecta, & si plures caules protrudat, brachiata, sapore subaustriusculo, ex insipido ad amariuscule tendente: caulibus vt plurimum rectis, hirsutis, breuib; densisq; villis seu lanugine, potissimum parte inferiore, refectus, qui ob capitulorum grauitatem, humum versus reflectitur, & in summo in aliquot ramulos diuiditur. Folia primum prodeuntia variant, sunt enim rotunda, oblongo pediculo donata, dein magis magisq; sinuata, tandem vero in lacinias (quæ ad exortum inferiorum minora sunt) inæquales diuiduntur: sunt etiam rigida & dura, adeo vt complicata cum quodam pene crepitu frangantur, breuissima & duriuscula lanugine, potissimum superiora & ad exortum, tecta. Cauliculorum summis capitula spinosa, ex squamis compacta, initio viridia, mox ad apicem purpurascencia, insident: ex squamis spinæ septem pulchro ordine, stellam dimidiatam referentes, exeunt, quarum media cæteris latior & longior, in minuto capitulo rubens, paulo post vero pallens. Flos ex capitulo tarde prumpit, qui elegantis purpuræ & inodorus, cuius foliola fistulæ sunt oblongæ, superius amplo & laciniato rictu præditæ, inferius angustæ, quæ ad exortum coloris albi, sed paulatim versus fastigium in rubrum sese mutante: omnes autem stamina clauata sustinent, claua ex purpureo seu violaceo prorsus nigricante, in summo alba puncta habente, & staminum pediculis, vbi ex fistula prorumpunt albis existentibus. Semen, Cyani semen refert, oblongum, angustum, & cinereum est. Hanc Centaurii marini nomine, D. Doldius misit.

Eandem sed palmo minorem, folijs paruis, rigidis, parum laciniatis, & per marginem crenis rigidis exasperatis. Cyani marini nomine, à D. Neudorffero ex Italia habemus.

V. IACEA montana incana aspera capitulis hispidis: radice est lignosa, in longas fibras diuisa & rufescente: cauliculo palmari, rotundo, lanuginoso: folijs asperis, ad radicem pluribus, incanis, hispidis, parum laciniatis, angustis, vncias quatuor longis, reliquis vero, in profundas & rigidas cre-

Iacea montana candidissima.



nas diuisis, basi; sua caulem amplexantibus, qui aliquando in ramulos diuiditur, quorum singuli capitulum paruum, ex squamis hispidis compositum, sustinent, earum enim cuspides exterius reflexæ, in tenuissima filamenta desinunt: flores vulgari similes, sed multo minores. Monspeffuli in monte Calcaris prouenit.

VI. IACEA montana incana laciniata capitulo hispido: ex radice caulis palmo maior, rotundus, molli lanugine canescens, exurgit, circa quem foliola pediculis oblongis incanis donata, laciniata & subrotunda, tactuq; mollia: capitulum paruum & priori simile, eodemq; in loco proueniens.

VII. IACEA montana candidissima Stæbe folijs: hæc ex radice crassa lignosa, caulem profert palmarem, nonnūquam cubitalem, angulosum, striatum, molli & incana lanugine vestitum: folia habet ad radicem multa per terram sparsa, palmaria, lata,

PERFOLIATA.

CAPVT XX.

lata, Stæbes instar laciniata, molli lanugine incana & superiora molli tomento, quasi farina aspersa, mollia & alba sunt: cauliculis summis flores singuli Iacæ vulgari similes insident, q̄ ex capitulis squarrosis prodeunt: in montib. prope Capuam puenit.

VIII. IACEA tomentosa capitulo spinoso: tota planta, quasi farina aspersa floret, albescit, & à radice, caulis pede minor, statim in alas plures diuisus, exurgit: folia habet breuia, angusta, in petiolaria, quina, septena, subrotunda diuisa: cauliculis, capitula parua, ex squamis multis in aculeos acutos & rufescentes abeuntibus, composita: flos non fuit conspectus: in Murena Hispaniæ, D. Albinus legit.

IX. IACEA Babylonica: ex horto clariss. Contareni, hoc nomine folium accepimus, quod primo intuitu Acanthium aliquod referre videtur: hoc longitudine cubitum æquat: in medio, latitudine palmum superat, nonnihil incanum, tactu asperum, cuius tota circumferentia veluti minimis aculeis exasperatur: ad exortum lacinias acutas trium quatuorve vnciarum longas, obtinet: hinc ex rotunditate sensim angustatur & in apicem abit, cuius summo breuissimus aculeus insidet: per ipsius mediū, costa eleuata, nonnihil hispida fertur, à qua plures nerui in latera excurrūt. Plura non licet.

TRAGOPOGON.

CAPVT XIX.

I. TRAGOPOGON folio sinuato: radice est oblonga, lacteo succo manante, caule gracili, striato, pedalis altitudinis, raris folijs alternatim septo, quæ oblonga, non multum palmo breuiora, at angusta, sinibus breuioribus, & quasi serratis exasperata, pallideq; virentia: caulis summo flos insidet pallide luteus, magnus, Tragopogo vulgari similis, ex calice magno apicibus acutis donato prodiens, quo marcido, semen oblongum, in materia villosa alba latitans, succedit: Montpessuli legim⁹.

II. TRAGOPOGON tenuissime laciniatum: radice est oblonga, crassiuscula, fibris carente, rufescente & lacte turgente: ad quam folia plura oblonga, angustissima & acuminata, & in plures angustissimas lacinias diuisa: caule est cubito non multum breuiore, rotundo, læui, striato, nonnihil folioso, in alas brachiato: singulis flos vnus, magnus & pallidus insidet, cui semen oblongum, scabrum, cristapilosa in summo præditum & calici oblongo inclusum, succedit. Et hoc Montpessuli obseruauimus.

I. PERFOLIATA alpina latifolia minor: radice est vnica, rufescente, paucissimis fibris capillata: cuius caulis gracilis, teres, glaber, cauus, cubito altior, in ramulos, quasi in vmbella dispositos distribuitur, quem folia glabra, venosa, sesquiunciam lata, Vaccariæ folijs similia basi lata medium amplectuntur: in cauliculorum fastigijs vmbellæ, vna cum foliolis exiguis, flosculis tenuibus subluteis, quibus semen oblongiusculum, nigricans, angulosum, succedit. Hæc in Helueticorum alpihus reperitur.

II. PERFOLIATA alpina angustifolia maior, siue folio anguloso: radicem habet vnicam, oblongam, rotundam, crassam, nigricante cortice tectam, minime capillatam, ex qua prodeunt folia plura, pallide virentia, glabra, pedem longa, vnciam vel sesquiunciam lata, longis pediculis donata: at folia caulem amplectentia angulosa sunt & acuminata, rarius bina, hederæ modo angulosa ex opposito sita: caulis rotundus est, teres, glaber, cauus, sesquicubitalis, quasi foliorum basin penetrans: cuius summo quina folia, lata, in orbem disposita insident, eo modo quo in Tithymalo, vnde pediculi seni, septeni, longitudine impares prodeunt, quibus vna cum folijs paruis, rotundis, flores parui ex luteo rufescentes insident: Semen nō vidimus: in Pyrenæis, non longe Narbona, D. Burserus legit.

III. PERFOLIATA alpina angustifolia media: hæc à præcedenti sola magnitudine & foliorum angustia differt, quæ pro Perfoliata longifolia Dalechapij, in historia Lugdunensi picta videtur, & ex monte Gotthardo habemus.

IV. PERFOLIATA alpina angustifolia minor: hæc radice est rufescente, ad quam folia multa, atrouirentia, graminea, semipalmaria: caulem habet vnum, aliquando geminum, pedalem, rotundum, glabrum, quem folia pauca acuminata, basi sua latiore ambiunt, in cuius summitate veluti vmbella, vt in vulgari Perfoliata, ex qua ramuli emergunt, flores rufescentes, cum seminibus sustententes. Hæc ex Sumano monte, & Valesianorum alpihus, habemus. Verum cum Perfoliata alpina gramineo folio, siue Bupleuro angustifolio alpino, quod in Baldo prouenit, confundi non debet.

V. PERFOLIATA alpina angustifolia minima: plātula

R tula

tula est semipalmaris, inter Perfoliatam & Bupleu-
ron media, radice tenui rufescente & serpente, fi-
bris capillaceis terræ affixa: ex qua folia oblonga,
angustissima, pluribus locis progerminant: inter
quæ cauliculi efferuntur tenuissimi, glabri, vncias
quatuor alti, in ramulos binos & hi in minores
quasi ex umbella minima prodeuntes, diuisi, quos
folium vnum vel alterum basi latiore cingit, &
flosculi exigui flauo insident. In summis Pyrenæo-
rum iugis reperitur.

VI. PERFOLIATA minor ramis inflexis: hæc fo-
lijs est vulgari paulo longioribus, breuioribus ta-
men quam in montana, caulem habet ramosum
reclinatum, & velut per terram sparsum, flores lu-
teos: annua est instar vulgaris siue aruensis, in quo
ab alpina differt: hanc apud Ioh. Bauhinum fra-
trem p. m. vidimus, quam ex horto Stuegardiano
habuit.

CENTAURIUM

CAPUT XXI.

Centaureum minus spicatum album.



CENTAURIUM minus spicatum album: ex radi-
ce parua, alba, fibrosa, caulis exurgit, mox in
duos palmares & semipalmares striatos, hique in
alios diuisi: folia sunt parua, pediculis carētia, quo-
rum prima lata, subrotunda, superiora angusta, ac-
cuminata, quandoq; bina aduerso situ caulem am-
plexantia: flores oblongi, albi, ab imo sursum per
caulem sparsi, singuli, vt plurimum, ex vna caulis
parte sibi inuicem succedentes, ex caliculis foliosis
prodeunt, ea forma qua non patentes in figura ex-
primuntur, patentes enim sculptor non recte ex-
pressit: his siliquæ, vt in vulgari, semen minutum
continentes, succedunt. In montibus Euganeis
Patauinorum, & hinc inde circa Monspelium re-
peritur, vt in nostro Matthiolo monuimus.

ASCYRON ET HYPERICUM.

CAPUT XXII.

ASCYRON magno flore: hoc Ascyron vulgari, si-
ue Hyperico dumetorum simile, caule sesqui-
cubitali, rotundo, glabro, rufescente, quem folia
pallide virentia & inferne albidiora, vnciam lon-
ga, semunciam lata, subrotunda, bina semper situ
aduerso cingunt: in caulis summo, flores calice vi-
ridi sustentati, pallide lutei, magni, quintuplo vul-
gari maiores, ex quinque folijs, vncialibus compo-
siti, & quorum vmbilico staminula plura, flaua, vel-
ut puncto notata, exurgunt: siliquas & semina non
vidimus. In Pyrenæis D. Burserus hoc, quem ad-
modum & subsequens, legit.

HYPERICUM numulariæ folio: radice[m] habet
oblongam, tenuem, paucis fibellis capillatam, ex
qua cauliculi tenues, rufescentes, palmares effe-
runtur, quos folia parua, rotunda, nummo similia,
bina aduerso situ & æquali distantia locata cin-
gunt, quæ superne atrouirentia, inferius alba, ali-
quando punctis vel maculis rubris notata, conspi-
ciuntur: cauliculorum summis flores pallide lutei
satis magni, plurimis staminulis donati,
insident.

LIBER SEPTIMVS.

POLYGONVM.

CAPVT XXIII.

I. POLYGONVM saxatile: huius radix tenuis, lignosa tamen, fibris capillata & alba est: ramulis multis oblongis & crebro geniculatis serpit: circa quos folia subrotunda, vnciam longa, semunciam lata, superne virentia, at inferius albicantia, quasi polline aspersa, quæ sensim minora redduntur: geniculis flosculi exigui, vt in vulgari, pallide rubentes exeunt, quos semina triangularia sequuntur. Hoc inter saxorum fissuras, ad arcium editissimarum radices, vt in petris arcis Waldenburgensis Basileensium, & in vicinis, obseruauimus.

II. POLYGONVM Creticum thymi folio: herba est supina, humique procumbens, cauliculis siue viticulis, palmaribus, ramosis, hinc inde sparsis: flosculis paruis albicantibus, pluribus simul quasi in nodo iunctis, quibus foliolum Thymi forma, modo vnum, modo bina, ternave, magnitudine imparia adponuntur: semen pusillum ac copiosum succedit. Hoc Polygoni Cretici nomine, D. Gillemius misit.

III. POLYGONVM littoreum minus flosculis spadiceo albicantibus: ex radícula candicante, tenui, oblongiuscula, prodeunt viticuli plurimi, tenerissimi, per terram sparsi, ramosi & dodrantes, foliolis oblongis, angustis, & albicantibus alternatim cincti, ad radicem vero longioribus & biancialibus: viticulorum summitatibus flosculi plures minutissimi, intus albi, foris spadicei insident, quibus semina minutissima & copiosissima, vt singuli coliculi eo turgeant, succedunt: hinc ad Millegranum referri potest. Hoc apud nos, in arenosis ad Wiefam flumen, autumnò florens reperitur, quod Polygoni *ποικιλον* nomine, Northusio, apud quos in sabulosis reperitur, D. Fuxerus misit: idem, sed sine nomine, ex inferiore Lusatia, vbi locis arenosis, in ripa fluminis Nissa provenit, à D. Franco accepimus.

IV. POLYGONVM minus lentifolium: plantula est tota virens, parua, supina, humiq; procumbens: ex cuius radice simplici, in altum descendente, cauliculi plures, impares longitudine, crebris internodijs geniculati, exiguis folijs subrotundis, lenticularibus adnatis, prodeunt: flosculi in cauliculorū

summis minimi, albicantes, vel pallide virentes plures simul iuncti & semen pusillum, obseruatur.

Cum Anthyllide Valentina Clusij, quæ tota subrubens est, longe minoribus folijs, & copiosioribus flosculis ex albo purpurascens, ij; q; non solum in cauliculorū summis sitis, confundi nō debet. Hoc in Hispaniæ montibus prope Escorial D. Albinus inuenit: quod tamen ante annos triginta nouem Monspeffuli in incultis, sed aliquantum mius, collegimus.

DE SEDO.

CAPVT XXIV.

I. SEDVM tridactylites alpinum maius: radicem habet tenuem capillaceam, cauliculum semipalmarem, purpurascens, non nihil pilosum, in ramulos plures tenues & fragiles diuisum: folia ad radicem tenuia & mollia, lata (in ramulis minuta) in tres lacinias primum, & in alias, diuisa: flores in ramulorum summis albi, quinquefolij, totidem staminibus donati, quibus capitula subrotunda, longiuscula, minutissimum semen continētia, succedunt. Hoc ex Baldo habemus, & saxifragæ albæ petreæ nomine, Pona suo Baldo exhibuit, idem præterito anno D. Fuxerus, nomine Dactylioborani siue Saxifragæ petreæ sempervirentis misit, quod in ea Harcyniæ parte, qua Buda fluuius officinas Rubelandicas alluit, totos scopulos obuoluere scribit.

2. Simile, sed folijs latioribus, & in ternas primū profundas lacinias diuisis, & in his in minora & tenuiora segmenta sectis: caulibus pedalibus, floribus pallide luteis, in humidis montium Pyrenæorum natum, habemus.

3. Aliud cauliculo rotundo, semipalmari, pilis leuissimis aspersis, folijs paruis, crassiusculis & eodem modo quo folia Sedi tridactylitidis in tectis provenientis, incisa sunt, etiam diuisis, totumq; cauliculum alternatim basi sua cingentibus, qui in summitate in ramulos diuiditur, & singuli flosculum candidum, sed minorem, sustinent, capitulaq; vt in præcedenti, succedunt. Sedi dactyli nomine, ex Taurero Austriæ, D. Burserus misit.

II. SEDVM tridactylites alpinum minus: ad radicem parua, repentem & nigricantem, folia plura, exigua, viridia, simul compacta, superne in crenas profundas, binas, communiter ternas, rarius

plures, diuisa: ex quorum medio, cauliculus vnus vel alter, tenuis, aliquando diuisus, paucis & exiguis foliolis cinctus, trium quatuorve vnciarum exurgit, cui flosculi terni, quaterniue pallidi, quinquefolij, multis staminibus donati, singuli singulis pedicellis insident: hic calices parui, semen minutum continentes, succedunt. Hoc in monte Lupi & Calcaris, in eorundem rupibus collegimus: ex humidis Gotthardi montis & Pyrenæis quoq; habemus.

III. SEDVM montanum ericoides: ramis est palmaribus, lentis, flexilibus, dense geniculatis, per terram sparsis, quos folia breuia, crassiuscula, Ericæ forma, vestiunt, & hi in plures alios, duarum triumve vnciarum, & etiam breuioribus diuiduntur, hiq; foliola frequentia, sibi fere incumbentia & rotundiora habent: in singulorum summitatibus velut ex squamoso calice flos satis magnus purpurascens, ex quatuor, aliquando quinque folijs, & aliquot in medio staminibus compositus, insidet: quid flori succedat, non constat. Hoc ex horto Dei dicto, habemus: & cum Lobelij Sedo minimo arboriscente vermiculato, plurimum affinitatis habet.

IV. SEDVM alpinum ericoides cæruleum: ex præruptis iugis, ac saxis humidis propendet, radicem habens oblongam, fibrosam, rufam, ramos plures, foliolis quam in priore breuioribus, crassis, cinereis, velut in Sanamunda 2. Clusij, siue Erica Alexandrina compactis, cinctos: singulis cauliculis vncialibus, foliaceis, flos magnus, cæruleus, quadrifolius, aliquot staminibus breuibus donatus, insidet. Hoc, cum ann. 1579. Martio mense, per Rhætiæ alpes iter faceremus, è rupibus, ob aquam defluentem humidis, instar Cymbalarie, dependens, florensque collegimus, quod florum eleganti colore cæruleo, oculos nostros valde reficiebat.

Idem in Gotthardi summitatibus, & in Valesia ad thermas Leccenses supra Gemme reperitur: quod a priore differt potissimum foliorum exilitate, & colore florum: item & colore & magnitudine.

V. SEDVM saxatile hirsutum purpureum: plantula est triuncialis, radícula capillacea, cauliculo tenui, leuiter piloso, cuius summitas in breues ramulos diuiditur, qui singuli florem purpureum sustinent: foliola ad radicem plura, hirsuta, & lente minora. Hoc, ut & subsequens, ex Pyrenæis D. Bursærus attulit.

VI. SEDVM saxatile atrorubentibus floribus: hoc, tres quatuorve vncias non excedit, habens ra-

diculam exilem, longiusculam, vnum alterumve cauliculum biuncialem, foliolis paucis exiguis, longiusculis, alternatim vestitum, flosculos atrorubentes, quasi in umbella dispositos, sustentem. Hoc etiam in Gotthardo nonnihil altius excrefcit.

VII. SEDVM saxatile variegato flore: radice est capillacea, cauliculis plurimis, tenuibus, biuncialibus, per terram repentibus & fibellis capillaribus terræ adhærentibus: foliolis multis, pallide virentibus, subrotundi, lente minoribus, vestiti: ex ramulorum summis, pedicelli plures capillacei, oblongi, exurgunt, singuli florem quadrifolium, varium, album, purpureum & atrorubentem eleganti spectaculo sustentent, cum plantula hæc cespitis musciq; instar saxa exornet. Hoc inter Valesiam & Augustam vallem, in monte Gletschberg dicto, qui toto pene anno niuosus est, copiose provenit.

VIII. SEDVM alpinum foliolis crenatis asperis: radice est capillacea repente, cauliculis tenuissimis, semipalmaribus, etiam breuioribus, rariis palmaribus, in summo in ramulos aliquot sectis: folia habet longiuscula, angusta, acuminata, crenis utrinque exasperata, & parte auersa candicante; flores quadrifolij, purpurascens & staminibus donati, caliculis sustentantur, quibus capitulum subrotundum, membranaceum, apice donatum, minutulum semen continens, succedit. Hoc Iulio mense floret, in ascensu montis S. Bernhadi maioris & Gotthardo. An forte Gesnerus lib. de hortis Germaniæ, hoc intellexit, dū scribit, Sedum quoddam esse, cuius folia marginibus asperis, branchias piscium referunt?

IX. SEDVM aruense flore rubente: radice est lignosa, fibris capillata, cauliculis aliquot palmaribus, rotundis, rugoso rufescente cortice tectis, qui in ternas, quandoque plures ramulos (quorum aliqui recurvantur) diuiduntur: hos folia longiuscula, angusta, succulenta, sine ordine ambiunt: ramulis superioribus flores plures, vulgaris Sedi floribus similes, sed rubentes insident, semenque vulgari simile succedit. Hoc non longe ab vrbe, in agris Huningensi. autumnio iam exiccatum reperitur: quod etiam in agris argillofis ad Pyrenæos, sed minus, reperitur.

DE COTYLEDONE.

CAPVT XXV.

COTYLEDON minor folijs subrotundis serratis: radix subest tenuis, fibrosa, fusca, circa quæ folia multa, semi vngue minora, non vt in altero oblongis ligulis similia, sed subrotunda, margine crenato, crassiuscula, candicantia & nonnihil adstringentia: è quorū medio caulis semipalmaris, quandoq; palmaris, subasper, minimis & paucis folijs cinctus, assurgit: in cuius summo, pedicelli, flores, multo quæ in secunda minores, ex quinque, quandoq; etiam sex folijs & medijs apicibus cōpositos, sustinentes, qui albi, aliquando rubentibus punctis aspersi, nonnunquam extrinsecus lineis tenuis foliola floris percurrentibus, ita vt flores pallide purpurascens appereant: his capitula exigua, nigrum semen continentia, sequuntur. In Heluetiorum alpidibus, ipsis saxi s ac scopulis adhæret; Iunio & Iulio floreat: ea quæ flore est pallide purpurascens, apud Monspelienfes, in horto Dei collecta fuit.

DE KALI.

CAPVT XXVI.

I. KALI minus villosus: radice est oblonga, fibrosa, nigricante, caule pedali, inæquali, ramoso, folijs pluribus, angustioribus, mollibus & villosis, inter quæ vnum, quod cæteris subiicitur, longius est, quemadmodum etiam in Tragio obseruare est: in cauliculis summis, capitula parua, florem minutum continentia: semen non obseruauimus. Hoc, cum figura Kali albi Dodonæi, melius conuenit, quam Kali minus Lobelij. Tota planta falsa est, & non longe Monspelio à Perault, qua ad mare itur, legimus: quamuis idem, nomine Kali hirsuti folijs Spergulæ, ex Italia, à D. Neudorf. habeamus.

II. KALI foliogramineo: ex radice oblonga, alba, exiguis capillaceis fibris donata, caulis pallide virens, rotundus, incuruus, pedalis, in varios & plures ramos quadrunciales, tenues & fragiles, inordinate dispositos, brachiatus exurgit: quos folia oblongiuscula, angustissima, alternatim disposita cingunt, quibus singulis, singuli noduli exigui florum & seminum, vt in Kali minore Lobelij, cauli

adhærentes, adponuntur. Ex Salinis Saxonici siccum, D. Iungermannus transmisit: & ad Anthylloidem Thalij accedere videtur.

DE TELEPHIO.

CAPVT XXVII.

TELEPHIUM purpureum minus: hoc à radice nodosa, & aliquot veluti minimis naps constante, multisq; fibris prædita, cauliculum vnū vel alterum rotundum, semipalmatam, fragilem ac succulentū promit: quem folia crassiuscula, succulenta, parua, in ambitu crenata, sine ordine ambiunt: flosculi quinque folijs, purpurei, velut umbellæ insident: quibus capitula pentagona, minutissimum semen scobis instar continentia, succedunt. In editissimo monte Brisoia, Betchen dicto, locis humidis Iulio florens, collectum.

DE TITHYMALLO.

CAPVT XXIX.

TITHYMALLUS incanus hirsutus: caules pedales, rotundos, rufescentes, profert, folijs incanis & hirsutis, Myrsenitis legitimi forma, confuso ordine vestitis, in summitate in virgulas diuisi, quibus, vt in Myrsinite, flores & capitula triangularia, semina continentia, insident. Hunc ex Italia D. Neudorfferus attulit.

II. TITHYMALLUS siue Esula exigua folijs obtusis: radice est exili, oblongiuscula, capillata, cauliculis pluribus ad terram resupinatis, aliquantulum repentibus, biuncialibus, triuncialibus, alijs palmo minoribus, rotundis, lacteo succo turgentibus, qui foliolis oblongis, angustis, sed semper in summo obtusis & velut absectis, inordinate vestiuntur: hic in agris Patauinis & Massiliensibus, reperitur.

III. TITHYMALLUS exiguus saxatilis: radiculam habet capilli modo tenuem, longiusculam, cauliculos tenues, vnciales & biunciales, angustissimis & breuibis foliolis cinctos, flosculos exiguos, rubentes: circa Monspelium locis asperis preuenit.

LIBER OCTAVVS.

DE CONVOLLVLO.

CAPVT I.

I. **CONVOLVVLVS** purpureus folio rotundo: caules prælongos, teneros, viticulosos, paucis pilis exasperatos, vicinis perticis circumvolutos, promit: folia habet longis pediculis subasperis donata, quæ lata sunt, angulis carentia & nonnihil hirsuta, præsertim superiora: flores oblongi, ex calicibus hirsutis instar Campanulæ siue Smilacis læuis ex cæruleo purpurei sunt, quibus succedit semen nigrum, semicirculare & angulosum, capitulo membranaceo inclusum, quod semine Campanulæ cæruleæ multo minus est. Hic sub æstatis finem floret. An ad Nil Auicennæ quoque referri potest?

II. **CONVOLVVLVS** peregrinus cæruleus folio oblongo: radice est singulari, oblonga, rufescente, ex qua caules multi, tenues, pedales, interdum cubitales, flexiles, ramosi, leuissimis pilis pubescentes prodeunt: quos folia oblonga, inferiora quidem, vncias tres, quatuorve longa, vix vnciam lata, inordinate vestiunt, quæ sensim minora redduntur, & per marginem leuiter hirsuta sunt: ex omnium fere foliorum sinu, pedicelli tenuissimi, oblongi exurgunt, quibus singulis flos cæruleus ad exortum pallidus, Campanulæ forma, vnico folio constans, & ex caliculo prodiens, insidet: floribus succedunt capitula membranacea parua, quibus semina parua, nigra includuntur. Planta sane ob florum copiam elegantissima, & quæ ob cauliculorum flexibilitatem fulciri debet. Hic in horto meo ex semine, Campanulæ cæruleæ nomine accepto, sæpius creuit.

III. **CONVOLVVLVS** folijs laciniatis, vel quinquefolijs, viticulis est tenuibus, geniculatis, læuibus: ex quolibet geniculo folium, longo tenuissimo pedicello donatum, prodit, quod in quinque lacinias angustas longiusculas diuiditur, & quandoque inferior vna alterave bipartitur, & cuilibet laciniae, tenuissimus mollisque aculeus insidet. Supra folij exortum, pedicellus æque tenuis, dua-

Conuoluulus quinquefolius.



rum triumve vnciarum longus & nudus exurgens, florem magnum purpureo cæruleum, aliorum Conuoluulorum forma, sustinet. Semen non conspectum, cum solum huius ramum, Conuoluuli Aegyptiaci nomine, à nobiliss. Cortuso Patauio ante viginti annos accepimus.

DE BRYONIA.

CAPVT II.

BRYONIA Cretica maculata: radice est longa, alte descendente, sed ad vulgaris magnitudinem non accedente, fusco cortice tecta; ex qua longa & tenuia sarmenta prodeunt, quæ ambiunt folia aspera (qualis & tota planta) ad similitudinem vitium, aut Bryonię vulgaris diuisa, sed minora; viridia, albis strijs per medium discurrentibus, vel maculis albis notata, quibus capreoli vt in vite adduntur. Flores habet pallidos, quinquefolios, striatos, vulgaris Bryonię floribus maiores, ex longis pediculis propendentes: cuilibet flori, fructus succedit semicircularis, superne in partes duas diuisus, viridis primum, at per maturitatem ruber, semina duo continens. quare Dicoceos appellari ppterest. Hæc in Creta frequens est, vnde semen a D. Honorio Belli accepimus & in D. Zuingeri hortu (quia tum hortum colere intermiseramus) seruimus.

II. BRYONIA syluestris baccifera: radicem habet magnam, crassam, longam, succo glutinoso plenam: caules vero sarmentorum vitis instar longos, lignosos, angulos, quibus se, (licet capreolis careat) crebris circumvolutionibus vicinis fruticibus circumuoluit: folia hederacea, Smilacis læuis similia, magis tamen sinuata, tenuia, splendens, & neruosa, longissimis pediculis donata: flores albi sunt; muscosi ad cuiuslibet folij exortum, in viticulis maxime superioribus, pedicellus brevis ex caule exurgit, qui baccam unicam ceraso minorem, virentem primum; at per maturitatem rubentem, sustinet: cui semina satis magna, rotunda, nigraque quaterna, quinaue includuntur. Prouenit in syluis circa pagum Huningen, Iunio florens: at baccæ Septembris fine maturæ sunt.

Hæc à communi Bryonia sylvestri, quæ Tamus dicitur, potissimum in his differt, quod communis florem minorem habeat, racemosa sit: hæc vero flore sit maiore & baccifera.

III. BRYONIA Mechoacana nigricans: radice est Mechoacæ simili, sed cortice nigricante vestita, interius rufescens, quæ tessulatum incisat rotunda, magnitudine & figura calculo aleatorio respondens, ex India Chelapæ siue Celapæ nomine ante annos vndecim allata fuit. Ab Alexandrinis &

Massiliensibus, Jalapium vel Gelapo vocatur. & Massiliensibus, Mechoaca nigra vel mas existimatur.

Gusto est non ingrato, & gummoso, & ob copiosam gummositatem, si carbonibus, vel igni admoueat, flammam concipit. Facultate, vulgarem siue albam Mechoacam, superat: nam ob gummi copiosum, fortius humores serosos purgat, cum imi ventris leui dolore, & præcipue viscera, hepar & ventriculum roborat. Quare drachmæ vnius pondere exhibetur tuto, & sine fastidio opus suum exequitur. Sunt qui ea in dosi, cum aqua Cichoræ, aut simili stillaticia, seu iure acta frigidis, tribus horis ante prandium, ægris propinent.

DE CLEMATIDE.

CAPVT III.

I. CLEMATIS maritima repens: hæc cauliculos habet sarmentolos, geniculatos & striatos, cubitales, atro uirente cortice vestitos: folia Flammulæ erectæ instar oblonga, acuminata, neruosa, rigida, sed angustiora, quod communiter tria vni pediculo, qui velut in capreolum abit, insident, & quædam per circumferentiam nonnihil crenata, quæ vero in summo caule floribus subiiciuntur, angustissima sunt: flores albi sunt, multis staminibus villosis albis, medullis occupantibus, longis pediculis sustentati: quib. semina plana, subrotunda, rufescentia, vt in Flammula erecta, sed minora, bina, ternave iuncta, singulis capreolo plumoso, veluti in cana crista donatis, succedunt: hæc acris sunt quemadmodum & tota planta. In maris Adriatici littoribus, vt in Venerorum Insula Lio & Litze-fusina, suis sarmentis repentem obseruauimus.

II. CLEMATIS alpina Geranifolia: ex radice sarmentosa & perenni, caules plures lentis, lignosi, quandoque rufescente cortice tecti, duos tresve cubitos alti, exurgunt, qui æqualiter bipartiti, in latera diuiduntur: quibus singulis folia, crebris & profundis diuisuris incisa, trigemina, coherentia, vt in Anemone geranifolia, insident: flores singuli, singulis pediculis longissimis ac tenuissimis insident, qui coloris carulei albicantis, aut obscure purpurascents, ex quatuor folijs oblongis, mucronatis, neruosis, crucis in modum dispositis & nonnihil lanuginosis, in cuius medio folia, plura, breuiora, quæ quasi acervulum capillaceorum fila-


mento-

mentorum alborum ambiunt: semen nō vidimus. Hanc in altioribus Baldi rupibus enatam, & Cle-
matidem cruciatam à Iungermanno appellatam,
ante annos vigintisex, & ante biennium elegan-
tiores & maiorem, ex Austria montibus, vbi fre-
quens est, à D. Bursero accepimus.

DE NUMMULARIA.

CAPVT IV.

Nummularia flore purpurascete.



NUMMULARIA flore purpurascete: hæc, eo
quo Nummularia vulgaris modo, serpit, radi-
cem habens tenuem, capillaceam, à qua coliculi
multi, tenues, palmo minores emergunt, quos v-
trinque; folia vulgaris forma, propemodum rotunda
sed parua, & plus quam decuplo minora, quorum
nonnulla leniter sinuata: ex horum sinu pediculi

tenues oblongi, prodeunt, quorum singuli florem
purpurascentem, paruum, oblongum, quinquefo-
lium, staminulis in medio breuib, sustinent: his
capitulum paruum, apice donatum, minutissi-
mum semen continens, succedit. Hæc in humidis
Monspelienfium prope Castelnouum prouenit.

DE POLYGONATO ET LILIO
convallium.

CAPVT V.

I. POLYGONATVM latifolium minus, flore maio-
re: ex radicis albicantis, subrotundæ & fibrosæ
medio, cauliculus vnicus, fere pedalis, striatus, nec
admodum inflexus exurgit: qui folijs, vt in vulgari
dispositis, firmioribus tamen, vestitur: ex singulis
alarum sinibus, flores singuli, magni, albi, inodori,
breuib & quidem singulis pediculis insidentes,
ab vna caulis parte propendent, quibus bæccæ suc-
cedunt, quæ per maturitatem casium colorem ac-
quirunt, & semen osseum, durum continent. Apud
nos in monte Crenzacho copiose prouenit.

II. POLYGONATVM latifolium perfoliatum
Brassilianum: hoc caule est bicubitali, striato, folia
perfoliatæ modo transeunte: folijs pallide virenti-
bus, tenuibus, neruosis, vncias duas latis, quatuor
longis: flore magno, albo, ex folijs quinque angu-
stis, binas vncias longis composito, qui ex longo
tenuissimo pediculo dependet: fructum non vidi-
mus. Hoc in Brasilia apud Toupinambaultios cre-
uit, & D. Burserus communicauit.

LILIVM CONVALLIVM latifolium: radicibus est
tenuibus, longis, repentibus: caule pedali, folijs
tenuis, viridibus, neruosis, subrotundis, læuib, palmaribus,
vncias quatuor latis, basi sua caulem, fistulæ modo ambientibus: floribus magnis, albis,
rotundis hiantibus, reflexis, & odoratis, quibus
fructus rotundus, rubeus, semen durum con-
tinens, succedit. In hortis quibusdam
colitur.



DE CHELIDONIA ROTVNDIFOLIA.

CAPVT VI.

CHELIDONIA rotundifolia maior: huius radix fibrosa est, quibus aliquot oblongi testiculi adherent: folijs est subrotundis, crassis, læuibus, ad foliorum Afari magnitudinem accedentibus, sed nonnihil quandoq; sinuatis, pediculis semipalmaribus donatis & humi procumbentibus: cauliculo palmo minore, flos insidet, calice triphyllo membranoso sustentatus, qui pallide luteus, magnus, vulgari quadruplo maior, qui ex quinque vel sex folijs, quorum singuli ad medium fissi sunt, componitur & ad eius umbilicum stamina plura rufescentia, conspiciuntur: capitulum cum semine non vidimus. Monspeffuli locis humidis prouenit.

DE MALVA.

CAPVT VII.

MALVA folio ficus: huius folia sunt nigricantia, aspera & crassa, quorum prima, modo intres, modo quinque lacinias inæquales diuiduntur: quædam in lacinias quinque profunde secta, sine ordine sinuata, & per marginem crenata sunt, quorum lacinia aliquæ palmares existunt, & pediculis longissimis & pilosis donantur. Scapum siue caulem simplicem, aliquot cubitorum habet: flores & semina non vidimus, quia ante tempus, Argentina in horto Friderici Meyeri, ante annos viginti legimus.


II. MALVA folio vario: radice est alba fibrosa, caule rotundo, cubitali, in plures ramos brachiatum, quem folia cingunt pallide virentia, inferne candicantia, crassiuscula & nonnihil lanuginosa, sed figuræ, in eodem ramulo, diuersæ, quorū quædam Bryonia forma, quædam acuminata, duabus alis donata, quædam subrotunda, vngue minora, omnia tamen in ambitu serrata: flores quinquefolij purpurascens, staminibus in umbilico pallidis, pedicellis oblongis insident: semen in capitulis foliaceis semicirculare succedit. Argentina D. Saltzmannus misit.

III. MALVA Americana: radicem habet oblongam, albam, fibrosam, caulem angulosum, striatū, lanugine leui oblitum: folia viridia, tenuia, plera-

Malua folio vario.



que semicircularia, vncias duas longa, tres lata, superne angulosa seu sinuata, per ambitum leuiter crenata, pediculis palmaribus, hirsutis donata, flores albidi vna cum semine, Maluæ syl. pumilæ similes sunt. Hanc ante annos octodecim in horto D. Saltzmanni, Argentinae collegimus.



DE ALTHÆA.

CAPVT VIII.

ALTHÆA Bryonia folio: caule est cubito altiore, rotundo, lanuginoso, albo; folijs Bryoniae similibus, in quinas lacinias vt plurimum diuisis, palmaribus & alijs multo minoribus, crassis, nervosis, lanugine nonnihil asperis, parte infera canescentibus & longis pediculis insidentibus: flores habet purpureo-ceruleos, quinquefolios, superne semilunatos, staminibus rufescentibus donatos, quibus singulis capitulum foliaceum, planum, semen Althee simile continens, succedit. Hæc in horto aluimus, quam tamen prius Altheæ arborescentis sempervirentis nomine, D. Doldius: dein Altheæ Americanæ, D. Sprengerus, Heidelbergæ, misit.

DE GERANIO.

CAPVT IX.

GERANIVM malacoides minus: plantula est duarum vnciarum, in terram reclinata, radica longiuscula, exigua, foliolis malacoidi maiori similibus, sed minimis, eleganter incisus & longis pedicellis insidentibus: flosculos paruos ceruleos habet, quibus capitulum rostro tenuissimo longiusculo donatum, succedit. In agris circa Rothomagum reperitur.

II. GERANIVM columbinum tenuius laciniarum: radicem habet oblongam, tenuem, fibrosam, rufescentem; ex qua cauliculi plures, palmares, rotundi, hirsuti nonnihil asperi & reclinati prodeunt: folia, quæ vnguem vix superant, rotunda sunt, in lacinias quatuor primum, & hæc in alias, diuisa, & longis pediculis hirsutis prædita: ad cauliculorum latera, flosculi communiter bini, singuli singulis pedicellis insident, parui, cerulei, quibus capitula parua rostrata, siue vtriculi tumentes rostrati succedunt, & ubi semen maturuit, vtrinque cum vtriculorum mucronibus, quasi capreolo insidens, modo geminum, modo ternum, ad rostrum apicem, quod adhuc supereminet, reflectitur, quod in alijs quibusdam Geranijs etiam obseruauimus: Hoc Monspeßuli in syluestribus reperitur.

III. GERANIVM cicutæ folio acu longissima:

caulibus est bicubitalibus, hirsutis, asperis, angulosis, in varios ramos brachiatis: folijs Geranijs modisati siue Cicutæ modo diuisis: floribus subpurpureis, vel violaceis, quinquefolijs, cuilibet acus, vncias quinq, longa, hirsuta succedit, quæ ex vtriculo hirsuto quinquefolio, apicibus donato, semine continente, prodit, quod per maturitatem exilit, & cum vtriculorum mucronibus sursum primum, dein deorsum, aliæq, modo circumuoluitur. Hoc Monspeßuli legimus: in Valefia etiam reperitur.

DE ALCHIMILLA.

CAPVT X.

ALCHIMILLA alpina quinquefolia: radicem habet oblongam, nigricantem, fibras plures de semittentem, ex qua folia aliquot parua, longis pediculis donata & glabra prodeunt, quæ in quinque lacinias ad pediculam, hæc in profundas crenas diuiduntur, inter quæ pediculi bini, terni, tenues, glabri, trium, quatuorve vnciarum longi, reclinati: quorum summitatibus flosculi vulgari Alchimille forma & colore similes, trifolij, pallidi ac herbacei, singuli singulis minimis pedicellis donati: quasi umbellæ insident. In monte S. Bernhardi maioris & Gotthardo locis humidioribus, Augusto florens, reperitur.

DE CANNABINA.

CAPVT XI.

CANNABINÆ aquaticæ similis capitulis nutantibus: radicibus est fibrosis, Ellebori nigri similibus, caulibus pluribus, cubitalibus, hirsutis, in varios ramos scissis: ad singulos ramos folium vñ longum, latum, quandoque serratum, pilosum: ramuli iuxta florem pulchre contorquentur, folia plura habet satis longa, stellæ instar disposita, in quorum medio flos deorsum nutans, ex multis velut squamis compositus, in cuius medio multiplices apices lutei: semen in Cannabina aquatica.

Hanc in humidis Michelsfelden sum inuenimus.

3(5)5

DE CARTOPHYLLATA.

CAPVT XII.

CARTOPHYLLATA alpina minor: radicem habet crassam, oblongam, repentem, fibris donatam & cortice purpurascens testam: folia crassa, hispida in lacinias diuisa, in ambitu serrata: inter quæ caulis vnus vel alter, rotundus, hispidus, paucis folijs vestitus, palmo minor: cuius summitati flos vnicus satis magnus, aureus, cum exiccatur rufescens, quinquefolius, multis staminibus donatus: cui villosa congeries cum semine succedit. Hęc in summitatibus Baldi collecta.

DE PEONIA.

CAPVT XIII.

PEAONIA flore pallido folio hirsuto: huic ex radice aliarum simili, caules angulosi, laues, exurgunt: folia, quorum pediculi nonnihil pilosi sunt, in ternas lacinias: & harum vna rarius in binas diuisa, mucronata, inferne breui lanugine pubescentia & candicantia, superne virentia quidem, sed non splendentia, multis venis à medio neruo in latera excurrentibus: caules singuli florem vnicum, reliquis minorem pallescentem, ochraceo colore, simplici octo foliorum serie constantem, multis staminulis albis præditum, sustinent. In quibusdam hortis obseruauimus.

DE QVINQUEFOLIO.

CAPVT XIV.

QVINQUEFOLIUM album maius: radice est crassiuscula, rufa, folijs in quinque lacinias subrotundas vsque ad pediculum diuisis, in ambitu serratis, paucissimis & breuissimis pilis aspersis, longissimis & hirsutis pediculis insidentibus, inter quæ paucis pediculis, angulosus, paucis pilis donatus, folijs vestitus, exurgit, & in ramulos binos, & hi in summo in plures alios diuiduntur: quorum singulis flos albus, satis magnus insidet, qui ex folijs quinque in summo diuisis, compositus est: in cuius medio, veluti paruus pappus, vnde plura sta-

minula rufescentia efferuntur. Hoc in montijs vrbis Ballstati Heluetiorum, collectum.

II. QVINQUEFOLIUM album minus: radice est nigricante, parua, cauliculis pilosis, erectis, palmo minoribus, in summo diuisis: folijs vnguem latis, in quinque lacinias, extremis oris serratas, diuisis, & breuibus pedicellis insidentibus: floribus est prioris Quinquefolij similibus, sed minoribus. Hoc in saxosis circa Curiam Rhætorum reperitur.

III. QVINQUEFOLIUM montanum luteum erectum hirsutum: ex radice nigricante cauliculi & folia exurgunt: cauliculi quidem tenuissimi & sesquipalmares, in summo multifidi, & molli lanugine pubescentes: folia inferiora, longissimis pediculis donata, in septem (at quæ in caule in quinque) lacinias profundas, diuersæ longitudinis, per oras serratas, pilisque donatas, diuiduntur: quæ parte inferna, vt in vulgari, rufescunt, tantillum incana sunt, non tamen splendent: flores habet paruos, aureos, quinquefolios, multis breuibus & crœcis staminulis donatos, quibus capitulum aliorum more, semen minutum continens, succedit. In montis Crenzacenensis ad patibulum ascensu, prouenit.

IV. QVINQUEFOLIO similis enneaphyllos hirsuta: radicem habet crassam, nigricantem, in longas fibras abeuntem, à qua cauliculi plures, ad exortum quasi conglobati, per terram sparsi, capillacei, multifidi, tres, quatuorve uncias longi, prodeunt: folijs est oblongis pedicellis donatis, in nouem lacinias angustissimas, per marginem incisas & hirsutæ villolas, diuisis: flosculi parui, aurei, & capitula parua quinquefoliorum modo à pedicellis sustentantur. Ex Heluetiorum alpihus.

DE FRAGARIA.

CAPVT XV.

FRAGARIÆ affinis sericea incana: radice est lignosa, nigricante, ad quam folia plura, Fragariæ syl. similia sed longe minora, vnguem non æquantia, crassa, vtrinque incana, molli & sericea lanugine testæ, in tres lacinias ad pediculum vsque diuisa & superne crenata: ramulos habet breues, reclinatos, flores paruos, luteos, stellatos sustentantes, quibus capitulum, calicem quinquefolio sustentatum, minutum semen

continens, succedit. Hanc ante annos circiter quadraginta à Ioan. Bauhino fratre p.m. nomine Lucas aduersariorum: & ante quadriennium, à D. Albino qui eam in saxosis Granadæ collegit, sine nomine accepimus.

DE TRIFOLIO.

CAPUT XVI.

I. TRIFOLIUM montanum purpureum folio acuto crenato; cauliculis est pedalibus, firmis, rectis: folijs rarioribus, ternis ab vno exortu prodeuntibus, oblongis, angustis, nervosis, acutis sursumq; spectantibus; in ambitu dentalis, aliquando profundius incisus: in cauliculi summo, flores purpurei, quasi in globo conferti: quod in montosis pratis, Maio, Iunioque florens, reperitur.

II. TRIFOLIUM montanum purpurascens folio obtuso crenato: hoc caule est ramuloso, folijs oblongis, angustis, sed obtusis & superne & vtrinque crenatis, cuius ramuli, frequentioribus & angustissimis folijs, donantur: flores, quam in priore rariore & purpurascens: in pratis montosis circa Geneuam.

III. TRIFOLIUM montanum lupulinum: hoc ramis est cubitalibus, glabris: folijs rarioribus, parvis, subrotundis, leuissime denticulatis, longissimis pediculis donatis: rami fastigio, capitulum lupuli forma, sed oblongum, ex flosculis spadiceis compositum, insidet: quod in montibus supra Ilfeldam provenit, vbi D. Furerus collegit & transmisit.

IV. TRIFOLIUM capitulo spumoso lævi: radice est alba, oblonga, fibrosa & capillata, cauliculis multis humi sparsis, tres, quatuor, rarius sex uncias longis, foliolis parvis, ternis, oblongo petiolo hærentibus, per marginem acutiuscule crenatis: floribus parvis luteis, quibus capitula incana, veluti ex pluribus vesiculis sibi inuicem insidentibus composita, spumamq; referentia, succedunt: quibus semen paruum, rotundum & planum inclusum est. Hoc circa Neapolim Italarum, in maritimis: circa Monspelium, in agris & luco Gramuntio reperitur.

V. TRIFOLIUM capitulo spumoso aspero maius: radice est oblonga, fibrosa, caulibus bicubitalibus, tenuibus, flexibilibus, à vicinis stuticibus sustentatis: folijs rotundis, trifolio vulgari similibus;

crenatis, prælongis pediculis donatis: inter quæ pediculi nudi, palmares, quandoque pedales efferruntur, qui singuli capitulum subrotundum, nonnunquam parvæ æuellantæ magnitudine, ex floribus aureis compositum, sustinent: hos folliculi membranacei sibi inuicem incumbentes, nonnihil à quibusdam filamentis exasperati, sequuntur. Hoc in Salicetis Michelfeldæ Huningam versus, ijs se sufficiens, reperitur.

VI. TRIFOLIUM capitulo spumoso aspero minus: huius radix transversim fertur & fibris capillaceis terræ infixitur: ramulis suis per terram repit, à quibus pediculi biunciales & triunciales, nudi eriguntur, qui capitulum parvum, subrotundum, ex rufescentibus floribus compositum, sustinent, quibus capitulum, quasi ex vesiculis pluribus compositum, subasperum & initio virens, minutum semen subrufum continens, succedit: folia parva sunt, rotunda & crenata: hoc apud nos ad Rheni ripam, herbido & arenoso loco, iuxta Barræ & circa Monspelium, provenit.

VII. TRIFOLIUM capitulis Thymi: radice est oblonga, alba, tenui, capillacea: cauliculis semipalmaribus, humi sparsis: foliolis ternis obtusis, vni petiolo in hærentibus, in ambitu ferratis, cuius virgulis capitula rotunda, vt in Thymo, flosculorum rufescentium insident, quæ per maturitatem indurantur, minutumque semen subrufum continent. Monspessuli locis siccioribus provenit.

VIII. TRIFOLIUM capitulo oblongo aspero: & hoc radicem habet capillaceam albam, cauliculos plures pedales, læves, rotundos, & quasi articulatos, paucis folijs rotundis vestitos: ex singulis articulis flosculi plures simul iuncti, ijque lutei, prodeunt; his succedunt capitula oblonga, pluribus quasi spinis recutis donata & per maturitatem exasperata, quibus singulis folium tripartitum subijcitur: & huius, quemadmodum & prædictorum, semen exile est. Patavij, in edito monte prope Arqua, quod longe minus altero, quod Monspessulo habemus, legimus.

IX. TRIFOLIUM cochleatum folio minuto obtuso fructu latiore: radice est oblonga tenui, cauliculis aliquot tenuibus, rotundis, palmaribus, in terram reclinatis: foliolis trifolij, sed minimis lenteminiobus, obtusis & tenuissime crenatis: floribus parvis, luteis, oblongis pedicellis insidentibus: fructu lato, compresso, aliquot circumvolutionibus in spiras cochleæ modo contorto, semen planum,

planum, recuruum & rufum, continente. Hoc æstate florens in montibus Euganeis & Monspeffuli legimus.

X. TRIFOLIUM cochleatum polycarpon: hoc ramis est pedalibus, glabris & striatis: folijs trifolio vulgari similibus, longis pediculis donatis, singulis petiolis vnguem latis, tenuibus, subrotundis, minime crenatis: pediculorum extremis flosculi parui, flauï insident, quibus succedunt fructus plures, quini, seni, quasi conglobati, sed parui; in spiras conuoluti & spinulis mollioribus donati: quod in Italia collegimus.

2. Huic simile est alterum, solum folijs à priore differens, quorum quædam subrotunda, pleraque acuta, omnia tamen per marginem incisa, vel crenata.

XI. TRIFOLIUM cochleatum echinatum minus: extradicula prælonga capillacea, cauliculi plures, tenues, fragiles, repandi, palmares prodeunt; foliolis trifolij, sed paruis, iisque obtusis & crenatis, cincti: flosculis est paruis; aureis, communibus vno (rarius pluribus) oblongo pedicello ca-

pillaceo insidente, cui folliculus cochleæ modo circumuolutus, minimis spinulis exasperatus, plerumque vnus, isque paruus (rarius terni quaterni vno pedicello donati) succedit, semina parua, plana, semilunata, rufa, continens. Ex Italia habemus.

XII. TRIFOLIUM fructu duro, spinis horrido: caulem habet pedalem, recuruum, per terram sparsum, folijs raris, subrotundis & superne crenatis cinctum: florem luteum, fructum Tribuli terrestris instar durum, sed rotundum & maiorem, eumque plerumque geminum, per maturitatem album, multis spinis horridum. Monspeffuli legimus.

XIII. TRIFOLIUM folliculis coronæ similibus: radícula est capillari, cauliculis aliquot, nonnihil hispidis, ramosis, palmo minoribus, folijs trifolij, minutis, obtusis & crenatis, cincti: flosculis luteolis, oblongis pedicellis donatis, quos sequuntur folliculi minimi, sibi insidentes & formam coronæ regiæ referentes. Monspeffuli prouenit.

Trifolium peltatum Creticum.



Trifolium spinosum Creticum.



XIV. TRIFOLIUM peltatum Creticum: ex radice tenui, oblonga, fibrosa, cauliculi exurgunt palmo minores, pede nudi, folijs parvis, tripartito diuisis, parum crenatis, oblongis pediculis donatis, vestiti: cauliculorum summis flosculi quaterni, quinive ordine succedentes, forma Ornithopodij, luteo-pallidi insident: quibus siliquæ luteæ, planæ, membranæ, quasi semicirculares, in filamentum abeuntes, semen vnum vel alterum paruum compressum continentes, succedunt: quæ dum molles sunt, dulcissimæ, esui aptæ, at ubi indurauerint amarissimæ. Hoc rusticis in Creta, *μαρτυρία* dici, D. Honorius Belli auctor est,

qui Trifolij Cretici odorati nomine misit.

XV. TRIFOLIUM spinosum Creticum radicem habet oblongam, capillatam, caules plures, palmares, & sesquipalmares, versus terram reclinatos, angulosos, in frequentes ramulos brachiatos, frequentib. geniculis, ex viridi purpurascens cinctos: ramulos cingunt, vtrinque ex opposito sibi respôdentia, tria folia vni petiolo in hæretia, viridia, oblonga, acuminata, in minimam spinam abeuntia: quemadmodum etiam ad singula genicula, spinæ quatuor parvæ, aduncæ superne binæ, totidem inferne adpositæ sunt: unde brevis pediculus exurgens, florem singularem, quinquefolium, Campanulæ

nulæ aruensis forma & colore (siue purpureo caruleum) similem, capitulo viridi insidentem, sustinet, in cuius medio stamina decem, apicibus luteis prædita, capitulo inter ea latente conspiciuntur: quod capitulum postmodum quinque angulis donatur, styloque prominente augetur, & per maturitatem petiolo incuruato ramis se recondit, & in singulis angulis, semen vnicum compressum, rufum, continet. Hoc primum, nomine Trifolij spinosi sempervirentis Cisti flore, Patauio à Laurentio Rosena accepimus, postmodum apud fratrem Ioh. Bauhinum p.m. Montembelgar di collegimus, cuius semen ὀφειτοχόρῳ nomine missum fuerat.

XVI. TRIFOLIUM stellatum: ex radice alba, tenui, oblongiuscula, capillata, cauliculi prodeunt, modo pauciores, bini, terni, modo plures, quini, seni, septeni, semipalmares, palmares, rarius longiores, rotundi, lanuginosi, incani, quandoque rufescentes, inanes, rarissime in alas diuisi: folia habet parua, Trifolij modo diuisa, mollia, villosa, in summo sinuata, & ad radicem oblongis pediculis donata, duobus alijs ad pediculi nexum adnatis: cuilibet cauliculo, spica rotunda, ex floribus oblongis, rubris, rarius luteis, composita insidet: qui ubi delabi incipiunt, spica magis orbiculata redditur, quasi ex pluribus stellis simul iunctis composita foret: etenim flori cuilibet capsula (vel vtriculus) oblonga, villosa, in quina, oblonga, acuminata foliola abiens, succedit, quæ semen ut plurimum vnicum, idque rufum & planum continet. Hoc Monspeffuli, Maio mense collegimus: at per omnia minus, ex Hispania accepimus.

XVII. TRIFOLIUM globoflo flore, vel capitulo Lagopi rotundiore: radicem habet longam, fibrosam, capillaceam, albam: caules plures, tenues, rotundos, palmo minores, quandoque pedales, in ramulos leuiter hirsutos diuisos: quos folia parua tripartita, nonnihil pilosa, per ambitum crenata cingunt, quibus iuxta pediculis communiter duo alia subiiciuntur: cauliculorum summis, flores parui, lutei insident, quibus capitulum rufescens, sphaericum, ex apicibus asperis compositum, succedit: Maio mense, Monspeffuli circa Castelnouum copiose prouenire obseruauimus.

XVIII. TRIFOLIUM globosum repens: radice est exili, capillacea, rufescente, cauliculis aliquot per terram spatiosis trium quatuorve vnciarum, mollibus, lanuginosis & rufescentibus, foliolis paucis superne sinuatis: cauliculorum summis capitulum globosum, plurimis apicibus villosum, insidet: flosculis enim rufescentibus, vtriculi, pluribus apicibus rufescentibus donati succedunt, quorum singuli semen minutum includunt. Monspeffuli in loco Gramuntio, & iuxta castrum Episcopi, prouenit.

XIX. TRIFOLIUM saxatile hirsutissimum: radice lignosa, transversim repenti, rufo cortice tecta, quasi truncus ex multis plantulis simul iunctis, caule carentibus, insidet, tota planta duas tresve vncias non superante: folia habet Trifolij parua, mollia, incana & velut argentea, superne crenata & pedicellis breuissimis insidentia: inter ipsa folia, capitula parua, rotunda, longiusculis pedicellis donata, in quorum medio, pili breues, mollissimi, flauescetes, conspiciuntur: nec florem nec semen vidimus, & in Heluetiorum altissimis iugis legimus.

XX. TRIFOLIUM alpinum flore magno radice dulci: radice est longa, crassa, cortice pallidescente tecta, medulla candida dulci, multis capillis tecta & fibris aliquot oblongis donata, ex qua cauliculi plures in terram reclinati prodeunt, quos folia trifida, oblonga, angusta, & glabra, paucis & ad tactum sensibilibus crenis, & oblongis pediculis donata: inter quæ pediculus communiter vnus (quandoque duo) laevis & nudus, trium quatuorve vnciarum, exurgit, cuius summitati flores Astragalo siue Onobrychidi forma similes, purpurascetes, magni, octo vel decem, quasi spicæ orbiculari insident: qui singuli ex calice oblongo, quinque apicibus donato prodeuntes, singulos pedicellos obtinent.

Hoc primum ex Bernatium alpibus, ante quadraginta annos habuimus: dein, in planitie Horri Dei apud Monspelienfes, mense Iunio cum floribus, sed illo multo maius, legimus. Radix sapore est Glycyrrhizæ; hinc forte Glycyrrhiza Astragaloides, vel Astragalus dulcis dici posset: ex Hispania Glycyrrhizæ Hispanicæ nomine accepimus.

THEATRI BOTANICI

XXI. *TRIFOLIUM corniculatum* minus pilosum: radícula est capillacea, cauliculis pedalis, tenuissimis, rufescentibus, subtilissimis pilis aspersis, folijs paruis, acutis & hirsutis, in breui pediculo ternis, duobus alijs ad pediculi nexum adnatis, ex quorum alis, pediculi longi capillacei exurgunt, flosculum vnum, vel alterum, coloris ad croceum vergentis, sustinentes: quibus singulis, filiquæ oblongæ, strictissimæ, modo vna, modo duæ, minutissimum semen continentes, succedunt. Hæc Monspeßuli in syluulis, & pratis inter montem Lupi & Calcaris prouenit.

XXII. *TRIFOLIUM corniculatum* frutescens, tenuissimis folijs: caulibus est tenuibus, viridibus, glabris, pedalis, in plures ramos palmo minores, brachiatis: folijs vt in priori, sed angustissimis, cinctis: cauliculorum summitatibus, quemadmodum & pedicellis, ex foliorum alis, prodeuntibus, flosculi bini, terni, rarius quini in orbem dispositi, lutei coloris, infident: quos filiquæ binæ, ternæ breuiiores & crassiores, quam in priore, in longum apicem desinentes, in quibus semina exigua, sequuntur. Monspeßio habemus, quemadmodum etiam ex Italia: ad hoc minus est, folijs & filiquis paulo latioribus, inque breuiorem apicem desinentibus.

XXIII. *TRIFOLIUM angustifolium* repens, folliculis rotundis: radicem habet albam oblon-

gam, tenuem, capillaceam, à qua cauliculi plures semipalmes, rarius palmes, per terram sparsi, vtrinque prodeunt: circa quos foliola oblonga tribus petiolis pediculo infidentia, quæ leuia sunt, & per marginem crenata: ex quorum alis pediculi emergunt tenues, oblongi, quibus flores parui, luteoli octo, nouem, decem & quandoque plures alternatim dispositi, affiguntur: his totidem folliculi rugosi, singuli semen vnum continentes, succedunt. Hoc Monspeßuli in aruis, & ad pedem montis Lupi D. Saltzmannus legit.

XXIV. *METILO* *ty* *Hispanica* folijs maculatis: ex radice parua, ramuli palmes, aliquando pedales, tenues emergunt, quos ambiunt folia bina hinc inde, ex quorum alis petiolum prodiens, tria folia sustinet, obtusa, atrouirentia, & ob venas candidas per ea discurrentes, maculata: flores parui pallidi. Hæc in montibus Castiliæ frequens

est, vnde D. Albinus attulit.

(55)

LIBER NON VS.

DE RVBIA ET GALLIO.

CAPVT I.

I. RVBIA montana angustifolia: radicem habet rufescentem, fibrosam, caules cubito altiores, læues, rotundos, striatos, geniculatos: folia ad quodlibet internodium oblonga, angusta, Galij forma sena, septena, in orbem disposita, & rigidiuscula caulem ambiunt: ad internodia, breuissimi ramuli exurgunt, ipse vero caulis in ramulos plures brachiatur, quorum summis, flosculi frequentes, albi quadrifolij insident, quibus semina minuta rotunda, quodlibet suo pedicello donatum, succedunt. Hæc apud nos in asperis collibus legimus: quam & Monspeho, sed folijs subtilioribus, breuioribus, & asperiusculis, quemadmodum quoq; ex Austria, apud quos hinc inde in petris reperitur, habemus. Hanc, Gesnerus in lib. hortorum Germaniæ nomine Rubiæ Syluaticæ longioribus & angustioribus folijs, nulla descriptione addita, forte intellexit.

II. RVBIA pratensis læuis acuto folio: ex radice caulis cubitalis, læuis, quadratus, rufescens, geniculatus, cauus, & communiter vnus exurgit, ex cuius nodis ramuli semipalmares prodeunt, quorum summis flosculi plures quadrifolij, pallidi (semen non conspectum) insident: folia læuia quaterna, vncialia, in acumen abeuntia, ad quemlibet nodum in orbem disposita sunt. Hæc apud Valesianum in pratis ad thermas Leucenses nata, quam etiam in pratis Lipsensibus reperiri, relatum fuit.

III. RVBIA quadrifolia rotunda læuis: ex radice capillaceæ rufescente, cauliculi tenues quadrati, geniculati, palmo altiores, quorum aliqui in ramos brachiati exurgunt: ad singula genicula folia quatuor rotunda, neruosa, tantillum aspera in orbem disponuntur: extremis cauliculorum, flosculi albi, quadrifolij, pedicellis capillaceis insident, quibus capitulum paruum, geminum, asperiusculum, succedit. In montibus Helueticorum, vt Gott-

hardo, & ad Eremitanos prouenit: hanc & circa Argentinam crescere dicunt.

IV. RVBIA angustifolia spicata: à radice subru-
fa, lignosa, & paucis fibris capillata, cauliculi exeunt quadranguli, nodosi, palmares, ramulis ad nodos ex aduerso nascentibus præditi, & nodos, folia plura capillacea, vt in Polygono Knaut dicto, sursum spectantia, in orbem ambiunt: cauliculi in longam tenuemque spicam, ex utriculis paruis acuminatis compactam, abeunt: flores & semina non vidimus. Monspefuli in collibus nascitur.

V. RVBEOLA aruensis cærulea repens: radice est oblonga, tenui, capillacea, rubra, cauliculis in terram reflexis, quadratis, geniculatis, semipalmaribus. rarissime pedalis: ad quodlibet geniculum folia habet parua, subrotunda, quina, sena, in orbem disposita, asperiuscula, & in acutissimum apicem definentia: ex geniculis hinc inde prodeunt pedicelli, quibus quina, senaue similiter folia insident: ex his quemadmodum in cauliculorum summis, flores parui cærulei, vel ex cæruleo purpurascetes, quinquefolij insident; quibus semina oblonga, acuminata, sena, octena, binis tamen simul iunctis succedunt. Hæc passim in agris nostris, etiam autumnoflorens occurrit, quam forte Rubiolaruensis nomine Camerarius in suo horto, nulla descriptione addita, intellexit.

VI. RVBEOLA saxatilis: plantula est tota incana, semipalmaris, cauliculo tenui, quadrato, geniculato, in vnciales ramulos brachiato: folia parua, aspera, angusta, acuminata, communiter octo, rotæ modo disposita habet: ramulorum summis flosculi plures, exigui, quadrifolij, apicibus & minimis pedicellis donati, luteoli, si recte recordor, insident. In saxosis Gallo prouinciæ.

VII. RVBEOLA maritima aspera: radice est oblonga, tenui, repente & rufescente: cauliculis

liculis pluribus geniculatis, biuncialibus, per terram sparsis, & capillaceis fibellis terræ affixis, foliolis pluribus, breuib, acuminatis, virentibus, & asperis, cauliculos inordinate cingentibus: flosculis minutis, pallidulis. Hæc copiose in littore maris Mediterranei, non longe Monspelio, & etiam Massiliæ occurrit.

VIII. RYBIA cynanchica saxatilis: ex radice alba, oblonga, tenui & fibrosa, cauliculi plurimi, trium, quatuorve uncularum longi, foliolis plurimis, oblongis, angustissimis, & viridibus, vestiti, exurgunt: & inter hos pediculi bini, terni, palmares, graciles, in ramulos diuisi, & paucissimis foliolis vestiti, quibus flores, vt in Cynanchica vulgari, pallide rubescentes, singuli singulis pedicellis donati, insident. Hæc in saxosis vdis circa Valentiam Delphinatus, à D. Bursero collecta fuit.

GALLIUM latifolium glabrum: radice est tenui, repente, geniculata: cauliculis tenellis, quadrangulis, geniculatis, palmo minoribus: folijs è singulis internodijs quaternis, decussatis, glabris, instar plantaginis neruosis, pallide virentibus, & sesquiuncialibus: flores habet paruos, cauliculos verticillatim coronæ modo ambientes, luteos, breuib, pediculis donatos. Hoc circa Bononiam.

interfentes, tota æstate, reperitur.



—(—)—



Thalictrum angustissimo folio.



DE THALICTRO.

CAPVT II.

I. THALICTRUM angustissimo folio: radice est flauescente, ex aliquot fibris, oblongis, crassiusculis, composita: caule bicubitali, læui, rotundo, p̄funde canaliculato, & geniculato: ex quolibet geniculo folia plura prodeunt, in plures oblongas, & plerasque angustissimas, tandem & ternas lacinias, secta: at caulis, in fastigio in ramulos diuiditur, in quibus flores plures muscosi, pallidi, ad luteum vergentes, velut in oblonga spica dispositi, quos valiuula tenuēs, parua, minutissimum semen continentes, sequuntur. Hoc in pratis Michaelfeldensibus æstiuis mensibus floret, quod Ru-

ram.

tam pratensem maiorem quintam Tabernæmontani esse, minus recte suspicari sumus.

II. *Thalictrum* minimum foetidissimum: caule est pedali, rotundo, in ramulos diuiso: foliis pluribus in tres lacinias diuisis, anterius duabus incisuris denticulatis, superne atrouirentibus, interne pallescentibus: in ramulorum fastigijs flosculi parui, muscoli, ex plurimis staminulis compositi, quibus succedunt exiguae valuulae, oblongae, senae, septenae, striatae, apice incuruo donatae, sibi-que inuicem iunctae, capillaceo oblongo pediculo insidentes, semen exiguum includentes. Tota planta odorem foetidissimum spirat, & in Valesia reperitur.

Simile, sed caule expuniceo colore purpurascente, *Thalictri* maritimi minimi nomine, D. Gilenius misit.

DE FABA ARBORESCENTE.

CAPVT III.

FABARVM differentiae plures dantur, at solum Fabae arborescentis hoc loco meminisse lubet. Fabae arborescentis Anglicae nomine, species sex Amstelrodamo, à D. Iacobo Guilhelmi Hooft anno 1614. vna cum quam plurimis alijs fructibus exoticis accepimus: quarum prima lata, compressa, cordis humani figuram refert: siquidem circa umbilicum veluti ad basim sinum habet semicircularem, & sensim ex rotunditate in obtusum apicem definit; cortice rufo, splendente tegitur, cuius interior pars, siue caro subiecta, rufa dura, densa; existit: quo ad magnitudinem, vncias tres lata, & quatuor longa est, & in duas partes finditur.

Altera priore minor est, magis compressa, figuraeque magis rotunda, & parte superiore non secus, quam prior, profundum umbilicum semicircularem obtinet, & multo quam alijs partibus crassior: cortice est nigro, striato, tenuiore, & carne pauciore.

Tertia, priore adhuc minor, magisque plana, atque compressa, etiam nigro cortice tecta, vncias duas lata, tres longa, & parte superiore umbilico, non vt in duabus prioribus semicirculari cauo, sed oblongo.

Quarta, à proxima solum crassitie, & corticis colore spadiceo, differt.

Quinta, colore quidem, cum quarta conuenit,

sed quadruplo crassior est, & aliquomodo os Scapulae refert: siquidem ad umbilicum, vbi vnciam crassa, sinus pollicis vnguis latitudinem aequans, acetabulum Scapulae refert, vtrinque costas tenues obtinet: nam sensim oblongatur, in fine rotundatur, & ad latera sensim angustior redditur: at per medium linea extuberat.

Sexta, lata est, & compressa humani vnguis similitudine, & magnitudine, nigro cortice tecta, superne umbilicum paruum cauum obtinente.

DE PISO.

CAPVT IV.

PISVM vmbellatum: & Pisorum differentias praeterire lubet, & solum Pisi vmbellati historiam breuem subijcere. Hoc caulibus est longis, striatis, fistulosis, fragilibus, ramosis, & per maturitatem albis: folijs aliquot oblongis, vni costae aduerso situ adnatis, quae parte extrema, capreolorum modo in clauiculas, quibus se vicinis implicat, definit: flores habet albos, circa umbilicum purpurea nota insignitos, in summitate caulium veluti in vmbella dispositos: hic succedunt siliquae duarum vnciarum, in formam vmbellae sitatae, in quibus Pisum rotundum, album, communiter vnum, vel duo, rarius tria, vulgaribus maiora continentur, Germanis, apud quos licet rarius, in hortis colitur, *Wischersch* / id est, Pisi in fasciculum iuncta, appellantur.

DE CICERE.

CAPVT V.

I. **C**ICER montanum *ακρυλιν*: radice est longa, in profundum, nisi fissilium lapidum interuentu prohibeatur, descendente, à qua exurgunt pediculi palmares, tenues, hirsuti, vtrinque folijs duodenis, & pluribus subrotundis, sed non nihil, quam in Cicere satiuo longioribus, marginibus hirsutis, modo aequaliter, modo inaequaliter ex aduerso nascentibus, folio tamen extremo impari, vestiti flosculi ad radicem oblongiusculi, pallidi, forma ad florem Loti tetragonoboli accedentes his succedunt siliquae praeumidae, duabus valvulis constantes, semine reniformi, Medicæ in morem flauescence, praegnautes. Vernis mensibus flo-

ret, in montibus Thuringiæ circa Northusam, unde D. Furerus anno 1616. transmisit.

I. Cicer montanum lanuginosum erectum: ramis est pedalis, rectis, rotundis, molli lanugine hispidis, in ramos semipalmes, etiam multo minores, brachiatis, in quibus folia Viciæ sylu. forma longa, modo latiora, modo angustiora, mollia, leui lanugine obsita, dena, duodena & totidem ex aduerso eidem costæ in hærentia, extremo semper impari numerum faciente: ramulorum apicibus spica florum pallidorum & hirsutorum insidet, quos sequuntur siliquæ oblongæ, lanuginosæ, in exiguum filamentum recuruum desinentes, quæ semen nigrum minutum continent.

Hoc angustioribus folijs, in Valesia ad Thermas Leucenses, Iulio florens reperitur: at quod folijs paulo latioribus, Ciceris montani erecti Thuringiani nomine, à D. Furerò, & Ciceris astragaloidis erecti Francenhufanorum à D. Iungermanno accepimus, quod in montibus Francenhufanis copiose reperiri scripsere.

DE LUPINO

CAPVT VI.

LUPINUS cæruleus maior villosus: radice est lignosa rufescente, fibrosa: caule cubitali, firmo, rotundo, striato, molli lanugine obsito (nam in hoc longe maior est hirsuties, quam in alijs Lupinis) in summitate in paucos ramulos diuiso: ramulis quandoque etiam subalaribus, rudimenta floris futuri habentibus, qui raro nostro cælo perficiuntur: folia septena, octona, molli lanugine obsita, & quam in cæteris latiora, stellæ in modum disposita, pediculis villosis, tres, quatuorve uncias longis insident, quæ decidua sunt, maxime ubi semen perfici incipit: flores magni sunt, eleganter cærulei, & inodori (rarius floribus est incarnatis) semper quini in ordine seu verticillatim dispositi; ita ut quam plurimum quatuor, raro quinque ordines conspiciantur: & quo planta perfectior sit, eo etiam magis à se inuicem distinguuntur, & quintus ordo plerumque perit, dum inferiores semen perficere student: siliquæ sequuntur hirsutæ, unciam latæ, duas longæ, sed paucæ, cum ex quinque ordinibus vix binæ singulo ordine proueniant (quod raritatem & peregrinam plantæ naturam ostendere videtur) quæ semen vulgaribus maius compres-

sum, & rufescens, quandoque strijs variegatur, continent. Huius semen anno 1593. Lupini Indici nomine, D. Doldius Norinberga, ipsam vero plantam Lupini Cretici appellatione, D. Springerus Heidelbergæ misit: quem Lupinum quartum, Clusius in postrema historia facere videtur.

II. LUPINUS minimus: ex radícula oblonga capillacea, cauliculus tenuis, palmaris, quam minimum hirsutus exurgit, circa quem foliola quina, sena, septena, breuia, angustissima, subhirsuta, quæ oblongis pedicellis insident: flores & semina nondum vidimus: plantam Lupini Affricani minimi nominæ, ex horto nobiliss. Contareni habemus.

DE LATHYRIDE.

CAPVT VII.

LATHYRIS angustissimo siue capillaceo foliis: plures Lathyridis differentias in foliorum latitudine & angustia, floris colore, siliquarum forma, hirsutia, & læuitate hic præterire lubet, & solum meminisse Lathyridis angustissimo folio, quæ radice est exili, cauliculis cubitalibus infirmis, quibus hinc inde, & aduerso situ bina minima foliola adnascuntur, è quorum sinu bina, nonnunquam terna folia capillacea, trium, quatuorve unciarum longa, & surrecta, exiguo pedicello innixa, vna cum pediculo in multum capreolum desinente, prodeunt, ex quo etiam pediculus tenuissimus, oblongus & nudus effertur, qui florem vnicum, paruum, subcæruleum, quandoque pallide rubentem sustinet: quo defluxo, siliqua uncialis in apicem falcatum abiens, bina, ternave grana parua rotunda nigricantia, continens succedit.

Montepessuli in collibus, Maio florens, reperitur.

os() 30

DE

DE VICIA.

CAPVT VIII.

VICIA Onobrychidis flore: & Viciarum quamuis differentias plures obseruauerimus, attamen in præsens vnus solum descriptionem subijcere lubet. Hæc caules habet pedales, teretes, striatos, quos foliorum alæ, vt in Vicia vulgari, sed breuiiores & angustiores, vni costæ ex aduerso respondentes, ambiunt, capreolis extremum occupantibus: ex foliorum alis superioribus, pediculi semipalmares, nudi exurgunt, quorum summitatibus flores plures oblongi, galericulati, Onobrychidi 3. Clusij forma similes inferne pallidi, superne violacei coloris insident: floribus succedunt siliquæ planæ, deorsum reclinatæ, semina exigua, sena, septena numero, continentes. Monspessuli prouenit.

DE CAPITÆ GALLINACEO, ET
onobrychide.

CAPVT IX.

CAPVT Gallinaceum minus: ex radice tenui oblonga, fibris carêto, cauliculos aliquot palmares, & semipalmares proferit, eosque vt plurimum procumbentes, & in ramulos diuisos: folia vulgari, siue maiori similia, sed breuiora & angustiora: flores habet paucos, paruos, dilute rubentes, breuib. pediculis insidentes: fructus parui, asperi, echinati & subrotundi succedunt. Hoc in maritimis & arenosis Prouinciæ, & iuxta Olbiam, & in montosis iuxta oppidum Vigan, reperitur.

I. ONOBR YCHIS clypeata aspera minor: a radice crassâ, fibrosa, cauliculi semipalmares, reclinati prodeunt, circa quos foliola multa, breuia & angustâ, aduerso situ costæ adhærentia: flosculi elegantissimi colore rubentes, parui; Genistæ forma similes, pedicellis insident: sequuntur fructus clypeolis exiguis similes, plani, asperi, semen minutissimum continentes. Monspessuli in planitie Lupi collecta.

II. ONOBR YCHIS clypeata læuis: ex radice rufescente, paucissimis fibris donata, caulis vnus (nonnunquam duo) pedalis, nodis distinctus, exurgit: circa quem folia alata, ex senis, septenis v-

trinque fibris oblongis, glabris, vni costæ inhiærentibus, vnoque extremam aliam occupante composita: ex alis, tenues, & oblongæ virgulæ, flores purpureo cæruleos, velut in spica dispositos, sustinentes, prodeunt, quos sequuntur fructus plani, leues, clypeiformes, communiter terni, sibi inuicem per longum cohærentes, semen minutum includentes. In Heluetiorum alpibus, vt monte Fraeto, & ad Thermas Fabarias prouenit.

III. ONOBR YCHIS incana: caulem habet rotundum, ramosum, incanum: folia plura, acuminata, angustâ, vni costæ adnexa, incana velut cinere aspersa: cauliculi semipalmares, nudi, spicam florum purpurascens, aliorum forma sustinent: quibus succedunt siliquæ oblongæ, incanæ, incuruæ mucrone donatæ, duabus valvulis constantes, semen minutum, nigrum, planum, & semicirculare continentes. In Prouincia Galliæ reperitur.

Alteram, non minus incanam, sed minorem, semipalmarem, folijs breuioribus & rotundis, ex Aragoniæ & Castiliæ saxosis, D. Albinus attulit.

DE OROBO.

CAPVT X.

OROBVS alpinus latifolius: ramis est cubitalibus, aut altioribus, angulosis, viridibus: folijs in singulis alis octonis, vni costæ adnatis, & sibi inuicem oppositis, uncias tres longis, duas latis, viridibus, nervosis, & cæteris Oroborum folijs minus acutis: è virgulis ex alarum cauis palmaribus nudis prodeuntibus, flores unciales, Genistæ forma, pallide lutei, at folio superiore rufescente, dependent stylo ex illorum medio prominente: lobos & semina non vidimus: ex Pyrenæis & Hel-

uetiorum alpibus habemus.

☞:☞

☞

DE GLAUCE LEGUMINOSA.

CAPVT XI.

GLAUCI Leguminosæ affinis: radicem habet albam, oblongam, paucis fibris donatam, ex qua caulis bicubitalis, & altior, satis crassus, rotundus, rubescens, cauus, paucis & breuibus pilis aspersus, prodit, & nisi sustentetur, procumbit: at frequenter ad cubiti solum altitudinem accedit, nec fulcimine opus habet: hic in alios ramos diuiditur: folia habet Glauco leguminosæ similia, duodecim etiam quatuordecim, & pluribus, vtrinque ad costam ordine dispositis, nec in ambitu serratis, & elegantiori virore nitentibus: ex foliorum sinubus pe-

diculi prodeunt, flores pallide luteos, modo vnum communiter plures, forma Glauci leguminosæ similes sustinentes: hos sequuntur siliquæ crassæ, coniunctæ, vnciam longe, triangulares, in breuem apicem abeuntes, semina angulosa, per maturitatem ex viridi flauescencia, continentes. Huius semen Araci Boetici nomine, à D. Io. Pona Vero haec accepimus, & ab annis aliquot in hortulo nostro habuimus: nam licet planta annua sit, attamen ex femine deciduo sese propagat. Tota planta ingrati saporis est: folia commanducata, herbaceum primum & ingratum, dein amarum saporem in faucibus relinquunt.




LIBER DECIMVS.

DE OPHIOGLOSSO.

CAPVT I.

I. OPHIOGLOSSVM anguloso folio: ex radice crassa, in fibras crassas abeunte, vnus vel alter pediculus, vncias quatuor longus, post medium dilatatus, effertur, cui folium vnicum, vncias tres longum, sesquiunciam latum, ad exortum vtrinque dilatatum, & angulosum insidet, & stylum sesquiunciale linguam referentem, pediculo donatum obtinet. Helmstadio, D. Sigfridus misit.

II. OPHIOGLOSSVM minus; radiculis est fibrosis, pediculo simplici & breui, cui folium vnicum, subrotundum, vnciam latum, sesquiunciam longum insidet: ad cuius exortum, & veluti è folij sinu, stylus serpentis linguam referens, vnciam longus exit: in humidis circa Monspelium prouenit.



DE ADIANTHO.

CAPVT II.

ADIANTHVM fruticosum Brasilianum: hoc Filicis instar excrescit, caule tenui, leui, sub nigro puniceo colore nitente, qui in alios subdiuiditur, circa quos folia viridia, Adiantho vero aliquantulum similia, parua, oblonga, sed obtusa, superne rantum incisuris diuisa, inferiore costa, qua capillaceo insident, integra, alternatim cauliculo, & quidem vtrinque duodecim vsq; ad viginti, petiolis, per pedicellum iunguntur. Apud Tououpi-nambaultios in Brasilia natum à D. Bursero accepimus.

DE FILICE.

CAPVT III.

I. FILIX palustris maxima: radice est omnium Filicum crassissima, duos pugnos superante nigra, velut ex crassissimis squamis cōpacta, & multis fibris

fibris nigris capillata, vnde exurgunt folia plura attrouirentia, tres cubitos superantia, in latus amplissime expansa: quorum pediculus rufescens, angulosus, cauus, instar oblongi auriscalpij ex radice prodit, qui vbi pedalem altitudinem adeptus est foliosus redditur, ad modum Filicis maris vulgaris: nam veluti ex plurimis pinnis, secundum margines crenatis, & ad vnum pediculum coherentibus componuntur. Verum ad radicem, inter media folia, plura foliorum rudimenta cubitalia, veluti futurorum principia, conspiciuntur, eo modo, quo in Filice florida, siue Osmunda dicta, circa summos ramulos apparent: à qua tamen differt, quod Osmunda caules edat, & caulium summis, veluti flores, siue seminum rudimenta adhæreant, & folia habeat latiora, & haudquaquam per margines serrata. Hanc locis palustribus circa thermas Marchicas copiose obseruauimus: aliquando in editis & saxosis, sed humidis montibus etiam reperitur, vt circa Ramstein arcem Basileensem notauiamus.

II. Filix mas aculeata maior: radicem habet nigram, fibrosam, pediculos pedales, foliosos, in multas alas pinnatas, modo maiores, modo minores, modo minores profundius diuisos pallide virescentes, primis in ambitu dentatis, & in breuem spinulam desinentibus. Hanc in monte Wasserfall legimus.

III. Filix mas aculeata minor: hæc pinnulis est breuibus, totis integris, non dentatis, sed in spinulam acutam breuemque omnibus desinentibus: eodem quo prior loco, licet eam postmodum à D. Furero, ex Hircynia & Stolberga veteri, acceperimus.

DE MUSCO.

CAPVT IV.

I. Muscus pennatus: hic colore est ex luteo virescente, lateque serpit, multis viticulis, sed breuibus, ramosis, minutis folijs pennam æmulantibus vestitus, qui fibras tenues pro radicibus habet in petrosis & syluis reperitur.

Huius altera species, radice rufescente ex copiosissimis fibris composita, viticulis ramosioribus, folijs minoribus: in sylua Vilenfi, locis vliginosis prouenit.

II. Muscus filicinus minor: huius aliquot differencias obseruauimus: sed hic solum de minore agemus, qui per terram serpit, cauliculis tenuibus,

in summo ramosis, foliolis Filici similibus, sed tenuissime dissectis: ex ramulis, pedicelli aliquot capillares rufescentes, biunciales, efferuntur, quibus singulis capitulum exiguum, subrotundum, incuruum, in apicem exiguum desinens, insidet. Hunc, cum alijs D. Iungermannus misit.

III. Muscus Abietis facie: prædicto non multum ab similis, viticulis in ramos diuisis, folijs capillaceis, vtrinque (vt in Abiete) costæ oblongiusculæ adnatis, multo quam in priore breuioribus, & viridioribus.

IV. Muscus ramosus repens, velut spicatus: hic ad arborum radices, nigris radiculis terræ affigitur, viticulis crassis, & longis serpit, & de se copiosas veluti spicas oblongas, ex tenuissimis & leuissimis foliolis compactas, ramulorum instar emittit.

Huius similis & alter, foliorum tantum apicibus candicantibus discrepans: vterque in monte Crenzacho ad arborum radices crescit.

V. Muscus ramosus erectus maior: hic cespitis instar eleganter & arctissime quasi compactus, ex radicibus oblongis capillaceis, cauliculum trium quatuorve uncularum emittit, qui in binos, ternos, quaternos, biunciales, etiam triunciales ramulos, & hi quoque in alios erigitur, qui minimis capillaceis foliolis vestiuntur: inter ipsa foliola, pedicelli unciales, nudi, capillacei, capitulum, vt in Adianto aureo, sustinentes, efferuntur. Hic in Crenzacho mōte ad arborum radices, alijs Muscis commixtus conspicitur: at elegantior & viridior, ad sepes circa Burlam fluiuium reperitur.

VI. Muscus ramosus erectus minor: ex capillacea radice cauliculus ad summum biuncialis varie diuisus foliolis vix conspicuis cinctus, emergit eodem, quo tres priores, loco prouenit.

VII. Muscus saxatilis ericoides: huic circa radicem folia multa Musco vulgari similia, inter quæ viticuli sunt palmares, asperi, foliolis Ericæ coridis folio similibus, inordinate vestiti, aliquando hinc inde nudi, quorum summo capitulum exiguum insidet. Ad Wiesam fluiuiū super saxa repit.

VIII. Muscus stellaris rosæus: ex fibellis nigris radicem constituentibus, pedicelli unciales prodeunt, quibus singulis folia plura instar rosæ compacta, pallide virescentia, acuminata, in modum stellæ disposita, insident. Hic in saxosis Telamontij prouenit.

IX. Muscus Cupressiformis: paruus est, ramosus,

sus, foliolis compressi forma, atrouirentibus, inter quæ pedicellus exurgit, qui minimas spicas pallidas & molles sustinet. Ex Hareynia.

X. *Muscus* Polytrichoides: hic triplex est; Primus, viticulis est plurimis, iisque breuibus, & compactis, qui foliolis breuibus capillaceis rigidiusculis cinguntur. Alter, per omnia minor est, cuius folia rigidiuscula non sunt: Tertius, minimus est, & mollis: prior in syluis vliginosis reperitur: duo posteriores muris insident.

XI. *Muscus* terrestris coralloides incanus: muscus hic pedalis est, incanus, ramis pluribus crassioribus erectis, iisque compactis, qui in plurimos ramulos, cornuum cernuorum instar, eosque acutos diuiduntur: hic ad Wiefam in syluis occurrit.

XII. *Muscus* terrestris, coralloides erectus, cornibus rufescentibus: hic Musco terrestri vulgari elegantispectaculo innascitur: nam Musco vulgari ex pallido virefcenti, hic candidus insidet, coralli modo in ramulos rigidiusculos diuisus: qui licet candidus sit, ipsius tamen summitates cornutæ, & rigida rufescunt: hic ad Wiefam fluuium late expansus in arenosis reperitur. Verum hic cum Musco Corallino, siue Corallina montana Tabernæmontani, neutiquam confundi debet.

XIII. *Muscus* ceranoides: hic duplex est, maior & minor: maior, trium, quatuorve vnciarum est, folijs carens, cauliculis latiusculis in ramos diuisis, hiq; in alios breues, & hi similiter in tenuissima segmenta, trifida, quadrifida, acute scinduntur.

Minor totus incanus, vnciam non excedens, ex plurimis ramulis proxime iunctis cõpositus, quorum summitas communiter in duo minutissima

& acutissima cornua abit: vterq; in Hareynia collectus fuit.

XIV. *Muscus* aquaticus folio expanso: hic ex radice transuersim repente, & nigricante, ramos frequentes, late sparsos & semipalmares emittit, quorû summitates ob foliola cõpactiora, velut in spicam abeunt: folijs est breuibus, latiusculis primum, dein acutis. Hic apud nos aquæ in riuiis innatat, & nonnihil splendet: quamuis eundem ex lacu Gaderfchlebianò D. Sigfridus, & D. Iungermannus, Musci maioris lapidum Hareyniæ nomine, miserit.

XV. *Muscus* fontanus siue Hepatica aquatica: hunc triplicem habemus, maiorem & minorem, Hepatiæ nomine à Lobelio, Tabernæmontano & alijs depictum, his tertium addere lubet, ab illis diuersum, quem Muscum fontanum capitulis racemosis vocamus: hic folijs est longe minoribus, squamarum instar iunctis, pallide virentibus, & nonnihil hirsutis, inter quæ quam plurimi pediculi capillacei, biunciales, nudi efferuntur, quorum singuli capitulum paruum instar racemi compactum, & rufescens sustinent, quantum ex sicco, à D. Sigfrido misso, colligere licuit.

XVI. *Muscus* pyxioides duplex est: alter terrestris, tubulis maioribus, & candidioribus constas, à Lobelio nomine Musci terrestris pyxidatos alabastriculos imitantis, propositus: sub quo in Silesia calcem reperiri relatum fuit.

Alter saxatilis est, tubulis lōge minoribus, copiosioribus, nec ita candidis, qui petris saxive latissimis innascitur, eaq; obtegir, quemadmodum in via Telamontium verius, videre est.

Lenticula palustris latifolia.



LENTICVLA PALVSTRIS.

CAPVT V.

LENTICVLA palustris latifolia punctata: Lenticula palustris mihi quadruplex est: vulgarissima, Lentem referens: altera trifolca: tertia quadrifolia: quarta cuius & figuram (in Phytopinace & Matthiolo propositam) & descriptionem adiungere lubet. Hæc ramulis aquis innatat, à quibus filamenta radículas constituentia deorsum feruntur: folijs est copiosis, subrotundis, eleganter virentibus, coniugatis in ramulis digestis, superne punctis minutissimis notatis: his inferne copiose lenticulæ, aliquando singulæ, aliquando ternæ, & quaternæ, rugoso prætenus cortice donatæ adherent, quibus semen copiosissimum, minutissimum & flauescens includitur: sapore est aqueo, Hanc in fossis Patavinis aquis supernatantem vidimus, & in Silesia circa Vratislaviam reperitur: quam forte Cæsalpinus, pro Stratiote aquatica Dioscoridis

proposuit, quamque scribit fluitare, & cum aqua incidere. Pisisin Auxeris fluit, quia aquas thermales ex monte S. Iuliani recipit.

CORALLINA.

CAPVT VI.

CORALLINÆ varietates multæ occurrunt, at in præsens de tribus, quas hæc tenus apud Authores, qui ad manus sunt, non observauimus.

I. CORALLINA alba nodosa: caule est pedali, ligno candido, & duro, candido & aspero cortice recto, à quo vtrinque, sed sine ordine, pediculi, trium quatuorve vnciarum erecti, flexiles, prodeunt, quorum aliqui in alios, etiam vncia minores subdiuiduntur: hos minimum noduli, velut ex duobus semicirculis, iisque vt plurimum pertusis, compositi, vsque ad extremum apicem (triginta, etiam quadraginta in vno pediculo obseruare licet) eleganti spectaculo, ad antiquarum minimarum cæterarum aurearum similitudinem, cingunt. Hanc vna cum sequēribus, D. Rumbauius, Massilia attulit, ex Barbaria illo deserti, & apud Massilienses plumarum loco supra pileos gestari, affirmavit.

II. CORALLINA cinerea rugosa: hæc duplex est, & vtraque non secus quam sequens, intus lignum habet spadicei coloris, durum, medulla carens, & crusta obductum. Prima, ligno est duriore, quod crusta cinerea, aspera, rugosa, & tuberosa, veluti cortice vestitur, quæ friabilis est, forte ex lino maritimo exsiccatō creatā: hæc in ramos plures recuruos, & hi in minores, veluti tuberculis exasperatos, diuiduntur, & in obtusum rotundiusculum apicem desinunt.

Altera, crusta magis albicante, minusque rugosa obducitur, & in ramos pede longiores flexiles, & hi in stylos plerosque palmares, absumuntur. Verum has duas, nec cum Lithophyto marino Gesneri, nec cum Corallina alba, lutea, & rubra Tabernæmontani, nec cum Erica maritima Clusij, confundere oportet, cum omnes has differentias habeamus.

III. CORALLINA pallide flauescens læuis: hæc crusta pallide flauescente, læui ac friabili obducta est: à qua vtrinque modo rami, modo styli læues & flexiles prodeunt.

QUERCUS MARITIMA

CAPUT VII.

QUERCUS *maritima* triplex mihi est: 1. quæ propter vesicas aut bullas plurimas, quibusdam baccifera dicitur: 2. vesicis quidem caret, sed foliorum extrema crassiora sunt, & inæqualia, quasi rudimentum Cucumeris exigui ostendunt, quam glandiferam vocant: utraque iam descripta. At tertia, quam Quercum *maritimam* barbaram vocamus, pauca quidem folia habet, eaque secundæ similia, sed hæc in quam plurima oblonga capillacea filamenta, barbæ instar absumentur.

FUCUS MARITIMUS.

CAPUT VIII.

EX Fucis maritimis quam plurimis, in præsens aliquot solum exhibebimus, quorum duos priores anno 1603. D. Cargillus, Abredonia ex Scotia una cum descriptione transmisit.

I. *Fucus alatus*, siue phasganoides: huius admiranda est forma: saxis quæ Oceanus lambit, & in æstu quoque mergit, adheret, lepadum instar myralis coronata: caule tereti, pennæ anserinæ magnitudine, colore, quem exhibet Pruna Damascena, inter rubrum & nigrum saturatum, medio; at folia, quæ non nisi caulem adactum ornant, saxo hærentia (in sicca vite scunt) ad luteum magis vergunt, quæ palmæ latitudine supra radicem nascuntur plurima, ligularum instar, cartilaginea, tres, quatuor, sex, aut octo uncias longa: inter quæ caulis eo usque teres, latefcit, porrigiturque interdum ad unæ longitudinem infirmus, ut nisi aquis innatans sustentetur, humi semper procumbat: huic, si adultior utrinque alæ adnascitur, tantæ, quantæ & ipse caulis est longitudinis, ea vera tota membrana est, fibris hinc inde venosis à caule conspersa. Notandum autem membrana in hanc, pro ut in sagittarum alis est, videre, una parte angustiore, sensim latiore reddi, ita ut tres ab ortu pollices transuersos, æqualis deinceps tota existat, unius, duarum, aut trium unciarum latitudine. Vulgo Baderlack vocant: *Fucus alatus*, aut phasganoides esto, caulis enim ancipitem gladium refert: Hic, præsertim in Septembri viget, alio anni tem-

pore inutilis: membranæ abijciuntur, reliquo vescuntur graviora, alijsque etiam in cibis cedit: sapore est salso cum modica dulcedine: sitim manducantibus excitat.

II. *Fucus arboreus polyfchides*: eodem ortu & usu est, quem vulgus Tangelus nominat, *Fucus* omnium interdum maximus, trium quatuorve cubitorum, teres, luteus (tenerior, qui solus vescus est, longe infra minimi digiti crassitudinem, corticem Castaneæ bene maturæ colore æmulatur) caulem Angelicæ maximæ crassitudine æquat: fastigium, in latas cartilagineas membranas, varie diuiditur, eo prope modo, quo balthæi pars, & qua ensis suspenditur apud Helueticos. Hic *Fucus* maximus, aut arboreus polyfchides esto. Hactenus *Cargillus*. Verum hic postremus à Palmifolio Giganteo siue *Alga latifolia Imperati*, à quo Neapoli, cum quam plurimis maritimis plantis accepimus, distingui debet.

III. *Fucus longissimo, latissimo, crassoque folio*, radice est breui, ex crassis fibris composita, ex qua pediculus crassus, rotundus, semipalmaris prodit, qui in folium expanditur: folium vnum ingentis longitudinis, pedes aliquot & vnas excedit (rarius ex vna radice duo folia, eiusdem omnino formæ & longitudinis) & latitudine uncias quatuor superat, eiusdem fere per totum folium, principio excepto, latitudinis, in medio æqualiter planum, ad utrumque vero latus parum conuolutum tortuosum & sinuosum, obscure vires, crassum, & dum terræ adhuc affixum, tactu forma gelatinæ, viscosum, & madidum: quare, propter nimium madorem vix asserrari potest, licet sapius Soli exponatur: nam quoties chartæ reponitur, maior iste cum foetore recrudescit, ita ut à corruptione non nisi post aliquot septimanas, donec plane siccetur, seruari possit. Hic in Gallijs ad maris litora versus S. Malo provenit, & è natali solo facile eruitur: unde D. Sauterus transmisit.

IV. *Fucus longissimo, latissimo, tenuique folio*: hic priori non multum absimilis, qui ex radícula nigra, fibrosa, pediculum tenuem, triuncialem emittit, qui in folium sesquicubitalis longitudinis, unciarum quinque vel sex latitudinis, planum, per margines hinc inde conuolutum, absumitur: coloris pallide virentis est, substantiæ tenuissimæ membranæ: hunc cum alijs maris Mediterranei purgamentis reiectum, non longe à montis Cetij radice, collegimus.

V. *Fucus*


V. *Fucus* longo, angusto, & crasso folio: radice est rotunda & plana, ex qua bina, ternave folia (siue cauliculi, si mauelis) sesquipalmaria, crassa, coriacea & plana, ligulas referentia prodeunt, quæ in alias velut ligulas, sed rarius, diuiduntur. Hic ad *Fucum* maritimum secundum Dodonæi editionis Belgicæ referri posse videtur, cuius species altera breuiore & angustiore folio dici poterit. Hunc quoque à D. Sarlero habemus.

VI. *Fucus* membranaceus ceranoides: hic instar *Lactucæ* marinæ tenuis, palmum excedens, caule est vnciam & semunciam lato (mire varians) qui in plurimas alas modo latiores, modo angustiores, hæque in breuissimas easque plures cornuum modo subdividuntur. Huius species varias esse, scopulis adnasci, Scotis Dils dici, eiusque esum contra Picam commendari, D. Cargillus, planta addita, perscripsit.

VII. *Fucus* maritimus Gallopauonis pennas referens: hic membranaceus est, sese sensim late expandens, qui in plures lacinias semicirculares sibi quandoque incumbentes diuiditur, per quas variæ striæ semicirculares, variegatæ, diuersæque latitudinis, vt in pennis Gallopauonis eleganti spectaculo feruntur. Hic scopulis maritimis adnascitur: quamuis etiam ex Mitulis, cortex huius *Fuco* similis, eximatur: hunc à D. Cargillo ex Scotia accepimus.

VIII. *Filum* maritimum Germanicum: hoc exiguu lapillo innascitur, & in plurima bicubitalia, angustissima, nigricantia, læuia, crassiuscula & firma, aliquando inter se complicata fila, absumuntur. Hoc ex mari Baltico accepimus, & incolis Meerfaden, & Meerstrang dici accepimus.

Alga bombycina: *Alga* hanc ex Scotia accepimus, quæ instar *Gossypij* siue bombacis mollis & compacta, late expansa, aquis dulcibus innatat, superne pallide virēs, inferne albicans: hoc *gossypio*, quod ex veteri thorace, cui suffultum erat, eximitur, similem est.



CARDVVS.

CAPVT IX.

I. *CARDVVS* mollis latifolius: caule est cubitali, striato, breuibus & mollioribus spinis armato: folijs Rumecis forma, tenuibus, læuibus, venosis, palmum longis, vncias quatuor latis, marginibus exiguis spinulis dentatis, caulis summitas in pediculos breues vnciales abit, quorum singuli capitulum Lappæ vulgaris forma, eiusque fere magnitudinis sustinent, quod in stamineum purpureum florem expanditur. Hunc D. Burserus in Austriæ monte Taurero Rastadiensium legit.

II. *CIRSTVM* angustifolium: ex radice nigra fibrosa, caulis cubito altior effertur, membranosis alis asperiusculis vestitus, in ramos diuisus, quorum singuli in pediculum oblongum, eumque nudum, abeunt, cui capitulum vnicum hispidum insidet, quod in florem stamineum rubentem aperitur, & tandem in lanuginem absumitur. Folia habet ad radicem palmaria, vncia angustiora, atrouirentia, in ambitu raris aculeis prædita: ac quæ in caule, breuia sunt, nonnihil lacinjata, & aculeis magis exasperata. Hoc in monte Wasserfall legimus.

III. *CARDVVS* sphærocephalus acutus vulgaris: ex radice crassa, caulis cubito altior, statim in ramos brachiatus, effertur, qui crassus, lignosus, membrana alata spinosissima usque ad summum inuestitur: quem folia pediculo latiore amplectuntur, quæ profunde lacinjata, palmaria, duas tresve vncias lata, per ambitum crebris & acutissimis, pallide flauescētibus spinis armata. Caulium summis, capita rotunda, pene sphærica, acutissimis spinis horrida, insident, quæ in florem stamineum purpurascētem explicantur, & tandem in pappū abeunt, cui semen *Cnico* sylvestri simile includitur. Hæc frequens est in dumetis humidis, quamuis etiam secus vias reperiatur.

IV. *CARDVVS* lanceatus angustifolius: hic caulibus est bicubitalibus, rotundis, striatis, hispidis & firmis, oblongis, acutis, albicantibus spinis horridus, hinc inde membrana ala donatus, & in summo in ramulos diuisus: circa hunc folia rariora, palmum æquantia, angusta, in lanceam oblongam, eamque latiore, quam in *Cardeo* lanceato latifolio, abeuntia, raris & breuibus lacinijs diuisa, subtus incana, superne atrouirentia, spinis


longis donata: cauliculorum summis capitula plura, parua, ex imbricatis squamis composita, insident, quæ in stamina atrorubentia, apicibus diuisis expanduntur, & aliorum more in pappum & lanuginem resoluuntur, semenque exiguum in ea occultatur. Hic & flore albo quandoque reperitur. Hunc in nemore ad pontem Wiesam obseruare licet.

V. *CARDVVS* palustris: radice est simplici, caule tricubitali, foliaceo, erecto, nonnihil ramoso, breuib. spinis armato, folijs atrouirentibus, crassis, sinuosis, quandoque etiam lacinjatis, semipalmatis, sesquiunciam latis, per marginem rarioribus spinis cinctis; caulis summo capitula plura, singula singulis pediculis insident, quæ in florem, stamineum purpurascens expanduntur, dein in pappum aliorum more abeunt. Hic ad Wiesam locis arenosis, herbosis, & Michelsfeldensibus palustribus, prouenit.

VI. *CARDVVS* polycephalus angustifolius: radicem habet lignosam, fibrosam, caulem cubito altiore, rotundum, striatum, spinis carentem, cuius summitas in plures semipalmates ramulos, & hi quandoque in breuiiores, diuiditur: folia sunt pauca, angusta & breuia, spinis oblongis armata: capitula plura, parua, quibus minima subiiciuntur, exiguis spinulis prædita, & flos laceæ similis ex staminibus purpurascens compositus, insidet, qui similiter in lanuginem abit. In pratis Michelsfeldensibus frequens occurrit.

VII. *CARDVVS* repens vinearum: ex radice oblonga, nigricante caulis prodit reclinatus, rarius erectus, pedalis, incuruus, striatus, candicans, cuius summum in ramulos paucos, eosque breues absumitur, qui capitula parua laceæ vulgari similia, sustinent: folia ad radicem plura, superne atrouirentia, inferius incana lanugine aspersa, semipalmaria, vnciam lata, leuiter sinuata, spinulis per circumferentiam donata: ar quæ caulem ambiunt in profundas lacinias diuiduntur, palmaria, duas tresve vncias lata, existunt. Hic in vinetis Mutensibus frequens est.

VIII. *ANONIS* viscosa minor flore pendulo: plantula est semipalmatis, totaque hirsuta: radice alba, oblonga, tenui, parum fibrosa, à qua cauliculi plures, duarum triumve vnciarum, exurgunt, iique tenues, rotundi, foliolis paruis, plerumque ternis ex vno pediculo prodeuntibus, forma & situ vulgaris Anonidis similibus, viscosi: flores parui sunt, lutei, propendentes, quibus minutum semen in exigua siliqua succedit, & nullis spinis donatur. Ex Gallia Narbonensi habemus.



LIBER VNDECIMVS

CYTISVS.

CAPVT I.

CYTISVS Hispanicus filiquis Ornithopodij: hic virgis est rotundis, striatis, duris, tricubitalibus, in varios ramos nonnihil lanuginosos brachiatis, quos folia numerosa, terna vni pediculo inherencia, in summis ramulis exigua, dilute virentia, ambiunt: flores parui, lutei, Genistæ similes, quibus filiquæ vnciales, molli hirsuticæ, instar filiquarum Ornithopodij, minus tamen profunde sinuatae, & plures simul iunctæ, ternæ, quaternæ, quinæ vni pedicello inherentes, quibus semina parua, plana, nigricantia inclusa sunt. Hic in Hispania, ad agrorum limites frequens est, non tamen cum Cytiso primo Clusij, cuius pars interior nigricat, & ramuli toti villo obfiti sunt, confundi debet.

COLUTEA.

CAPVT II.

COLUTEA, Scorpioides maritima glauco folio: virgis est pedalibus, rarius cubitalibus, lignosis, rotundis, rufescente, rugoso cortice vestitis, in frequentes ramos diuisis: folia alata, septem, aut nouem, vni costæ, binis semper ex aduerso sitis, adhaerent, vno impare extremam alam occupante, Colutæ folijs similia, sed multo minora, obtusa & cordata, glaucique vel cæsi coloris: flores & forma & colore Colutæ similes, sed minores: pediculis tenuibus filiquæ, tenues, oblongæ vnciales, articulis distinctæ insident, quarum singulis articulis, singula semina parua inclusa sunt.

Hæc in maritimis prope Teracinum collecta, quamuis etiam Patauio, ex horto Bembianio habeamus.

GENISTA.

CAPVT III.

GENISTA Hispanicæ affinis: suffrutex est cubitum superans, caule tenui, tereti, candicante cortice tecto, qui in plurimas virgas tenuissimas diuiditur, quarum aliquæ palmum superant, aliæ minores sunt: circa quas folia longiuscula, angustissima & rarissima, ita vt virgæ pene nudæ appareant: summis virgis singulis vnicum capitulum rotundum, villosum, molle, insidet, vt in Gramine maritimo siue polyanthemo maiore, ex pluribus floribus, Genistellæ tinctoriæ forma, sed minoribus pallide luteis compositum: nam quilibet flos, ex caliculo villosa, hirsuticæ albo prodit. In montibus plane saxosis ad aquas Blancas D. Albinus collegit.

GENISTELLA Monspelica spinosa: hæc viticulis est palmaribus, in terram reflexis, quorum pars inferior in breuissimos ramulos, ex paruis spinulis constantes diuiditur, à medio vero sursum villosi sunt, quandoque in ramulos brachiati, oblongis viridibus folijs, minoribus sæpe additis, vestiti, spinisque carentes: summitatibus, flores pallide lutei, forma Genistæ spinosæ vulgaris similes, insident. Hanc quidam Monspelluli Corrudam luteam vocabant: quæ etiam in Ventoso monte reperitur.

Similem sed per omnia maiorem, caulibus pedalibus, folijs rarioribus, spinis longioribus, minusque pungentibus, floribus maioribus & aureis, quasi in spica dispositis, ex Hispania habemus.

GENISTELLA minor Aspalatioides: suffrutex est pedalem altitudinem superans, stipite rotundo, rufo cortice vestito, lignoso, hinc inde spinis, sed rarioribus, armato, in ramos, qui in minores

subdiuiduntur, brachiato: circa quos foliola rara, parua, quædam subrotunda, quædam oblonga, spinis interiectis, quibus flores lutei, Genistæ prædictæ duplo minores, hinc inde componuntur, nec, vt in priore, ramulorum summis, in aculeum abeuntibus, insident. Hanc, ex Anglia Genistæ spinosæ nomine accepimus: at eandem in asperis, circa Aureliam Gallorum, ramis late se spargentibus, collegimus.

CHAMÆGENISTA Cretica: hæc virgulis est palmo minoribus, humi diffusis, tenuibus, rotundis, subcanis, in ramulos aliquot duarum, trium vnciarum diuisis, foliolis oblongis, angustissimis, binis aut ternis ab eodem exortu, sed altero semper longiore, prodeuntibus, incanis: ex foliorum alis flosculi terni, quaterni, parui, lutei, Genistæ floribus æmuli: siliquas non vidimus, Ex horto nobiliss. Contareni habemus.

SVMACH.

CAPUT IV.

SVMACH angustifolium: hoc potissimum folijs à vulgato differt: huius enim folia vncias quatuor longa, semiunciam lata sunt, in exquisitum apicem desinunt, & per marginem crenata sunt, quorum duodecim vni costæ, vtrinque nimirum sex, adherent, vndecimo imparem numerum, constituentem, quæ superne atrouirent, inferne pallida sunt, costæ elata per longum excutiente. hoc in Brasilia apud Tououpinambaultios collectum & à D. Bursero communicatum.

MELEGVETA.

CAPUT V.

MELEGVETA siue Grana Paradisi: folia crassa sunt, vncias quatuor longa, tres lata, per quorum longitudinem costæ elatæ fertur, à qua fibræ plurimæ pertransuersum abeunt, vt in Caryophyllorum folijs cum quibus maximam similitudinem habent: fructus satis cognitus, habetur in officinis, vt & Grana exempta: huius folij pediculus, sapore est aromatico, ipsis granis correspondente, non tamen ita acuto & aromatico, vt in folijs Caryophyllorum animaduertitur, quo signo potissimum à se inuicem distingui possunt. Huius folia vna cum

Nucis moschatæ folijs, D. Clutius Amstelrodami misit.

STYRAX LIQVIDA.

CAPUT VI.

STYRACIS liquidæ folia: ex radice rotundo, nigricante, rugoso, striato & quasi articulatæ cortice tecto, folia terna, etiam quina, oblongis, tenuibus, nigricantibus pediculis donata, ex vno veluti tuberculo prodeunt, quæ vitiginea sunt foliorum Aceris, vel Platanus instar, in lacinias ternas, etiam quinas diuisa, neruosa, per circumferentiam crenata, & mucronato cuspe. Hæc ab Honorio Belli accepimus, qui styracis huius magnum ramum se habere perscripsit.

LIGVSTRUM.

CAPUT VII.

LIGVSTRUM duplex ex Italia accepimus, de vtroque breuiter in præsens, cum solum ramos absque floribus & seminibus acceperimus.

I. LIGVSTRUM Myrtifolium: hoc ad Ligustri vulgaris modum excrecere, & in ramos brachiari audio: rami rotundi sunt læues non nihil rufescentes: folia atrouirentia, vulgaris folijs & latiora & longiora. Hoc nomine, Ligustri myrtifolij perpetui, vel Myrti Ligustri folio, Parahio ex horto Pharmacopæi (cuius nomen excidit) ad pontem molin accepimus.

II. LIGVSTRUM folijs lacinia: & huius ramos pedales habemus, circa quos folia atrouirentia, glabra, inferiora quidem subrotunda, alia vero oblonga: hæcque modo integra, modo lasmini lutei instar diuisa, quandoque ab altero solum latere, laciniam vnā, quandoque vtrinque vnā, rarius binas, quandoque ternas, quaternas, inordinatas lacinias obtinent. Hoc primum Ligustri nigri nomine, ex horto Ill. Mori Senatoris Veneti, quem in villa di Carbonara colit: dein, pro Syringa lacinia: folijs, ex horto Ill. Contareni Sen. Veneti accepimus: de vtroque plenius in Theatro nostro.

—(30)—

SALIX.

CAPVT VIII.

I. SALIX fragilis: hæc mediocris est altitudinis, caulibus ramosis, rotundis, rubente cortice vestitis: folijs longis, angustis, prona parte incanis, superius atrourentibus, & tandem pene nigris: iulis quam in cæteris breuioribus. Fragilem appellare lubet, quia non aliarum Salicum instar virgis lentis & vimineis, sed plane fragilibus donatur. Nostri *Brandweiden* eo quod tandem nigrescat, dicitur: frequens ad *Birsam* & *S. Iacobum*.

II. SALIX oblongo incano folio: huius caules, cortice atrorubente vestiti, in breues & plures ramulos diuisi: folijs oblongis, superna parte obscure virentibus, parte prona cinereis & incanis: flores copiosos aliarum salicum modo producit, & semen paruum nigrum, cum albissima lanugine auolat: hæc apud nos frequens, in primis in minore vrbe, ad molendum ærarium, in sepibus ad aquam.

III. SALIX subrotundo argenteo folio: hæc caulibus est cubito altioribus, rotundis, incanis & ramosis: folijs subrotundis, supernè nigricantibus, parte prona incanis, argentei coloris, splendētib; tactu mollibus, & veluti tenui lanugine pubescentibus, per ambitum raris crenis exasperatis. Hanc sine fructu ex Belgio *D. Gallus* transmisit.


IV. SALIX humilis latifolia erecta: hæc salic; latifolia aquaticæ acuto folio similis est, sed humilior, cum huius virgæ rotundæ striatæ, vix cubitum superent: folia minora sunt, ex rotunditate oblongata, in acumen desinentia, rugosa,

parte prona lanuginosa, tactu mollia iuli rotundi, parui, flauis: hæc cum latifolia repente confundi non debet. Michelfeldæ in humidis.

V. SALIX alpina angustifolia repens: ex radice, atrorubente cortice recta, cauliculi palmares humi fusi prodeunt, qui capillaceis radicibus terræ affiguntur, ramulis tamen paucis sursum elatis: foliolis oblongis, latiusculis, breuib; cincti: flores vt in cæteris, quibus abientibus, nullus salicem esse crederet. Hæc in Heluetiorum alpiis & monte *Fracto*, frequens est.

VI. SALIX alpina Pyrenaica: hæc ad semicubitalem altitudinem vix assurgit, virgis tenuibus, ramosis, folijs oblongis, paruis, per circumferentiā pilosis, tactu holoserici instar, ob minutissimos pilos, mollibus: spicæ florum vnciales, angustæ, molles sunt. In summitatibus Pyrenæi *D. Burserus* legit.

VII. SALIX saxatilis minima: hæc duas vncias vix superat, quæ ex radícula caudicem crassiusculum, vix semiuncialem emittit, qui in binos ternosve vnciales ramulos, terræ incumbentes, diuiditur: folia sunt parua, oblonga, subrotunda, atrourentia, venosa, quorum medio capitulum paruum subrotundum, veluti ex multis baccis compositum, insidet, quibus maturis apertis, veluti ex triangulari caliculo, mollis, candida & brevis lanugo effertur. In alpium Heluetiorum iugis, saxis insidens, reperitur.



LIBER DVODECIMVS.

S A N A M V N D A.

CAPVT I.

SANAMVND A viridis vel glabra: radice est crassa, lignosa, fibrosa, alba, cortice crasso pallido, len-
to vestita, à qua ramuli plures, tenues, palmares, et-
iam minores, ii que geniculati prodeunt; foliis ob-
longis (rarius subrotundo) Chamæleæ vel potius
Polygalæ similibus, sed breuioribus, viridibus &
glabris, alternatim circa ramulos dispositis: inter
quæ flores oblôgi, luteoli, in quatuor foliola diuisi
conspiciuntur: fructum non obseruauimus. Hæc
Aprili florens, Monspeßuli in horto Dei collecta
fuit.

FRANGVLA.

CAPVT II.

FRANGVLA altera polycarpus: frutex est Fran-
gulæ siue Alni nigrae similis, ramosus, cortice
candicante vestitus: folijs subrotundis in apicem
plerumque abeuntibus, plurimis neruis elatis per
ea discurrentibus, quare instar foliorum Vlmi ru-
gosus, tenuissime per marginem serratis: Flores ha-
bet forma Frangulæ vulgari similes, paruos, stella-

tos, luteolos, copiosos, velut in racemo cohæren-
tes, quibus succedunt fructus parui angulosi com-
pressi, Spinæ infectoriæ baccis correspondentes,
ex minimis pediculis dependentes. Hæc vere flo-
rens in quibusdam dumetis, etiam in monte no-
stro Muteto, reperitur.

RIBES.

CAPVT III.

RIBES montana oxyacanthæ sapore: duplex Ri-
bes in Heluetiorum alpibus reperitur: altera,
quæ frutice & folijs, sed minoribus vulgari conue-
nit: fructum v. habet rubrum, hortensi duplo pene
maiores, sapore oxyacanthæ fructui responden-
tem; in Valesianorum montibus reperitur. Altera,
humilior est, & per omnia minor, baccis vulgari
minoribus, minusc; acidis: in Bernatum montibus
prouenit. Et hæc ad gloriam Dei dicta sunt,
cui sit laus honor & imperium
in sæcula.

FINIS.



INDEX

PRODROMI THEA- TRIBOTANICI;

Quo plantæ supra sexcentæ vna cum aliis
continentur.

*Primus numerus paginam,
Secundus pagina segmentum,
Tertius paragraphum denotat.*

A.



*Brotaum Campestre inca-
num, Carlinæ odore, 71. I.
vbi proueniat ibid.*

*Absynthium Ponticum Creti-
cum grati odoris, 71. I. I.
Græca lingua quomodo re-
cte vocetur ibid.*

*Absynthium alpinum incanū,
71. I. II. vbi nascatur, ibid.*

Absynthium alpinum candidum humile ibid. III.

*Absynthium alpinum umbelliferum, 71. 2. IV. quando in-
uentum nouum, ibid. quæ eius varietas ibid.*

*Acetosa Americana foliis longissimis pediculis donata, 54.
2. I.*

Acetosa rotundifolia alpina 55. I. II.

Acetosa scutata repens 55. I. III.

Acetosa Cretica semine aculeato ibid. IV. & 2.

Acetosa lanceolata angustifolia repens ib. V.

*Adiantum fruticosum Brasiliæ, 150. 2. vbi nascatur
ibid.*

Ethiopis laciniato folio 115. I.

*Alchimilla alpina quinquifolia, 138. 2. quo mense floreat,
& quibus locis reperiatur ibid.*

Alga bombycina 155. 2. VIII.

Allium iuncifolium bicornè luteum 27. 2. I.

Allium montanum minus ibid. II.

*Allium montanum radice oblonga, ibid. III. vbi proueniat
ib. d.*

*Alfene palustris minor serpillifolia, 118. I. I. quibus locis pro-
ueniat ibid.*

*Alfene palustris minor folio oblongo, 118. I. II. alias Portula-
ca aquatica ibid.*

Alfene alpina glabra ibid. III.

*Alfene alpina iuncto folio, 118. I. IV. quo anni tempore flo-
reat & vbi nascatur ibid.*

Alfene minor Androsaces alterius Matthioli facie. 118. 2. V.

*Alfene verna Androsaces capitulis, ibid. V. I. cuius soli sit a-
lumna*

INDEX.

<i>Alfina minima</i>	ibid.	<i>Bellis spinosa folio Agerati</i>	ib.
<i>Alfina alpina minima glabra</i> , 118. 2. VII. vbi reperitur		<i>Bellis spinosa forma bellidis carulea</i>	121. 2. V.
ibid.		<i>Bellis spinosa flore globofo</i>	ibid. VI.
<i>Alfina nodosa Germanica</i> , ib. VII. alias <i>arenaria</i> & quare sic dicta	ibid.	<i>Bellis hortensis pediculo foliofo</i>	ibid. VII.
<i>Alfina Spergula facie</i> , siue <i>Spergula minor subcaruleo flosculo</i>	119. IX.	<i>Beta Cretica semine aculeato</i>	57. 1. & 2.
<i>Althaea Bryonia folio</i> , 138. 1. I. alias <i>Althaea arborefcens</i> semper virescens	ibid.	<i>Bissem Dlagelin</i>	103. 1. IV.
<i>Anagallis Aquatica angustifolia scutellata</i> , 119. 1. vbi proueniat ibid.		<i>Bistorta alpina maxima</i> , 100. 1. in altissimis Silesiorum montibus reperitur	ib. 2.
<i>Anemone tenuifolia Cretica albo magno flore</i>	93. 2. I.	<i>Brassica spinosa</i>	54. 1. & 2. II.
<i>Anemone syluestris alba minor</i>	93. 2. II.	<i>Brassica syluestris alpina</i>	54. 2. III.
<i>Anemone alpina alba maior</i>	94. 1. III.	<i>Brandwenden</i>	159. 1. I.
<i>Anemone alpina alba minor</i> , ibid. IV. quo loco proueniat ibid.		<i>Bryonia Cretica maculata</i> , 135. 1. I. vbi frequens fit	ib.
<i>Anethum syluestre minus</i>	76. 2.	<i>Bryonia syluestris baccifera</i> , 135. 1. II. quo tempore floreat	ib. a communi Bryonia syluestri quomodo differat
<i>Antirrhinum saxatile folio serpilli</i> , 106. 1. vbi enascatur ib.		<i>Bryonia Mechoacana nigricans</i> , 135. 1. III. alias <i>Lalapium</i> vel <i>Gelapo</i> , item <i>Mechoaca nigra</i> , vel <i>mal.</i>	ib.
<i>Angelica syluestris hirsuta inodora</i> , 82. 2. quibus locis proueniat, ib.		<i>Bursa pastoris maior folio non sinuato</i>	50. 2. I.
<i>Ancnis viscosa minor flore pendulo</i> , 156. 2. VIII. vnde habetur	ibid.	<i>Bursa pastoris maior loculo oblongo</i> , 50. 1. & 2. II. nonnullis	
<i>Apium hortense maximum</i>	81. 1.	<i>Thiastri Veronica folio nominatur</i>	ib.
<i>Apium peregrinum foliis subrotundis</i> , 81. 2. vbi reperitur	ibid.	<i>Bursa pastoris alpina hirsuta</i>	51. 1. III.
<i>Aquilegia montana magno flore</i>	75. 1. I.	<i>Büscheierbß</i>	147. 2.
<i>Aquilegia montana paruo flore thalictri folio</i>	ib. II.		
<i>Aquilegia hortensis multiplex flore paruo</i>	ib. III.		
<i>Argemone alpina lutea</i>	93. 2. IV.		
<i>Arundo Anglica foliis in summitate dissectis</i>	25. 2. II.		
<i>Arundo Indica latifolia flore luteo punctato</i> , ibidem III. & 26. I.			
<i>Ascyron magno flore</i> , 130. 2. hoc <i>ascyro</i> vulgari, siue <i>Hyperico dumetorum</i> simile, ib. vbinam reperitur	ib.		
<i>Aster hirsutus Austriacus caruleus magno flore</i> , 124. 2. vbi reperitur	ibid.		
<i>Atriplex syluestris fructu compresso roseo, vel stellato</i>	58. 1. I.		
<i>Atriplex syluestris, vel Pes anserinus</i>	ibid.		
<i>Atriplex syluestris lappulas habens</i> , 58. 1. & 2. II. alias <i>atriplex syluestris insipida parua erecta</i>	ib.		
<i>Atriplex maritima angustifolia</i> , ib. III. vbi proueniat ibid.			
B.			
<i>Bellis alpina maior rigido folio</i>	120. 2. I.		
<i>Bellis alpina minor</i>	ib. II.		
<i>Bellis montana maior folio acuto</i> , 121. 1. II. vbi nascitur	ibid.		
ibid.			
<i>Bellis montana folio obuso crenato</i>	121. 1. IV.		
<i>Bellis maritima foliis Agerati</i>	121. 2. V.		
<i>Bellis spinosa quatuorplex</i>	ibid.		
		<i>Calalia tomentosa</i> , 102. 1. vbinam locorum reperiri so-	102. 2.
		leat	
		<i>Calamenta vulgaris flore exiguo</i> , 110. 2. vbi proueniat	ib.
		<i>Calamus. Vide Arundo.</i>	
		<i>Calamus aromaticus Syriacus</i>	25. 2. I.
		<i>Cameorchis alpina folio gramineo</i>	29. 1. III.
		<i>Campanula alpina latifolia flore pullo</i>	33. 2. III.
		<i>Campanula alpina latifolia carulea</i>	34. 1. IV.
		<i>Campanula alpina rotundifolia minor</i>	ibid.
		<i>Campanula rotundifolia minima</i> , 34. 2. V. quo loco copiosissime proueniat	ibid.
		<i>Campanula Cymbataria folijs</i>	34. 2. VI.
		<i>Campanula serpillifolia</i>	35. 1. VII.
		<i>Campanula folijs subrotundis</i> , 35. 2. I. hac à <i>Campanula hortulensi rapunculi radice</i> quomodo differat	36. 1. I.
		<i>Campanula Draba minoris folijs</i>	36. 1. II.
		<i>Campanula folijs Echj floribus villosis</i> , 36. 37. 1. III. minor eius species	ibid.
		<i>Campanula alia folijs Echj, quam Clusij nomine Trachelij</i> <i>Θυρεοειδ.</i> descripsit	ibid.
		<i>Cannabina aquatica similis capitulis nutantibus</i> , 138. 2. vbi inueniatur	ibid.
		<i>Caput gallinaceum minus</i> , 149. 1. quibus locis reperitur	ibid.
		<i>Carduus mollis latifolius</i> , 155. 2. I. vbi reperitur ibidem.	

I N D E X.

Carduus Spharocephalus acutus vulgaris, ib. III. quibus locis
gaudeat ib.
Carduus lanceatus angustifolius, ibid. IV. vbi reperitur
156.1.
Carduus palustris, 156.1.V. quo loco proueniat ib.
Carduus polycephalus angustifolius, 156.1.VI. vbi frequens
occurrat ibid.
Carduus repens vinearum, ibid. 2.VII. vbi nascatur ibid.
Carui alpinum 84.1. & 2.
Caryophyllata alpina minor, 139.1. vbi colligitur ibid.
Caryophyllus arboreus Creticus, ex radice crassa, 104.
1.1.
Caryophyllus sylvestris repens multiflorus, ibid. II. vbi proue-
nit ib.
Caryophyllus sylvestris biflorus, ibid. III. vbinam reperitur
ibid.
Caryophyllus pumilus latifolius 104.1.IV.
Caryophyllus holostius alpinus latifolius ib. V. vbi reperitur
104.2
Caryophyllus holostius alpinus angustifolius purpurascens,
104.2. VI.
Caryophyllus holostius alpinus gramineus, ib. VII. vbi proue-
niat ibid.
Caryophyllus holostius montanus angustifolius albus, ibid.
VII.
Caryophyllus holostius tomentosus latifolius, 104.2. IX. a-
lias *Ocymoides tomentosus*, ibid. vbinam proueniat ibid.
Caryophyllus holostius tomentosus angustifolius, 104.2. X.
& 105.1.
Caryophyllus aruensis glaber minimus 105.1. quomodo va-
riet 105.2. vbi proueniat consueuerit ibid.
Caryophyllus saxatilis ericifolius umbellatis corymbis, 105.
2. XII. vbi nascatur ibid.
Caryophyllus saxatilis ericifolius ramosus repens, ibi. XII.
ex Hispania qualis ad nos adferatur ibid.
Caryophyllus saxatilis siliquosus, 105.2. XIII. in Hircynia
promontorijs frequens, ibid. alias *Gypsophytum siquo-*
sum ibid.
Caucalis nodosa echinato semine, 80.1. I. alias *caucalis se-*
mine ad caulium nodos echinato ibid. 2.
Caucalis semine aspero flosculis subrubentibus 80.1. & 2. I.
Caucalis tenuis folia montana 80.2. II.
Centaurium minus spicatum album, 130.1. & 2. vbinam
reperitur ibid.
Centaurium matius 56.2.
Centaurium alpinum luteum ibid.
Cichorium spinosum Creticum 62.1.
Chamedrys spinosa 117.1. I.
Chamedrys Austriaca folijs tenuissime laciniatis 117.2. II.

Chamedrys Hispanica folijs tenuissime diuisis 117.2. III.
Chamedrys alpina minima hirsuta, ibid. IV. vbi reperitur
ibid.
Chamedrys spuria minor angustifolia 117.2. V. vbi occur-
rat ibid.
Chamamelum leucanthemum Hispanicum magno flore 20.2. I.
Chamamelum luteum Hispanicum odoratum ib. II.
Chamamelum leucanthemum incanum Hispanicum mi-
nus ib. III.
Chelidonia rotundifolia maior, 137.1. quib. locis proueniat
ibid.
Chelidonium maius folijs quernis flore laciniato 74.2
Chondrilla viminea viscosa monspeliaca 68.1. I.
Chondrilla viscosa humilis 68.1. & 2. II.
Chondrilla purpurascens fetida ib. III.
Chrysanthemon latifolium Brasilianum 70.1
Cicer montanum 147.2. I. quo anni tempore, &
quo loco proueniat 148.1. I.
Cicer montanum lanuginosum erectum 148.1. II.
Cicer astragaloides erectum ibid.
Cirsium angustifolium, 155.2. II. vbinam colligatur ib.
Clematis maritima repens, 135. vbinam reperitur ib.
Clematis alpina Geranifolia, ib. II. vbi nascatur 136.1
Crista Galli umbellata 85.2. I.
Crista Galli angustifolia montana 86.2. II.
Cochlearia minor erecta 53.2. I.
Cochlearia Danica repens ib. II.
Conuoluulus purpureus folio rotundo, 134.1. I. quando flo-
reat ibid.
Conuoluulus peregrinus caruleus folio oblongo, ib. II. alias
Campanula carulea ibid.
Conuoluulus folijs laciniatis, vel quinquefolius 134.1. III.
Colutea, Scorpoides maritima glauco folio, 157.1. vbi nas-
catur ibid.
Consolida media alpina 120.
Consolida regalis latifolia paruo flore 74.1
Consolida regalis peregrina paruo flore ibid.
Conyza carulea alpina maior, 124.1. I. vbi proueniat ibid.
Conyza carulea alpina minor, ibid. II. vbi reperitur ibid.
Conyza aquatica Asteris flore aureo, ibid. III. vbi legatur
124.2
Corallina alba nodosa, 153.2. I. vnde ad nos deferatur ibid.
Corallina cinerea rugosa, 153.2. II. quotuplex sit ib.
Corallina pallide flauescens levis 153.2. III.
Coronopus maritimus minimus 98.2
Cotyledon minor folijs subrotundis serratis 133.1
Cynocramba Dioscoridis 59.2
Cynoglossum semper pirense 119
Cynosorchis angustifolia hianthe cusullo 28.1.

I N D E X.

D.

- D**aucus montanus apij folio flore luteo, 77.1.1. huic al-
ter similis ibid.
Daucus pratensis apij folio 77.2.II.
Daucus Alsaticus ibid.III.
Daucus pratensis tenuifolius 85.1. & 2.II.
D. ns Leonis latifolius caulescens 62.2.I.
Dens Leonis tenuissimo folio ibid.II.
Dens Leonis minor foliū radiatis ibid.III.
Dens Leonis minor aspero folio 63.1.IV.
Digitalis angustifolia luteo paruo flore, 115.2. vbi proueniat
ibid.
Doronicum Helueticum incanum, 97.1.1. vbi locorum cre-
scat ibid.
Doronicum Helueticum humile, crassū foliū, ib.11. quo n. en-
se & loco flore at ib.
Draba tenuifolia velut spicata 53.1.I.
Draba flore ceruleo galeato ibid.II.
Dracunculus alpinus folio scabioso 39.1.

E.

- E**chium Hispanicum flore calcari donato, 119.1.1. vbi
nascatur ibid.
Echium Scorpioides minus flosculus luteis, 119.2.II.
Ellebrus nigr. r Sannicula folio minor, 97.1. veratrum ni-
gram Dodonai siue Astrantiā nigram Lobelii per om-
nia refert, sola autem magnitudine differt, ibid. vbinam
locorum reperiatur 97.2.
Equisetum palustre linaria scoparia folio 24.2.I.
Equisetum palustre minus polystachion ib.II.
Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis, ibidem
III.
Equisetum nudum minus variegatum Basileense, ibid. IV.
& 25.1.
Equisetum fetidum sub aqua repens 25.1.V.
Eruca latifolia, 39.1.1. an Eruca tertia Anglica ib.
Eruca sylvestris minor Bursa pastoris folio 39.2.II.
Eruca sylvestris minor incana ibid.III.
Eruca lutea siue Barbarea flore pleno ib.IV.
Eruca cerulea in arenosis crescens, 40.1.V. prouenit locis a-
renosis ibid.
Eruca maritima Cretica siliqua articulata 40.2.VI.
Eruca maritima Italica siliqua hasta cuspidi simili ibid.
Eruca Monspelica siliqua quadrangula echinata, 41.1.
VII.
Erysimum similis hirsuta alba 42.2.

- Erysimum tertium 43.1.
Euphrasia lutea radice squamata, III.2.1. vbi nascatur,
ibid.
Euphrasia purpurea minor, III.2.II. vbi proueniat ibid.

E.

- F**aba arborecens 147.1.
Fabarum differentia quot ibid.
Faba arborecens Anglica species quot ibid.
Festuca graminea glumis vacuis 19.1.LXIV.
Festuca graminea effusa iuba 19.2.LXV.
Festuca iuncea folio ibid.LXVI.
Festuca iuncea folio spica gemina ib.LXVII.
Festuca pratensis lanuginosa ibid.LXVIII.
Festuca dumetorum ib.LXIX.
Festuca dumetorum angustissimis & pilosis foliis, ibidem

L X X.

- Filipendula minor 85.1.
Filix palustris maxima 150.2.I.
Filix mas aculeata maior, 151.1. II. vbi legatur ibid.
Filix mas aculeata minor, 151.2. III. vbi proueniat ibid.
Filum maritimum Germanicum, 155.1. VIII. vbi reperia-
tur ibid.
Fragaria affinis Sericea incana, 139.2. alias Leucas aduer-
sarium, ibid. & quibus locis prouenire soleat ib.
Frangula altera polycarpus, 160.1. quo anni tempore flo-
reat, & quo loco 160.2.
Fucus maritimus 154.1.
Fucus alatus siue phasganoides ibid.I.
Fucus arboreus polyschides 154.2.II.
Fucus longissimo, latissimo, crassoque folio, ibid. III. vbi repe-
riatur, ib.
Fucus longissimo, latissimo tenui q. folio, ibid. IV. vbi colli-
gatur 155.1.
Fucus longo, angusto & crasso folio 155.1.V.
Fucus membranaceus ceranoides ibid.VI.
Fucus maritimus Gallopaonis pennas referens, 155.1. VII.

G.

- G**allium latifolium glabrum 146.1. VII. vbi reperiatur
ibid.
Genista Hispanica affinis, 157.2. quo loco proueniat ibid.
Genistella Monspelica spinosa, ibid. alias Corruca lutea
ibid.
Genistella minor Aspalatioides 157.2.
Gentianella alpina latifolia magno flore, 97.2.1. quo loco
proueniat ibid.
Gentianella omnium minima, ibid. II. in summis Alpium
Helueticarum iugis reperitur ibid.
Geranium malacoides minus, 138.1.1. quib. locis reperiatur
ibid.

I N D E X.

ibid.
 Geranium columbinum tenuius laciniatum, ib. II. vbi pro-
 ueniat ib.
 Geranium cicutae folio aculeo longissima, 138. I. III. vbi legatur
 138.2
 Gladiolus angustifolius gramineo folio, 26. I. quo loco proveniat
 ibid.
 Glauci leguminosa affinis 150. I.
 Gnaphalium roseum, 122. I. quibus locis provenire soleat
 ibid.
 Gnaphalium roseum hortense 122.2.
 Gramen caninum vineale, 1. I. eius descriptio, ibi. vbi nam
 reperitur ib.2. I.
 Gramen Caninum supinum paniculatum dulce, 1.2. II.
 quibusnam locis gaudeat ibid.
 Gramen Caninum maritimum asperum, 2.1. III. in quibus
 locis reperitur, ibid. à Lobelio quomodo vocetur, ib.
 Gramen Caninum maritimum spicatum, 2.2. IV. vbi pro-
 ueniat ibid.
 Gramen murorum 2.2. V. vbi provenire soleat ibid.
 Gramen nodosum spica parva 3.1. VI.
 Gramen nodosum auenacea panicula 3.2. VI.
 Gramen bulbosum aquaticum, 4.2. VII. vbi reperitur
 ibid.
 Gramen bulbosum ex Alepo 4.1. VIII.
 Gramen tremulum minus panicula parva 4.2. IX.
 Gramen tremulum maximum, 5.1. IX. quibus locis crescat
 ibid.
 Gramen pratense paniculatum molle 5.1. IX.
 Gramen pratense paniculatum maius angustiore folio, 5.1.
 X. quomodo ab alio simili differat & conueniat, 5.2. X.
 quibus locis reperitur ibid.
 Gramen panicula multipl. ci. 6.1. XI. vbi proveniat ibid.
 Gramen arvense panicula crispata 6.1. XI. à Matthiolo, Lo-
 belio, Dalechampsio quibus nominibus describatur, ibid.
 Gramen montanum panicula spadicea delicatior, 6.2. XII.
 quomodo differat ibid.
 Gramen paniculatum odoratum, 7.1. XIII. Borussis visita-
 tum, & quorsum eo vrantur ibid.
 Gramen syluaticum paniculatum altissimum, 7.2. XIV.
 quid ex eo rustici conficiant ib.
 Gramen palustre panicula speciosa 7.2. XV.
 Gramen palustre paniculatum minus 7.2. XVI.
 Gramen maritimum fluitans cornutum 7.2. XVII.
 Gramen spica cristata leui, vel gramen cristatum, 8.1.
 XVIII.
 Gramen spica cristata subhirsutum 8.2. XIX.
 Gramen spicatum angustifolium montanum, 8.2. XX. à
 gramine Caryophyllato pratensi quomodo differat ibid.

Gramen syluaticum angustifolium spica alba, 8.2. XXI. vbi
 reperitur ibid.
 Gramen spicatum folio aspero, 9.1. XXI. quo nomine à Da-
 lechampsio proponatur, ibid. vbi proveniat ib d.
 Gramen Caryophyllatum nemorosum spica multiplici, 9.1.
 XXII.
 Gramen Caryophyllatum montanum spica varia, 9.1. XXIII.
 vbi reperitur ib d.
 Gramen spicatum foliis & spicis hirsutis mollibus, 9.2.
 XXIV.
 Gramen typhoides maximum spica longissima, 10.1.
 XXV.
 Gramen Phalaroides minus, siue Hispanicum, 10.1. & 2.
 XXVI. Phalaridi quomodo similis & dissimilis, ibidem.
 Gillenius quo nomine transierit ibid.
 Gramen Phalaroides spica molli siue Germanicum, 10.2.
 XXVII. Vlmenses quo nomine id indigent, ibidem. vbi
 provenire soleat ibid.
 Gramen alopecuroides spica aspera, quo nomine apud Lug-
 dunensem describatur 10.2. XXVII.
 Gramen tomentosum alpinum & minus 10.2. XXVIII.
 Gramen spartum Basiliense, siue capillaceo folio maius 11.
 1. XXIX.
 Gramen spartum Hollandicum, siue capillaceo folio minus
 11.1. XXX.
 Gramen sparteum Monspeliacum capillaceo folio minimū
 11.1. XXXI.
 Gramen sparteum setas equinas referens 11.1. XXXII.
 Gramen sparteum variegatum 11.2. XXXIII.
 Gramen foliis iuncis breuib. maius, radice nigra 11.2.
 XXXIV.
 Gramen palustre iuncum racemosum semine 11.2. XXXV.
 Gramen iuncum folio articulato aquaticum, 12.1.3.
 XXXV.
 Gramen montanum iuncum capite squamoso, 13.1.
 XXXVI.
 Gramen iuncum minimum capitulo squamoso, 13.1.
 XXXVII.
 Gramen iuncum minimum alterum, 13.2. XXXVIII. à
 priore quomodo differat ibid.
 Gramen iuncum minimum maritimum 13.2. XXXIX.
 Gramen Cyperoides latifolium spica spadiceo viridi maius
 13.2. XL.
 Gramen Cyperoides angustifolium spica spadiceo-viridi
 minus 13.2. XLI.
 Gramen Cyperoides spica pendula longiore & angustiore
 13.2. XLII.
 Gramen Cyperoides spicis minoribus minusq. compactis,
 13.2. XLII. quoniam eius sint differentia 14.1. XLIII.

I N D E X.

Gramen arundinaceum plumosum album 14.1. XLIV.
 Gramen nemorosum paniculis albis capillaceo folio, 14.2. XLV.
 Gramen holosteum alpinum minimum 14.2. XLVI.
 Graminis hirsuti differentia quotnam dentur, 15.1. XLVI.
 Gramen hirsutum latifolium minus iunceae panicula, ibid.
 Gramen hirsutum capitulis psyllij 15.2. XLVI.
 Gramen hirsutum angustifolium maius 16.1. XLVII.
 Gramen spica sabrotunda echinata, vel-gramen echinato capitulo 16.2. XLVIII.
 Gramen spica plana echinata 16.2. XLIX.
 Gramen montanum panicula miliacea sparsa 17.1. L.
 Gramen arundinaceum panicula miliacea 17.1. LI.
 Gramen arundinaceum Sorghi panicula sparsa 17.2. LII.
 Gramen latifolium spica triticea compacta 18.1. LIII.
 Gramen latifolium spica triticea diuulsa 18.1. LIV. a priore quomodo differat ib.
 Gramen angustifolium spica triticea compacta 18.1. LV.
 Gramen angustifolium spica tritici mutica simili, 18.2. LVI.
 Gramen spica secatina, 18.2. LVII. vbinam proueniat ibid.
 Gramen spica brizae maius, 19.1. LVIII. vbi reperiatur ibid.
 Gramen spica brizae minus, ibi. LIX. vbi locorum proueniat ibid.
 Gramen loliaceum latifolium spica angustiore, ib. LX. cui sit simile ibid.
 Gramen loliaceum minus spica simplici ibid. LXI.
 Gramen loliaceum minus supinum, spica multiplici, ibid. LXII.
 Gramen maximum panicula loliacea ibid. LXIII.
 Gramen montanum auenaceum locustis rubris, 20.1. LXXI.
 Gramen auenaceum lanuginosum glumis rarioribus 20.2. LXXII.
 Gramen glumis varijs 21.1. LXXIII.
 Grass Polcy 108.2.

H.

H Alimus minor 59.1
 Hasenbrod 4.2. IX.
 Helichryson Orientale 123.1
 Helichryso syluestri flore oblongo similis 123.2. vbi nascatur ibid.
 Hesperis syluestris flore paruo, 103.1.1. vbinam colligatur ibid.
 Hesperis syluestris Hieracij folijs hirsuta, 103.1. II. vbi proueniat ibid.

Hieracium dentis leonis folio hirsutis asperum minus, 63.1. & 2.1.
 Hieracium minus glabrum 63.2. II.
 Hieracium dentis leonis folio obtuso minus ib. III.
 Hieracium dentis leonis folio floribus paruis ibid. IV.
 Hieracium dentis leonis folio bulbosum 63.2. V. & 64.1
 Hieracium tomentosum Hispanicum 64.1. VI.
 Hieracium maximum asperum Chondrilla folio, 64.1. & 2. VII.
 Hieracium alpinum angustissimo oblongoque folio, ibidem VIII.
 Hieracium alpinum pumilum Chondrilla folio, ibidem IX.
 Hieracium intubaceum flore luteo, ibid. X. alias Hieracium Aphacoides ib.
 Hieracium intubaceum flore magno albido ibid. XI.
 Hieracium proliferum falcatum ibid. XII.
 Hieracium minimum falcatum 65.1. XIII.
 Hieracium montanum rapifolium ib. XIV.
 Hieracium montanum folijs dentatis flore magno, ibidem XV.
 Hieracium ramosum magno flore 65.2. XVI.
 Hieracium alpinum non laciniatum flore fusco, ibid. XVII.
 Hieracium hortenense non laciniatum floribus atropurpureis centibus ib. XVIII.
 Hippuris lacustis, 25.1. V. vbinam locorum proueniat, ibid.
 Hippomara: hrum Creticum, 76.1. vbinam locorum reperiatur ibid.
 Holostium siue Leontopodium Creticum 98.2. vbinam proueniat ibid.
 Horminum Syriacum, 114.1. I. alias Aman vocatur 114.2
 Horminum angustifolium laciniatum, 114.2. II. vbi proueniat ibid.
 Horminum minus album Betonica facie, 114.2. III. vbi nascatur ib.
 Hyacinthus minimus maritimus, 26.1. & 2. vbinam reperiatur ib.
 Hyoscyamus Creticus luteus maior, 92.1. quibus locis proueniat ibid.
 Hypericum numularia folio 130.2
 Hyssopus latifolius 107.2. eius species ib.
 Hyssopifolia siue Gratiola minor, 108.1. folijs variat, ibid.
 itemq; floribus, ib. vbi nascatur 108.2
 Hyssopoides, ib. alias Halimus aquaticus ibid.
I Acea nigra angustifolia vel Lithospermi arnensis folijs, 127.1. I. vbi obseruata, ib. altera huic similis ibi.
 Iacea integrifolia humilis, 127.2. I. vbi proueniat, ib. alias Iacea

INDEX.

Iacea Austriaca repens ibid.
Iacea capite longis aculeis spinoso, 127. 2. III. à *Iacea montana* echinato capite est diuersa. 128. I. III.
Iacea laciniato Sonchi folio, siue *Iacea latifolia purpurea capitulo spinoso*, 128. I. I. V. alias *centaurium marinum*, ibid.
Iacea montana incana aspera capitulis hispida 128. I. V.
Iacea montana candidissima Stabe foliis 128. 2. VII.
Iacea montana incana laciniata capitulo hispido, ibid. VI.
Iacea tomentosa capitulo spinoso, 129. I. VIII. vbi colligatur ibid.
Iacea Babylonica ib. IX.
Iacobaea maritima siue Cineraria latifolia 69. I. I.
Iacobaea rotundifolia incana, 69. 2. II. vbi reperiatur ibid.
Iacobaea alpina foliis rotundis serratis, 70. I. & 2. vbi proueniat ib.
Iunci differentie quotnam 21. 2
Iuncus acutus maritimus caule triangulo, 22. 2. I. vbi reperiatur ibid.
Iuncus exiguus montanus mucrone carens, ibid. I. vbi proueniat ib.
Iuncus inutilis siue Chamaeschanos, 22. 2. III. vbi crescat ibid.
Iuncus acumine reflexo alter ib. IV.
Iuncus acumine reflexo trifidus, ibidem V. vbi reperiatur ibid.
Iuncellus capitulis equiseti fluitans, 23. I. VI. vbi proueniat ibid.
Iuncus alpinus capitulo lanuginoso, 23. 2. VII. quo loco reperiatur ibid.
Iuncus alpinus bornbycinus, ibidem VIII. vbi loci proueniat ibid.
Iuncus floridus minor ib. IX.

K.

K *Alimimus villosus*, 133. I. I. cum figura kali albi Dodonæi quomodo conueniat, ibid. vbi reperiatur ibid.
 alias kali hirsutum filijs *Spergula* ibid.
Kali folio gramineo, 133. I. II. vbi nascatur, 133. 2. ad *Anthylloidem* *Thalij* accedere videtur ibid.

L.

L *Lactuca folio oblongo acuto*, 60. I. I. cui sit similis ibid.
Lactuca Italica laciniata ib. II.
Lamium peregrinum Scutellaria dictum, 110. 2. vbi nam

copiose proueniat 111. I
Lapathum maritimum foetidum 56. I
Lappa rosea, 102. 2. à vulgata quomodo differat, ibid. apud
Lipsiensis frequenter reperiatur ib.
Lathyrus angustissimo folio 148. 2
Lenticula palustris latifolia punctata 153
Leucoium luteum magno flore, 102. I. à vulgari, Keiri dicto, quomodo differat, ibidem, quo tempore anni floreat, ibidem.
Leucoium luteum serrato folio ib. II.
Leucoium luteum syluestre hieracifolium, ib. III. vbi reperiatur ibid.
Leucoium album odoratissimum folio viridi, 102. 2. IV. hoc per aliquot annos durat, si in cella asseruetur ibid.
Leucoium minimum Creticum ib. V.
Leucoium maritimum minimum, 103. I. VI. vbi locorum reperiatur ibid.
Leuconarcissus. Vide *Pseudonarcissus*.
Libanotis latifolia, aquilegia folio, 83. 2. I. aroma & aristolochiam sapore redolet, ib. alias in mine *Seseli Aethiopici* folio *aquilegia* appellatur 84. I. I.
Libanotis latifolia minor semine crispo, ibid. II. alias *Cestum amarum semine crispo* ibid.
Ligusticum siue Siler montanum angustifolium, 85. 2.
Ligustrum myrtifolium 158. 2. I.
Ligustrum foliis laciniatis ibid. II.
Lilium conuallium latifolium 136. 2. II.
Limonium maritimum minus foliis cordatis, 99. 2. I. quibus locis reperiatur ibid.
Limonium maritimum minimum, ib. II. vbi nam loci proueniat ibid.
Linaria Americana paruo flore 106. 2. II.
Linaria latifolia tryphylla, ib. III. alias *Linaria latifolia Valentina* ibid.
Linaria capillacea folio erecta flore odore, 106. 2. IV. quibus locis proueniat, ib. eadem quoruplex ib.
Linaria aruenis carulea erecta, 107. I. V. duplici flore conspicua, alio in agris Lusatia, alio ad montem Cesium, ibi.
Lupinus caruleus maior villosus 148. I
Lupinus minimus 148. 2
Lychnis auricula vrsi facie, 103. 2. I. quibus aliis nominibus vocetur ibid.
Lychnis syluestris minima exiguo flore, ibi. II. vbi reperiatur ibid.
Lyfimachia hirsuta siliquosa paruo flore 116. I. I.
Lyfimachia minor ib. II.
Lyfimachia Chamænerion dicta alpina, 116. I. III. vbi proueniat ibid.
 Malua

I N D E X.

M.

M alua folio ficus	137.1.I.
Malua folio vario	ibid. II.
Malua Americana	137.1.III.
Marrubium palustre hirsutum tenuius laciniatum	110.2.
I. quo solo gaudeat	ibid.
Marrubium album villosum	110.2.II. vbi reperiatur ib.
Marrubium album crispum	ib. III.
Melampyrum luteum linaria folio	112.1. quo mense & loco floreat 112.2
Melequeta siue grana Paradisi	158.1.
Melilotus Hispanica folijs maculatis	144.
Mentha rotundifolia minor seu flore globofo	109.2.I. quibus locis gaudeat ibid.
Mentha radice geniculata	109.2.II. alias Mentha tuberosa, & Nepetba angustifolia odorata ibid.
Mentha Cattaria minor	110.1.III.
Mentha Cattaria minor alpina	110.1.IV. vbi proueniat ibid.
Millefolium maximum umbella alba	72.1.I.
Millefolium purpureum maius	ibid. II.
Millefolium incanum Creticum siue Millefolium Dioscoridis	72.2.III. in Creta quomodo vocetur ibid.
Millefolium aquaticum pennatum spicatum	73.1.IV.
Millefolium aquaticum cornutam	73.2.V.
Moly Africanum umbella purpurascete	28.1.I. quam habet odorem ibid.
Moly moschatum capillaceo folio	28.2.II.
Muscus pennatus	151.1.I. quibus locis reperiatur, ibid. eius altera species ibid.
Muscus filicinus minor	151.1.II.
Muscus abietis facie	151.2.III.
Muscus amosus repens	ibid. IV. huic similis alter ib.
Muscus ramosus erectus maior	ibid. V. vbinam reperiatur ibid.
Muscus ramosus erectus minor	ib. VI.
Muscus saxatilis ericoides	ib. VII.
Muscus stellaris roseus	ibid. VIII. vbinam proueniat ibid.
Muscus Cupressi formis	152.1.IX.
Muscus polytrichoides	ibid. X. quoduplex sit, ibid. vbi reperiatur ibid.
Muscus terrestris Coralloides incanus	152.1.XI. vbi nascatur ibid.
Muscus terrestris coralloides erectus cornibus rufescentibus	ibid. XII.
Muscus Ceranoides	152.1.XIII. quoduplex sit ibid.
Muscus aquaticus folio expanso	152.2.XIV. vbi reperiatur ibid.

Muscus fontanus siue Hepatica aquatica	ib. XV.
Muscum fontanum capitulis racemosis	152.2
Muscus pyxioides quoduplex	ib. XVI.
Myagrurn fœtidum	51.2. I. cur si dictum ibid.
Myagrurn monospermon latifolium	51.2. & 52.1. II. Pseudosadis ab Alpino vocatum 52.1.II.
Myagrurn monospermon minus	52.1.II.
Myagro similis siliqua rotunda	52.1.IV.

N.

N apobrasica	54.1.I.
Napus sylvestris Cretica	38.1.
Narcissus angustifolius albus minor	27.1.I.
Nardo Celtica similis inodora	88.2.
Nasturtium hortense quoduplex	44.1. & 2.
Nasturtium hortense latifolium	43.1.
Nasturtium hortense crispum angustifolium	42.2
Nasturtium hortense crispum latifolium	44.1.
Nasturtium hortense crispum	44.2.I.
Nasturtium pratense paruo flore	ibid. II.
Nasturtium aquaticum maius & amarum	45.1.II. interdum Sisymbrium vocatur & sepe inter Nasturtium aquaticum supinum reperitur ibid.
Nasturtium sylvestre minus	45.1.III.
Nasturtium alpinum minus Reseda foliis	45.2.IV.
Nasturtium alpinum capsula Nasturtij hortensis	ibidem. V.
Nasturtium alpinum Bellidis folio maius	46.1. VI.
Nasturtium foliis Barbarea	ibid. VII.
Nigella latifolia flore maiore simplici ceruleo	75.1.I.
Nigella Cretica	75.2.II.
Nummularia flore purpurascete	136.1. vbinam proueniat 136.2.

O.

O cimum latifolium maculatum	109.2.
Onobrychis clypeata aspera minor	149.2.1. vbi colligatur ibid.
Onobrychis clypeata lauis	ibidem I.I. vbinam proueniat, ibid.
Onobrychis incana	149.2.III. vbi locorum reperiatur, ib. altera huic similis ibid.
Ophioglossum anguloso folio	150.1.I.
Ophioglossum minus	ibidem II. quibus locis proueniat, ibid.
Ophris minima, Ophridium seu Bifolium Broccenbergicum minus	31.2. Orchis.

I N D E X.

Orchis. Vide *Cynorchis*.

Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga 29.

I.V.

Orchis macrophylla 29.2.V.

Orchis palmata angustifolia minor flore odoratissimo, 30.

I.VII.

Orchis palmata pratenfis angustifolia maior ib.VI.

Orchis palmata flore viridi 30.2.VIII.

Orchis palmata montana maxima 31.1.IX.

Origanum sylvestre humile, 109.1. vbi copiose reperitur,

109.2.

Orobanchis flore maiore ex caruleo purpurascens, 31.2.I.

Orobanchis vulgaris, Theoph. Limodorum, & quare ita dicta.

ibid. II.

Orobanchis Hypopitys, ib. III. quomodo à vulgari differat, ib.

Orebus alpinus latifolius, 149.2. vbi: proueniat ibid.

P.

P *aeonia flore pallido folio hirsuto* 139.

Papauer erraticum Pyrenaicum luteo flore 92.2. II.

Papauer spinosum, 93.1. II. qualem odorem referat, ib. quo

anni tempore floreat, ib. eius semen ex Anglia primo. no-

mine Figo del inferno, id est, Ficus infernalis, allatum,

ib. an Glaucium sit Dioscoridis ib.

Perfoliata alpina latifolia minor, 129.2. I. vbi reperitur,

ibid.

Perfoliata alpina angustifolia maior, siue folio anguloso,

129.2. II.

(ibid.)

Perfoliata alpina angustifolia media, ibid. III. vbi nascatur

Perfoliata alpina angustifolia minor, 129.2. IV. vbi legatur

ibid.

Perfoliata alpina angustifolia minima, ibid. V. inter Perfo-

liatam & *Bupleuron media*, 130.1. vbi reperitur, ibid.

Perfoliata minor ramis inflexis 130.1. VI.

Perficaria angustifolia 43.2.

Pimpinella saxifraga tenuifolia 84.2. I.

Pimpinella sanguisorba inodora, ib. II. alias *Pimpinella mi-*

nor Hispanica

ib.

Pisum umbellatum 147.2.

Plantago maxima tota glabra 97.2. I. vbi locorum repe-

riatur

ibid.

Plantago quinqueruia caulium summitate foliosa, ibid.

II. à vulgari quomodo differat, ibid. vulgaris vbi reperia-

tur

98.1.

Plantago trineruia angustissimo folio, 98.1. III. hac ad vias

maxime ad rudera, reperitur ibid.

Plantago angustifolia paniculis lagopi, 98.1. IV. vbi copiose

proueniat

ib.

Polium latifolium incanum Creticum, 108.2. alias *Polium*

platiphyllum Cydoniense ibid.

Polygonatum latifolium minus flore maiore, 136.2. I. vbi

proueniat

ib.

Polygonatum latifolium perfoliatum Brasiliense, ib. II.

Polygonatum saxatile 131.1. I.

Polygonatum Creticum thymi folio ibid. II.

Polygonatum luteum minus stoccalis (spadiceo alba cantibus,

131.1. III.

Polygonatum minus lentifolium, 131.1. IV. vbinam reperia-

tur

131.2. IV.

Potamogeton racemosum angustifolium, 101.1. I. alias tri-

bulum aquaticum minus ibid.

Potamogeton gramineum ramosum, ib. II. alias *Fontilapa-*

thum gramineum

ibid.

Potamogeton minimum capillaceo folio, ibid. III. vbi proue-

niat

ib.

Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis, ib. IV.

& 101.2.

Pseudonarcissus gramineo folio, siue *Leuconarcissus astius*,

127.1. II.

(ibid.)

Psyllium Indicum foliis crenatis, 99.1. I. quo tempore floreat

Psyllium minus, ib. II. quo mense floreat, 99.2. alias *Gottne*

rubrum & *album* ibid.

Pulegium foliis nummularia 109.1.

Pulsatilla palustris 94.1. I.

Pulsatilla apij folio vernalis flore maiore, ibi. I. & 94.2. II.

quo loco proueniat ibid.

Pulsatilla apij folio vernalis flore minore, 94.2. III. & quo

mense floreat ibid.

Pulsatilla apij folio autumnalis, ib. IV. quo loco, & mense

floreat ibid.

Pulsatilla folio anemones secunda, vel *subrotundo*, ib. V. a-

lias *Pulsatilla latifolia* ibid.

Pyrola Alfine flore maior & minor, Europa & America-

na, 100.1. & 2. Europaam sub herba trientali Val. Cor-

dus posuit, ibid. & alij qualiter & quibus sub locis, ibid.

Pyrola Alfine flore Brasiliense, 100.2. vbinam reperta,

ibid. & 101.1.

Q.

Q *ercus maritima quatuorplex* 154.1.

Quinquefolium album minus, 139.1. vbi colligatur,

139.2. I.

Quinquefolium album minus, 139.2. II. vbi locorum repe-

riatur

ibid.

Quinquefolium montanum luteum erectum hirsutum, ib. II.

Quinquefolium similis enneaphyllos hirsutum, ib. IV. vbi nasci-

tur

R.

R *anunculus montanus subhirsutus latifolius*, 96.1. VI.

quibus locis proueniat ibid.

I

Ranun-

INDEX.

<i>Ranunculus montanus lanuginosus foliis ranunculi pratensis repentis</i> , ib. VII. vbi nam reperiri solet	96.2.VI.	<i>Salix saxatilis minima</i>	ib. VII.
<i>Ranunculus saxatilis magno flore</i> , 96.2.VIII. quibus locis crescat	ib.	<i>Salvia folio serrato</i>	113.2.F.
<i>Ranunculus saxatilis folijs subrotundis</i>	ibid. IX.	<i>Salvia folio subrotundo</i>	ib. II.
<i>Ranunculus minimus saxatilis hirsutus</i> ib. X. vbi proueniat	ibid.	<i>Salvia lanuginosa angustifolia</i>	113.2.III.
<i>Ranunculus villosissimus Monspeliacus</i> , ib. XI. quibus locis reperitur	ib.	<i>Sanamunda viridis vel glabra</i> , 160. vbi colligatur	ib.
<i>Ranunculus nemorosus Anemones flore minor</i> , 95.1.1. a vulgato quomodo differat	ibid.	<i>Sanicula montana minor</i> , 115.1.1. quomodo variet, & vbi proueniat	ibid.
<i>Ranunculus rotundifolius repens echinatus</i> ib. II. vbi proueniat	ib.	<i>Sanicula alpina minima pilosa</i> , 115.2.1. vbi reperitur,	ibid.
<i>Ranunculus palustris echinatus</i> ib. III. quibus locis gaudeat	ibid.	<i>Saponaria concava Anglica</i> , 103.1. quo anni tempore, & in qua regione floreat, 103.2. alias <i>Gentiana concava dicta</i>	ibid.
<i>Ranunculus grumosa radice folio ranunculi bulbosi</i> , 95.2. IV.		<i>Scabiosa peregrina rubra</i> , 125.2.1. alias <i>Scabiosa Indica dicta</i>	ibid.
<i>Ranunculus geranii tuberosi folio</i> , ibid. V. alias <i>Batrachium verum</i>	ib.	<i>Scabiosa folio Sinapi sylvestris</i>	ibid. II.
<i>Raphanus Creticus</i>	38.2	<i>Scabiosa prolifera folijs G. ngidij</i>	126.1.III.
<i>Raphanus aquaticus folijs in profundas lacinias diuisis</i>	38.2	<i>Scabiosa prolifera quatuorplex</i>	ibid.
<i>Raphanus aquaticus alter</i>	38.1.	<i>Scabiosa prolifera folijs in latiores lacinias diuisis</i> , 126.1. III.	
<i>Rapistrum floribus Leucoij marini</i>	37.1.1.	<i>Scabiosa prolifera folijs tenuius incis</i>	ibid.
<i>Rapistrum monospermon</i>	ibid. II.	<i>Scabiosa montana dentis leonis folio</i> , 126.2.1. IV. vbi reperitur	ibid.
<i>Rapunculus spicatus spica alba vel cinericea</i>	33.1.	<i>Scabiosa stellata minima</i>	ibid. V.
<i>Rapunculus alpinus sine pyramidalis minor</i>	ib.1.	<i>Scabiosa argentea angustifolia</i> , 127.1. VI. vbi proueniat,	ibid.
<i>Rapunculus alpinus corniculatus</i>	35.2.II.	<i>Scandrix Cretica maior</i>	78.1. & 79.1.1.
<i>Reseda linari folijs</i>	42.1.	<i>Scandrix semine rostrato Italica</i>	78.2.
<i>Reseda minor alba, quam Sesamoidem parnam Salmanticensem Clusius vocat</i>	ib. II.	<i>Scandrix Cretica minor</i> , 79.1.1.1. quanam eius varietas,	79.2.1.1.
<i>Reseda affinis Phyteuma</i>	ib.	<i>Scandrici qua herba maxime quadrat</i>	80.2.1.
<i>Ribes montana oxyacantha sapore</i>	160.2.	<i>Scrophularia flore luteo</i>	112.2.1.
<i>Ribes quatuorplex in Heluetiorum alpihus reperitur</i> , ibid. vbi proueniat	ibid.	<i>Scrophularia folijs laciniatis</i>	113.1.II.
<i>Rubia montana angustifolia</i> , 145.1.1. vbi nam proueniat	ib.	<i>Secale latifolia</i>	26.2.
<i>Rubia pratensis lauis acuto folio</i> , 145.1.1. vbi reperitur	ib.	<i>Scorodotis Cretica</i>	113.2.
<i>Rubia quadrifolia rotunda lauis</i> , ib. III. vbi crescat	ib.	<i>Sedum tridactylites alpinum minus</i> , 131.2.1. alias <i>saxifraga alba peti ea</i> id. simile, sed folijs latioribus, & in ternas pinnas profundas lacinias diuisis	ibid. aliud cauliculo rotundo, semipalmari
<i>Rubia angustifolia spicata</i> , 155.1.1. IV. vbi nascatur	ib.	<i>Sedum tridactylites alpinum minus</i> , 131.2.1.1. vbi reperitur	132.1.1.1.
<i>Rubeola aruensis carulea repens</i>	145.2.V.	<i>Sedum montanum ericoides</i>	1.1.1.
<i>Rubeola saxatilis</i>	ib. VI.	<i>Sedum alpinum ericoides caruleum</i> , 132.1.1.1. vbi nascatur	ibid.
<i>Rubeola maritima aspera</i> , 146.1. VII. vbi legitur	ib.	<i>Sedum saxatile hirsutum purpureum</i> , ibid. V. vbi proueniat	ibid.
<i>Rubia cynanchica saxatilis</i> , ibid. VII.1. vbi proueniat	ib.	<i>Sedum saxatile arborum ventibus floribus</i> , ib. VI. vbi a nihil altius excrestat	132.2. VI
Sc.		<i>Sedum saxatile variegato flore</i> , 132.2. VII. vbi copiose proueniat	ibid.
<i>Salix alpina Pyrenaica</i>	159.2. VI.	<i>Sedum</i>	
<i>Salix alpina angustifolia repens</i>	ib. V.		
<i>Salix fragilis</i>	159.1.1.		
<i>Salix oblongo incano folio</i>	ib. II.		
<i>Salix subrotundo argenteo folio</i>	ib. III.		
<i>Salix humilis latifolia erecta</i>	159.2. IV.		

I N D E X

Sedum alpinum folioli crenatis asperis 132.2.VIII.
Sedum arvense flore rubente, ib. IX. vbi reperitur ib.
Serpentaria triphyll. Brasiliiana, 101.2. vbinam reperitur ibid.
Serpillum latifolium subhirsutum 108.2.
Seseli montanum Cicuta folio hirsutum 85.1.I.
Seseli pratense tenuifolium, siue Daucus pratensis tenuifolius 85.1. & 2.II.
Seseli palustre lactescens 85.2.II.
Sideritis foliis oblongis glabris III.1.I.
Sideritis alfine trixaginis folio, III.2.II. vbi reperitur, ib.
Sinapi paruum siliqua aspera 41.2.I.
Smyrnum peregrinum folio oblongo 82.1.I.
Solanum tuberosum esculentum, 89.1.I. in Austria quale habeatur 90.1.I. odorem qualem referat ib.
Solanum somniferum secundum, ib. an veteribus cognitum 90.2. huius radicibus Indi panis loco vtuntur ib.
Solanum racemosum cerasorum forma 90.2.II.
Solanum triphyllum Brasiliianum 91.1.III.
Solanum Mexiocanum lasminum Indicum dictum flore minore 91.2.IV.
Sonchus asper laciniatus Creticus 62.2.I.
Sonchus asper subrotundo folio ib. II. quae eius species 61.1.II.
Sonchus laevis in plurimas tenuissimas lacinias diuisus, ib. III.
Sonchus angustifolius maritimus 61.1.IV.
Sonchus montanus laevis laciniatus minor ibid. V.
Sonchus villosus laevis minor, ibid. VI. à quibusdam Hieracium tomentosum dicitur 61.2. VI.
Sparganium minimum 24.2.
Sphondylium hirsutum foliis angustioribus, 83.1.I. à vulgari quomodo differat ibid.
Sphondylium alpinum paruum ib. II.
Sphondylium alpinum glabrum 83.1. & 2. III.
Stryax liquida 158.2.
Sumach angustifolium, 158.1. vbinam provenire solet, ib. T.
T*Anacetum alpinum* 70.1.
Telphium purpureum minus, 133.2. vbinam colligitur ibid.
Teucrium alpinum inodorum magno flore, 116. vbi nascatur ibid.
Thalictrum angustissimum folio 146.2.I.
Thalictrum minimum foetidissimum, 147.1.II. vbi reperitur, ib. huic simile ibid.
Thlaspi vacca i.e. folio, Burse pastoris siliquis 47.1.I.
Thlaspi vacaria incano folio minus 47.2.II.
Thlaspi villosum capillis hirsutis 47.1. & 2. III.
Thlaspi Creticum flore albo 48.1.IV.

Thlaspi saxatile rotundifolium ib. V.
Thlaspi alpinum folio paruo crenato, vel Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo 48.2.VI.
Thlaspi alpinum maius capitulis rotundis 49.1.
Thlaspi montanum incanum luteum 49.2.
Thlaspi alpinum repens, 49.1. VII. quomodo variet ratione loquar ibid.
Thlaspi biscutatum villosum flore calcarid donata, 49.2. VII.
Thlaspi fruticosum Leucoj folio latifolium ib. IX.
Thlaspi Alexandrinum 50.1.X.
Thymum inodorum 158.2.
Trachelium. Vide Campanula foliis subrotundis.
Tragopogon folio sinuato 129.1.I.
Tragopogon tenuissime laciniatum ib. II.
Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato, 140.1.I. quo anni tempore floreat, ib. & vbinam reperitur, ib.
Trifolium montanum purpurascens folio obtuso crenato, ib. d. II.
Trifolium montanum lupulinum, 140.1. III. vbi nascatur ibi.
Trifolium capitulo spumoso laui, ib. IV. quib. locus proveniat ibid.
Trifolium capitulo spumoso aspero maius, 140.1.V. vbi reperitur 140.2.
Trifolium capitulo spumoso aspero minus, 140.2. VI. vbi proveniat ibid.
Trifolium capitulis Thymi, ib. VII. vbi nascatur ib.
Trifolium capitulo oblongo aspero 140.2. VIII.
Trifolium cochleatum folio minuto obtuso fructu latiore ib. IX.
Trifolium cochleatum polycarpon, 141.1. X. huic simile alterum, ib. quomodo ab inuicem differant ib.
Trifolium cochleatum echinatum minus 141.1. XI.
Trifolium fructu duro spinis horrido, 141.2. XII. vbi legatur ibid.
Trifolium folliculis corona simili, ib. XIII. vbi proveniat ib.
Trifolium peltatum Creticum, 142.1. XIV. alias Trifolium Creticum odoratum ibid.
Trifolium spinosum Creticum, 142.2. XV. alias Trifolium spinosum semper virens 143.1.
Trifolium stellatum, 143.1. XVI. quo anni tempore & loco colligatur ibid.
Trifolium globoso flore, vel capitulo Lagopi rotundiore, 143.1. XVII. quo mense & quo loco proveniat ib.
Trifolium globosum repens 143.2. XVIII.
Trifolium saxatile hirsutissimum, ib. XIX. vbi legatur ibid.
Trifolium alpinum flore magno radice dulci, 143.2. XX. quib. locus nascatur, ib. eius radix quo sapore sit prae data ib.
Trifolium corniculatum minus pilosum, 144.1. XXI. vbi proveniat ibid.

Trifolium

INDEX.

Trifolium corniculatum frutescens tenuissimis foliis. ibid. XXII.

Trifolium angustifolium repens folliculis rotundis. 144. I. XXIII.

Tussilago alpina folio oblongo 101. I. vbi locorum proueniat ibid.

Tithymallus incanus hirsutus 133. 2. I.

Tithymallus sine Esula exigua foliis obrusis ibid. II. vbi reperitur ibid.

Tithymallus exiguus saxatilis 133. 2. vbi proueniat ibid.

V

Valeriana palustris maior profunde laciniata 86. 2. I. in quo cum *Valeriana vulgari* conueniat. ibid.

Valeriana palustris inodora parum laciniata. ibid. II.

Valeriana alpina prima. ibid. III.

Valeriana alpina scrophularia folio. 87. 1. IV. in quo cum

Valeriana sylvestri conueniat. ibid.

Valeriana alpina minor. 87. 2. V.

Valeriana peregrina purpurea albave. ibid. VI. in quo cum

Nardo montana conueniat. 88. 1. VI. alias *Valeriana*

Sicula. ibid. item *Valeriana Indica Imperati*, & *Nar-*

du Cretica, tandemq; *Tripolium.* ibid.

Valeriana rubra angustifolia. 88. 2. VII.

Verbascum foliis rotundis flore blattaria. 114. 2.

Verbena nodiflora. 125. I.

Veronica alpina bellidis folio hirsuta. 116. 1. I. vbi reperia-

tur. 116. 2.

Vicia Onobrychidis flore. 149. 1. vbinam proueniat. ibi-

dem.


ERRATA.

Fol. 18. l. 14. secalina, ipsi secali, ibid. l. 19. loliacea. fol. 19. l. 11. terna, ibid. l. 29. murino. fol. 19. l. 29. asperis. fol. 20. l. 12. donatur. fol. 22. l. 2. capillaceum. fol. 43. l. 12. appellauit. fol. 63. l. 6. quandoque. fol. 67. l. 14. brachiatos. fol. 69. l. 16. absque. fol. 79. l. 14. sub asperis. fol. 90. l. 36. veraalique. ibid. l. ult. nomine.

FINIS.



ibid. III.
quo cum
ibid.
87.1.F.
quo cum
cleriana
87.1.F.
ibid.
87.1.F.
114.2.
125.1
116.2.
116.2.
116.2.



Fr

